JOANNIS DANIELIS LEERS FLORA HERBORNENSIS EXHIBENS...

Johann Daniel Leers

Digitized by Google

JOANNIS DANIELIS LEERS

FLORA HERBORNENSIS

EXHIBENS

PLANTAS

CIRCA

HERBORNAM NASSOVIORUM

CRESCENTES,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE LINNAEANUM

DISTRIBUTAS,

CUM

DESCRIPTIONIBUS

RARIORUM INPRIMIS GRAMINUM,

PROPRIISQUE OBSERVATIONIBUS

ET NOMENCLATORE.

ACCESSERUNT

GRAMINUM OMNIUM INDIGENORUM

EORUMQUE ADFINIUM

ICONES CIV,

AUCTORIS MANU AD VIVUM DELINEATAE.

EDITIO ALTERA.

COLONIAE ALLOBROG.

APUD PIESTRE ET DELAMOLIERE.

M. D. C. C. L X X X I X.

PRAEFATIO

LECTORI B. S.

Amor ſtudii Botanici, quo jam a teneris annis captus fui, anſam mihi dedit, ut tam arduum laborem ſuſcipiens, ſtirpes in hac plantarum ditiſſima urbis noſtrae regione ſponte provenientes, per octodecim annos colligerem, ad quem etiam magna ex hoc ſtudio ſemper percepta voluptas accedebat, hunc meum ardorem magis magisque incendens. Aſcendi eum in finem adjacentes montes, viſitavi prata, campos, ſilvas, meque demiſi in nemora umbroſa, paludes cet. Quam collectionem ſtirpium rite examinatarum & in ordinem redactarum Tibi B. L. offerre non dubitavi,

ſperans fore, ut hanc a me ſuſceptam operam grato animo accipias, minimeque ſupervacaneam eſſe putes.

Numerus quidem plantarum, quae in hoc opuſculo recenſentur, reſpectu aliorum baud ita magnus eſt, cryptogaminis exceptis; verum haec collectio, ſi ad ſpatium vix ſemimilliare ab urbe diſtans, in quo pleraſque harum ſtirpium collegi, reſpicias, alias hujusmodi enumerationes copia, ut mea fert opinio, multum ſuperare videtur.

Me plures ſtirpes quoque colligere potuiſſe credo niſi negotia muneris, quibus domi intereſſe coactus, matutinas veſpertinasque horas tantum ambulatiunculis meis Botanicis dicare potui, me ab excurſionibus in loca ab urbe remotiora detinuiſſent.

Novae cives etiam quas, in centies perquiſitis locis, in hunc usque diem adhuc reperio, meam confirmant opinionem, Plantarum divitias a benigniſſi-

mo Creatore in hac regione diſperſas, a me nondum exhauſtas eſſe.

Omnes ſtirpes in hac enumeratione recenſitas, ſine ullo adjutore ſocioque a me ipſo collectas, ſolus, omnique vivo auxilio, librorumque plurimorum ad hanc rem neceſſariorum ſuppellectili deſtitutus, argutiſſime examinavi, majores figura diminuta, minores naturali magnitudine depinxi, deſcripſi, & denique exſiccavi. Fateor vero harum inquiſitionem, determinationemque mihi multum negotii feciſſe: Perill. Equitis a Linné Syſtema ſexuale tantum, mihi omnem, quam deſiderabam, utilitatem attulit, ac ſemper de ſtirpe quadam dubium certum reddidit; meque ut unam quamque repertam plantam cognoſcere, ejusque genus ac ſpeciem certitudine phyſicali, determinare potuerim, docuit.

In ſtirpium Herbornenſium enumeratione celeberrimum Dr. Roſenbach in hac Academia olim Medicinae Profeſſo-

rem Anteceſſorem quidem habui, verum opus illius, quod mihi ſine dubio multum utilitatis attuliſſet, ac certe laborem meum paululum ſublevaſſet, vetuſtatis injuria, quod dolendum, periit, nec in celeberrimis totius Germaniae Bibliothecis, quamvis multa ad hunc librum inveniendum adhibita fuerit operá, reperiri potuit. Caſpar Bauhinus tantum in ſuo Pinace hujus opuſculi mentionem facit.

Stirpes meas ſecundum Perill. Linnaei Syſt. Nat. edit. XII. Holmiae 1767. enumeravi; nomina generica ſecundum Ejusdem Gener. Plantar. Viennae 1767. Nomina ſpecifica vero, ſecundum Species Plantar. Viennae 1764. notavi. Unicuique ſpeoiei autem, nomen Genericum cum Numero Speciei Perill. Halleri Hiſt. ſtirp. Helvet. edit. nov. adjunxi.

Loca natalia diligenter adpoſui, ut illi inſtructionem quandam habeant, qui mea veſtigia premere vellent.

Obſervationes paucas, plures vero deſcriptiones addidi; inprimis Graminum eorumque adfinium quae ut adcurate deſcriberem, minutiſſima quaeque perſcrutatus ſum, ac neceſſaria breviſſimis, ut potui, exhibui, imo unumquodque Gramen per plures annos, ad minimum examinavi, eorumqne habitum, ac fructificationis partes adcurate deſcripſi. Attamen fatendum eſt mihi, habitum, figuramque partium adeo ſaepe variare, ut aliquoties has deſcriptiones, poſt aliquot tempus elapſum, mutare expolireque me oportuerit: nihilominus tamen ſecundum Characteres quosdam quarundam ſpecierum partes, primo intuitu, aliter ſe viſui offerent, ac eas deſcripſi, operae autem pretium erit in collatione Characterum meorum non individuum tantum, ſed plura in diverſis locis collecta, ſecundum hos examinare. Illas vero fructificationis partes, a generico Charactere Linnaeano non diſce-

dentes, breviati ſtudens, in plurimis deſcriptionibus, non vero in Iconibus, omiſi.

Plantas omnes, quarum partes Officinas ingrediuntur, ſummo cum ſtudio annotavi, quo verae ſpecies, non autem ex ignorantia, ut ſaepe fieri ſolet, falſae colligantur; nec, in urbis noſtrae tractu ſponte provenientes, ſumptibus ab exteris adferantur.

Quaſdam paucas cum cruce (†) ſignatas, quarum inveſtigatio, ob defectum ſeu mutilationem partium, mihi ſufficientem certitudinem praebere non poterat, in civium dubiorum numero habeo.

Et quia Graminum cognitio hiſce omni luce perfuſis temporibus, ob eximium, quem adfert Oeconomiae uſum magni momenti, Tironibusque difficillima eſt, operam dedi, ut omnia gramina indigena, eorumque adfinia, ad vivum depingerem, & praecipuarum partium Icones adcuratas propria manu aeri inciſas, in majorem uſum adjungerem.

Et quum ad requiſita Botanici proprie pertineat, ut & ſit pictor ac ſculptor; exemplum magni Dillenii imitatione digniſſimum imitari mihi proponebam. Omnem itaque adhibui operam, ut figuras ſumma cum adcuratione depingerem, easque depictas, quas aliena manus forte deformaſſet, cum Chalcographi manuductione deſtituerer ipſe aeri inciderem, caelique uſum diſcerem, cujus ope omiſſa aliaque aqua forti defigurata, emendare expolireque poſſem.

Quantum laboris & negotii vero hujus Artis primaria Experimenta mihi fecerint, vix exprimere poſſum. Quae cum ita ſint L. B. non a me ut autodidacto in arte Chalcographica, artificioſa ſpecimina multaque arte exornata expectabis, ſed hiſce iconibus ſimpliciſſimam naturam repraeſentantibus, ut ſpero, contentus eris.

Animus mihi erat Vegetabilia Cryptogamica, Muſcos nimirum & Algas,

haſce umbrarum incolas, quibus ob ſtructuram mirabilem eximiamque pulchritudinem ſemper amiciſſimus fui, tanquam ſecundam hujus florae partem, non multo poſt hanc primam in lucem edere; ſed tam multa ſe mihi oppoſuerunt impedimenta, quae nullo modo ſuperari poterant, meque ab hoc opere perficiendo detinuerunt. Propterea hanc partem cum Cryptogamia, quam ſine ea mutilatam ac imperfectam publico tradere malui. Si vires corporis longo & ad hucdum me premente malo admodum debilitate mihi poteſtatem facient, ac ſi Deo T. O. M. ſic viſum fuerit, ut hac vice ex incommoda hac valetudine emergam; Muſcos Algasque ſub tit. *Vegetabilia Cryptogamica Iconibus illuſtrata*, cum accuratis a me ipſo ad vivum depictis & autographa manu aeri inciſis figuris, emittere, animum induxi. Et cum mihi Perill. Hallerus, pro ſua benignitate omni laude digniſſima, ſuos plurimos

rarosque Muſcos & Algas mecum humaniſſime communicare pollicitus ſit, haec mea collectio hoc additamento eo numeroſior, illuſtrior ac utilior evadet.

Ipſo opere Dilleniano quo Muſcorum indagator carere non poteſt, deſtitutus ſum; nam Celeberr. Doct. Boehme Bibliothecar. & Prof. Gieſſae mihi quidem iſtud per literas enixe roganti, humaniſſime miſit, quia mihi autem non niſi per aliquot hebdomadas concedebatur, non multum in uſum meum convertere potui. Natura igitur, quam tantum imitabor, ipſa mibi ſufficiens erit, ad meas icones, cum artem Chalcographicam diligentius nunc quam antea excoluerim ejusque plurima arcana detexerim, adeo naturae ſimiles aeri incidendas, ut niſi figuras Dillenianas Michelianasque ſuperent, iis tamen in re nulla, quae certe ad accurationem attinet, cedant.

Haec mea collectio multa alia Vegetabilia Cryptogamica rariora continebit.

Non unaquaeque flora enim Anthocerote, Buxbaumia, Blaſia, Marchantia conica & hemiſphaerica, quibusdam Ricciae ac multis Jungermanniae ſpeciebus &c. gaudet. Quae tamen omnia in locis a nullo adhuc perſcrutatis ipſe primo reperi, pluraque eorum adpoſitis nominibus cum Amicis communicavi.

In ceteris fruere hoc meo labore B. L. qualiscunque etiam ſit, eumque ſerena excipe fronte, ac finis quem mihi in hoc tam arduo labore ſuſcipiendo propoſui, non immemor eſto. Qui niſi rei herbariae peritorum applauſum captem, me aliquid tamen ad Botanophilorum tironum uſum contuliſſe mihi gratulari poſſum. Dabam Herbornae Menſe Novembri MDCCLXXIV.

JOANNES DAN. LEERS.

V I T A
JOANNIS DANIELIS LEERS,
S C R I P T A
AB
HENRICO PAULO LEERS, Filio.

Idem cum aliis, maxima cum indignatione, diu multumque obſervavi, homines pleroſque in hoc mundi theatro verſari, abſque ut ſentiant, pulchritudinem, ordinem ac ſapientiam ex naturae opetibus elucentem: cum tamen, Cl. Linnaeo (*a*) judice, *rerum creatarum indagatio ab hominibus ſibi relictis ſemper aeſtimata; vere eruditis ac ſapientibus ſemper exculta; male doctis & barbaris ſemper inimica fuerit*; cumque eruditiſſimus quisque inficias ire non potuerit, hanc ſcientiam mirificam & utilitatem & voluptatem adferri cultori. Ego quidem a prima ſtatim aetatula, amorem quaſi a natura inſitum percepi doctrinae naturalis, ſimulque in hunc uſque diem ea, mirum in modum, delector, mihique hoc plus ſemel in optatis fuit, ut hiſtoriae naturalis ſcientia pateret latius, ita ut non tantum eſſet diſciplina Medicorum propria, ſed & Theolo-

(*a*) Linn. Syſt. Nat. edit. Holm. XII. Tom. I. p. 14.

gorum atque Juriſconſultorum fora occuparet. Non quidem opus eſt, ut multis verbis hujus ſcientiae oſtendam utilitatem. Res ipſa, & ii, qui vel primoribus tantum labris hocce ſtudium attigerunt, loquantur. Pauca tamen hac de re *ἐν παρόδῳ* dicere, animus eſt.

Cum omnes in eo conveniant, ut ſapiens nihil fruſtra faciat; quare, quaeſo, Deus mihi oculos dedit, & quare rationem? Nonne ad ſua opera in hocce mundo conſideranda? Si itaque Dei opificium, vel contemtui habeam, vel plane negligam, & non dignum judicem, quod a me videatur, huic fini, quem Deus ſibi in hoc mundo creando propoſuit, penitus repugno. Quod ſi vero negaveris, prodeſſe barum rerum cognitionem: magno te hercle temeritatis crimine obligaveris; cum de Deo ignominioſum ſit dicere, quaedam ab ipſo eſſe effecta, quae plane nullum habeant uſum (*a*).

Porro cum omnes res creatae ab opifice optimo maximo originem trahant, atque ex iis divinae perfectiones eluceant; hominis ratione praediti eſſe puto, virtutis divinae cognitionem, ex ſacris literis hauſtam, ope contemplationis rerum creatarum, luce pleniore colluſtrare. Ex rebus namque creatis perfectiones Dei patere, cuivis extra dubium poſitum eſt. Nimirum ſupremi Numinis potentia ex creatione, gubernatione, ac omnium rerum conſervatione evinci-

(*a*) Sic e. g. uſum, quo gaudeant Inſecta, haecce animalcula a vulgo plerumque ſusque deque habita, oſtendit Cel. de GEER.

tur. Etenim pulcherrimus nexus, qui in rebus, quas benigniſſimus creator in hocce mundo produxit, deprehenditur, evidentiſſimum divinae ſapientiae indicium eſt. Bonitas deinde creatoris in eo cernitur, quod, experientia teſte, omnia in hominum uſum ſint condita cet. Nam ſicuti e. g. in artificioſo quodam opere, artificis ſolertiam admiror, ſic & ex rebus, in hac rerum univerſitate a Deo productis, Ejus perfectiones colligo. In rebus creatis divinae artis ac ſapientiae ſunt veſtigia: Haec adeat ille, qui Dei exiſtentiam in dubium vocare non erubeſcit (*a*).

Deinde hominem obligatum eſſe ad divina opera contemplanda, ex eo quoque recte judicatur, quod eum Deus, haud temere aut fortuito, miro varietatis ac pulchritudinis ſenſu, inſtruxit, ut & magna cupiditate res creatas contemplandi perſeferatur. Hanc itaque ſciendi cupiditatem naturalem eſſe video, & cum haec naturae dos, quam Deus humano cordi inſevit, non ſine ratione eidem indita videatur, & huic obtemperare meum eſſe, plane video.

Quantam non adfert tandem Hiſtoriae Naturalis notitia cultoribus voluptatem? (*b*) Etenim animus hominis ita eſt comparatus, ut ex varietate & pulchritudine non poſſit non incredibilem

---

(*a*) Videatur Clar. NIEVENTYT, l'exiſtence de Dieu démontrée dans les merveilles de la Nature.

(*b*) *Haec contemplatio Naturae evadit voluptatis coeleſtis veſtibulum, cujus particeps Animus in luce obambulat, & tanquam in terreſtre coelo vitam degit. Act. Holm.*

voluptatem capere. Et ubi quaeſo major rerum varietas (*a*) ac veouſtas reperitur, quam io regoo naturae? Item quot inveniantur animalia? Quantus oumerus vegetabilium, lapidum, cet., & quaota pulchritudine ſingula ſunt exoroata? Ratio, ob quam quarundam naturalium pulchritudo non ſtatim perſpiciatur, ſaepe quaerenda eſt io minutiſſima ac ſubtiliſſima ipſarum ſtructura & partium coagmeotatiooe, quae oon ſtatim in ſenſum cadit, ſed, quando microſcopiis ſubjecta fuerit, earum pulchritudo aoimadverti facile poteſt. Si v. g. nonnullæ cives civitatis Cryptogamicae tali eſſent magnitudine, quali Aloe Indica gaudet, certe, ut mea fert opinio, plurium oculos io ſe traherent, & viridariorum Regiorum decora eſſent eximia. Qualis pulchritudo noo conjuncta deprehenditur in minuta quavis beſtiola, quae ſaepe pedibus calcatur, & a communi hominum turba ſperoi ſolet? Quis enim, quaeſo, ſi ſtructuram plurium ioſectorum contemplatur, oculos ſatis paſcere, aoimumque exſaturare ſatis poterit? Hinc ipſi Magoates ac Reges hujus amore ducti, ſcieotiae naturali operam dare omni tempore cooſueverunt, oec hoc ſuæ dignitati dedecori eſſe putarunt, adeoque hoc modo oovum illi ſplendorem conciliare voluerunt (*b*). Primum humanitatis patrem etiam, ſi quid

(*a*) *Non ad unam*, inquit SENECA, *Natura formam opus ſuum praeſtat, ſed in ipſa varietate ſe jactat.*

(*b*) Quantos fecerit Rex ille *Salomon* in Hiſt. nat. progreſſus, patet ex Reg. 4. 33. ubi traditur, eum locutum fuiſſe *de*

ſi quid video, hiſtoria naturali delectatum eſſe, ſacrae literae teſtantur. (*a*)

Poſtremo cum omnia opera Divinam gloriam praedicent per hominem (*b*), ille itaque Autoris ſui majeſtatem ex fine creationis contemplari debet, ut hoc modo, ut par eſt aequum, evadat, ſummi Numinis praeco.

Verum enimvero infinita foret oratio, ſi omnia vellem explicare argumenta, quae pro dignitate ac praeſtantia naturalis ſtudii adferri poſſeot, ſed vereor ne actum agam, cum id jam pridem a multis eruditis hominibus praeſtitum ſit egregie. Haec ergo ſufficiant, ad declarandam utilitatem hujus ſtudii. Rem ipſam attigi: nunc vero ad bujus opuſculi auctorem progrediendum videtur.

Antequam vero de Ejus vita exponam, in antecceſſum moneo, eum non criminis illius eſſe accuſandum, cujus ſe, ut ſupra dixi, plurimi hominum reos facere ſolent, nimirum ignorationis naturae. Beatus videlicet auctor vitae ſuae pretium metiri ſciebat, atque adeo, quamdiu vixit, quantumque potuit, tempus bene impendebat, ad opera creatoris contemplanda ac perſcrutanda, ſaepe dicere ſolitus: omnia alia oblectamenta (ſ. quae tantum talia eſſe videntur, non autem re vera ſunt) craſſiora, quae

arboribus, de cedro Libani usque ad hyſſopum ex partete naſcentem, de quadrupedibus, avibus, reptilibus, ac piſcibus.

(*a*) Nam leginus de primo homine Deum ad eum omnia animalia duxiſſe, ut ipſis nomina imponeret. Hinc certas notas noverit neceſſe eſt, quibus ſpecies a ſe invicem diſtinguantur Opus propterea erat horum animalium cognitione.

(*b*) Pſalm 118.

v. g. a luſibus, confabulationibus & compotationibus penderent, minime comparanda eſſe cum hiſce, quarum nos, contemplatione operum divinorum, participes fieremus. Hiſce namque nos omni tempore, loco & in quacumque demum humanae vitae aetate, ac habitu, frui poſſe. Omnia autem ea in deliciis habebat, quae continent tria regna naturae. Nec minus delectabatur vermiculo, pulverem inhabitante, quam altiſſima, exquiſitiſſimisque coloribus exornata, planta. Nulli adeo pepercit labori, tam in colendo Botanices ſtudio, cui inprimis operam dabat, quam in colligendis plantis. Hujus rei ſtimulum ipſi indiderat, ſicuti de ſe Ipſo in praefatione monuit, cupido quaedam inſatiabilis, eique quaſi innata, quam a tenera ſtatim juventute perſenſerat, opera Naturae colligendi, eaque cum attentione contemplandi. A primis vero annis plantas collegit, aliaque naturalia, iisque admodum delectarus eſt, & quidem ſemper in gloriam ac honorem creatoris, optimi, maximi.

Quod vero ad originem Ejus attinet, hanc lucem adſpexit d. XXIII. Februar. 1727. *Wonſideliae*, Baruthi urbe, ubi pater ejus *Sebaſthuſia* oriundus, JOANNES PAULUS BENIGNUS LEERS, mercaturam magnariam exercebat. Propter praeclaras ingenii atque animi dotes, quae jam in prima juventute ſeſe excrebant, a parentibus ad ſtudia deſtinatus, & hunc in finem iis ſcientiis inſtructus fuit, quibus ſolida doctrina, tanquam fundamento, inniti debet. Sed providentia aliud plane moliebatur, nonnulla quippe

intercedebant, quo minus ſcientiis operam dare poſſet. His ita ſe habentibus, apud animum ſtatuit, ſtudiis relictis, arti *medicamentariae*, ſeu *pharmaceuticae*, operam navare, cum inprimis incredibili flagraret rerum naturalium amore, eaque libenter tractaret. A patre itaque cum fere annos tredecim eſſet natus, Norimbergam in pharmacopolium miſſus eſt, ad prima hujus artis principia addiſcenda. Poſitis feliciter hac in urbe rudimentis, Norimberga relicta, alias quoque multasque urbes inviſit, quas hoc loco non attinet commemorare, in multisque officinis ſervivit. In primis vero Strasburgi aliquamdiu commoratus eſt, ubi Ipſi occaſio fuit addiſcendae Anatomiae, aliarumque ſcientiarum, quae ad rem medicam pertinent.

Tandem a Deo A. 1755. praeter ſpem atque opinionem Herbornam delatus eſt, ut ibi praefecti officinae Academicae officio fungeretur. Hoc in loco ſubſidere, ac vitam finire ſtatutum erat. Non ita multa poſt adventum ſuum a Pharmacopola *Magerſtaedt*, relictam viduam (quae filia erat Pharmacopolae *Friderici*, olim Dillenburgi verſantis) in matrimonium duxit, ex qua tres filios, unamque filiam, genuit: ex quibus filii adhuc hac luce fruuntur, filia vero aliquantiſper tantum in hac vita verſata, paulo poſt animam efflavit. Verum ambo non longo tempore fruebantur, quae ex hoc jucundo conjugio fluebat jucunditate, ſed mors funeſta mox hocce vinculum, quo arcte conjuncti erant, diſſolvit, ſiquidem uxor ejus dilectiſſima

morbo, in puerperio ultimo, correpta, A. 1764. diem obiit.

Quo facto, cum res ejus familiares non paterentur, ut diu vitam ageret coelibem, altera vice, cum virgine C. M. e. gente *Textoria*, oriunda *Giſſa*, connubium, iniit, ex quo ipſi filius natus eſt, qui autem, non multo poſtquam in lucem editus fuerat, morti occubuit.

Ab eodem Anno 1764., quo hanc virginem domum duxerat, coepit infirma uti valetudine, morboque affligi gravi, & quidem ſic dicto hypochondriaco. Hujus morbi ſedes in alvo erat, hinc diris capitis doloribus excruciabatur, & defectu virium admodum laborabat. Vis hujus mali erat tanta, ut nulla ſpes ſalutis reliqua eſſe videretur. Sed Deus T. O. M., qui ipſum adhuc aliquandiu in hac vita, verſari voluit, donicum liberi ſui, usque huc impuberes, ephebis excederent. Ergo remedia ſalutaria eſſe juſſit, adeo quidem, ut denuo ſanitatem recuperaret.

A. 1770. iterum periculoſo affectus eſt morbo, quem artis ſalutaris periti Anginam appellare ſolent. Etiam maximum aderat periculum, omnesque vitae ſuae finem appropinquare credebant. Sed Deus, apud quem poſſibilia ſunt, quae, apud homines limitata ratione praeditos impoſſibilia eſſe videntur, omnibus de redintegranda valetudine deſperantibus, ſe interpoſuit, eumque ab hoc quoque morbo liberatum, ſanitati reſtituit.

A. 1772. in febrem incidit putreſcentem, cujus morbi vis tum temporis in noſtrae urbis re-

gione late vagabatur, ipſique mortem minari viſa eſt, ſed Deus cujus bonitas immenſa eſt, effecit, ut & hoc morbo explicaretur.

Sed morbus ultimus hic corpus ſuum usque adeo debilitarat, ut usque in Septembrem A. 1774. continuo levi eſſet valetudine. Membra ejus tali ſemper languore laborabant, ut levem quandam deambulationem ſtatim ejusmodi ſequeretur laſſitudo & virium proſtratio, quae vix exprimi poteſt, aliaque ſeſe exerebant morbi imminentis indicia, ſicuti & hujus menſis initio, morbo quodam pertinaci ac admodum acerbo, corripiebatur. Initium morbi erat Colica ſpasmodica, quae cum febre, ut vocari ſolet, tabida, conjuncta erat, ſingulis noctibus ipſi magnum ſudorem exprimente. Quo fiebat, ut optimis & ad vitam ſuſtentandam neceſſariis viribus privaretur, quod non niſi mortem ipſi adferre poterat. Denique ſucceſſu temporis magis magisque, viribus frangebatur, ut maxime lectulo affixus ſederet, ita, ut tandem proprio Marte ire non poſſet, ſed duci oporteret. Omnibus autem admirabile viſum eſt, eum, licet diris conficeretur doloribus & prae laſſitudine pedem vix movere poſſet, miram tamen animi praeſentiam ac aequabilitatem retinuiſſe, ita quidem, ut ſemper pias preces effunderet, quibus, tanquam antidoto contra morbi cruciatus, uſus eſt. Nullis parcitum eſt remediis ad eum hocce morbo levandum, Cel. Dr. & Prof. *Hoffmannus* t. t. Acad. Herbornenſis Prorector, & Clar. Dr. *Ebertz*, advocati ipſum inviſerunt,

multaque curarunt: quin imo Ipſe nonnunquam ſibi quaedam ex officina ſua praeſcripſit. Sed nihil horum exoptatum effectum habuit, omniaque irrita fuerunt: Ipſemet enim ſentiebat vitae ſuae finem appropinquare, ſibique ex hac vita diſcedendum eſſe.

Omnibus itaque exacte diſpoſitis, quae ad rem domeſticam attinerent, ut Chriſtianus conſtans, quem nec mortis terror concutere poteſt, mira animi tranquillitate mortem exſpectabat, qui ſuis doloribus finem imponeret. Neque etiam ſibi longiorem exoptavit vitam, ſed libenter mori voluit & quavis hora optavit. Tandem & voti ſui fuit damnatus: nam 7mo die Decembris, hora poſt meridiem fere tertia, interna viſcerum inflammatio, doloribus & vitae finem fecit.

Talem exitum habuit vita viri, qui propter multa ſua, eximiaque merita, quamdiu in hac vita verſabatur, ab omnibus, qui eum aeſtimare poterant, eximio amore colebatur. Urbs ejus obitu rerum naturalium peritiſſimum & in multis artibus ac ſcientiis verſatiſſimum amiſit Virum: Liberi vero ejus patrem, cujus obitum numquam ſatis elugere poterunt.

Conſiderato itaque vitae curſu exituque, deſcribenda erit, partim Parentis beati cognitio rerum naturalium, partim character Ejus moralis.

Quod quidem ad cognitionem ejus attinet in rebus naturalibus, (*a*) Regno inprimis Vegetabili

(*a*) Deplorandum eſt, quod hujus opuſculi autor, nunc inter coelites triumphans, in aetatis ſuae flore debitum naturae

operam dederat, ductu Botanicorum facile principis & Sueciae immortalis decoris Cl. LINNÆI; quem ſemper magni fecit, cujusque non ſine intima quadam veneratione mentionem injecit, ſaepius diceos: multa ipſi in Botanicis eſſe accepta referenda. Ratio, de qua hunc prae ceteris Botanices peritis, eximio quodam amore, proſecutus eſt, haec fuit, quia omnia ſolidiſſime tractaſſet. In urbe Herborna autem primum, intentis viribus, Botanicae operam dedit, multaque illam diligentia tractare coepit, ad quam ipſi quoque plantarum ditiſſima circa Herbornam regio anſam dedit. Plantas colligere incepit, & oulli propterea pepercit labori, viſitans omoes circa Herboroam locos, ita quidem, ut nullus fuerit circa urbem locus, cui oon veſtigia ſua impreſſit: vereque de eo dici poteſt, quod Perill. HALLERUS in praefatione ad Floram Jeneoſem de *Ruppio* ait: eum *omnes agrorum ſilvarumque angulos perreptaſſe.* Octodecim namque annorum ſpatio collegit plantas, quas haec opella contioet: & tandem, licet magoo cum labore ad finem perduxit.

Optimum vero erat, quod Deus ipſi tamdiu lucis uſuram conceſſerat, donec hoc opus, exceptis noooullis adhuc plagulis, impreſſum, & perſolverit, ſiquidem ipſi animus erat; poſt editum hanc, *circa Herbornam creſcentium plantarum collectionem*, atque plantarum *cryptogamicarum completam hiſtoriam*, etiam inperium animale intrare & b. c. d. *Faunam Herbornenſem* conſcribere, de qua ſibi in anteceſſum multum voluptatis promittebat. Sed providentia ſemper ſapiens ac benigna, in qua acquieſcere noſtrum eſt, Ipſum praematuram mortem obire juſſit.

reliquum Ipſimet ante obitum jam ſcriptis conſignatum eſſet. (*a*) Promiſerat quidem in fine Muſcorum & Algarum, ſe velle, ſi vitae uſura ipſi concederetur longius, completam *plantarum Cryptogamicarum*, circa Herbornam naſcentium *hiſtoriam* tradere, (*b*) ſed morte praeventus, promiſſis ſtare non potuit.

Si denique ad religioſos ſenſus Ejus moresque reſpiciamus, ut fervidus doctrinae Chriſtianae confeſſor vixit, ac per totam vitam in id incubuit, ut, quantum fieri poterat, Chriſti ſervatoris praecepta obſervaret, & officiis ſuis, quae ipſi erga Deum & proximum praeſtanda erant, pro viribus ſatisfaceret. Hinc quoque in vitae fine mira animi tranquillitate, animam efflare, & ſpiritum ſuum immortalem Servatoris manibus tradere poterat. Sancte ergo non tantum vixit, ſed & moribundus exemplum praebuit adſtantibus, quanta hilaritate ac pace Chriſtianus ex hac vita diſcedere poſſet. Ita ut votum meum tandem aliquando ſit hoc, ut *moriar morte hujus Iuſti, & finis meus ſit, ſicut finis Illius.*

(*a*) Ea, quae ego poſt obitum ſuum typis excudenda curavi, ſunt Praefat. Dedicat ac Nomencl.

(*b*) Cum inprimis beatus Parens plantas Cryptogamicas in deliciis baberet, quarum inſigni copia regio noſtra ditata eſt, cumque praeterea perilluſtris HALLERUS plurimos de ſuis rarioresque muſcos Patri roganti promiſiſſet, quos ego demum poſt obitum Ejus, a Viro humaniſſimo, cui propterea tantas, quantas mens mea capere poteſt, gratias lubens meritoque perſolvo, traditas accepi, profecto aliquid Parens in hac Botanices parte, adhucdum maxime relicta ac inculta, praeſtare potuiſſet, quod reipublicae Botanicae amplificandae & illuſtrandae utile & fructuoſum fuiſſet, ſi id modo fata voluiſſent.

NOMENCLATOR
LINNAEANUS
SEU
EXPLICATIO
TERMINORUM TECHNICORUM
IN HOC OPUSCULO OCCURRENTIUM
ORDINE ALPHABETICO
EXHIBITA.

Nota ad B. L.

Licet Cl. LINNAEUS in *Horto Cliffortiano*, *Philoſophia Botanica*, *Fundamentis Botanicis*, & in Libello, cui tit. eſt: *Termini Botanici explicati*, quoad maximam partem terminos botanicos expoſuerit, maxime tamen ſparſi ſunt, hinc inde colligendi, ac ordine alphabetico non exhibiti. Me propterea haud parvam apud Tirones gratiam initurum putavi, ſi hoſce collectos & ordine alphabetico diſpoſitos, in Tironum uſum exhiberem.

A.

1. *Abbreviatum* Perianthium, (572) longitudinem Tubi (857) Corollae (193) non attingens.
2. *Abortiens* Pericarpium, (573) quod ante maturitatem decidit.
3. *Abrupte pinnatum*, Pinnatum (593) terminatum neque Cirrho (142) neque Foliolo (323) id. ac *Pinn. ſine impari.* (595)
4. *Acaulis* Planta, Caule carens. *Carduus acaulis.*
5. *Aceroſa* Folia; Linearia (458) Subulata, (807) perſiſtentia, (577) plerumque baſi articulatione ramo inserta. *Pinus. Juniperus.*
6. *Acinaciforme* Folium, Compreſſum, (166) Carnoſum, (122) altero margine convexo-anguſto, altero rectiore, craſſiore.
7. *Acinaciforme* Pericarpium, (573) cum fructus inſtar cultelli compreſſus, altero angulo longitudine obtuſo, altero rectiore craſſiore.
8. *Acotyledones* Vegetabilia, ubi nulli omnino extant Cotyledones (199) ſub ſeminis Germinatione (352) *Cryptogamia.*
9. *Aculeatum* Folium, cum Aculei pungentes rigidi occupant Diſcum. (257)
10. *Aculeatus* Caulis, (132) Aculeis (11) Sparſis, ſ. confertis armatus. *Roſa. Berberis. Rubus.*
11. *Aculeus*, Mucro pungens Plantae (600) Cortici tantum adfixus. (non Ligno) 730. 657. 404. 668. 354.
12. *Acutum* Folium, quod terminatur Angulo acuto. (a)

(a) Si ſuper lineam ductam perpendiculum erigo, anguli qui inde utrinque oriuntur, *recti* dicuntur. Anguli rectis majores aut minores ſunt *obliqui*. Et majores quidem rectis appellantur *obtuſi*, minores vero, *acuti*, Geometr.

13. *Adnatum* Folium, Pagina (534) ſuperiore baſi rami adnexum.
14. *Adſcendens* Caulis, Fol. Pedunc. Coroll. 4. arcuatim ſurſum verſus.
15. *Adverſum* Folium, cum Pagina (534) ſuperior non Coelum ſed horizontem ſpectat.
16. *Aequalia* Filamenta (303) eandem ſervantia longitudinem.
17. *Aequalis*, Corolla (193) ubi partes figura, magnitudine, & proportione aequales ſunt.
18. *Aeſtivatio*, Corollae (193) Complicatio ante explicationem Floris.
a. Convoluta (186) b. Conduplicata, (171). c. Imbricata (391). d. Valvata. e. Inaequivalvis.
19. *Aggregatus* Flos. Compoſitus (162) Receptaculo (661) dilatato, floſculis ſubpedunculatis *Jaſione*.
20. *Ala*, membrana adfixa ſemini. (712) (24).
21. *Ala*, denotat Angulum, quem cum Caule facit Petiolus (585) & viciſſim (72).
22. *Alae*, (Caulis,) membranae foliaceae, quae ſecundum Caulium longitudinem decurrunt (25).
23. *Alae*, Corollae Papilionaceae (545) Petala duo quae Carinae (125) lateribus utrioque adſtant ſolitariae.
24. *Alatum* Semen (712) lateribus membrana auctum, qua volitante diſſeminatur *Acer*. *Fraxinus*. *Ulmus*.
25. *Alatus* Caulis, qui ſecundum longitudinem eſt foliatus. (22) *Scrophularia*. V. *Thapſus*.
26. *Alatus* Petiolus (585) latere utrinque membrana auctus. *Citrus*. *Aurant*.
27. *Alterna* Folia, cum unam poſt alterum, tanquam per gradus circa Ramum exoritur.
28. *Alternatim* pinnatum Folium. Pinnatum (593) foliolis alternis minoribus.
29. *Amentum* Calycis (113) Species, a Receptaculo communi (152) filiformi, ſquamis paleaceo-gemmaceis diſtinctum.

30. *Amplexicaule* Folium, ſi baſis Folii utrinque ambiat latera Caulis transverſim (713).
31. *Anceps* Caulis, angulis duobus oppoſitis acutiuſculis.
32. *Androgyna* Planta (484).
33. *Angyoſpermus* Fructus. Semina Pericarpio (573) tecta.
34. *Angulatum* Folium. Angulis (36) pluribus prominentibus. (834) (634).
35. *Angulatus* Caulis, pluribus quam duobus angulis cavis longitudinaliter exaratus. Unde obtusangulus acutangulus (12. in not.)
36. *Anguli* foliorum, ſunt partes prominentes Folii horizontalis.
37. *Annulus* (Fungi) membrana ſ. pars Volvae (907) ſtipitem (778) ſupra medium cingens.
38. *Annulus* (Muſci) dicitur Antherae (41) margo exterior Orae elaſticus, orificium coarctans in quibusdam Muſcis, eſtque nudus ſ. ciliatus.
39. *Annua* Radix, (648) intra annum emoritura.
40. *Anomala* Corolla (430).
41. *Anthera*, Plantarum Genitale maſculinum, (475) Pollen (607) (veram Genituram) ducens, quod matura demittit. (264) (179).
42. *Anthera* (Muſcorum) Capitulum ſ. pars pericarpiformis glabra, membranacea, ſeſſilis, (*Phaſcum*) vel pedunculo (565) inſtructa, (*Hypna*) conſtat Calyptra (112) operculo (523) Ciliis, Polline, & rarius Apophyſi (47) differr. Figura, ovata, conica &c. Subulata in *Anthocerote*, Multifida, (*Marchantia*) quadrifida. (*Jungermannia*).
43. *Antheſis* in Floreſcentia (313) peragitur, dum Antherae (41) ruptae ſpargunt ſuum Pollen (607) veſiculare ſupra Stigma. (775) Nuptiae Plantarum.
44. *Apetalus* Flos. Petalis (581) carens, non Perianthio (572).
45. *Apex* Folii ſimplicis (734) reſpicit extremitatem in quam deſinit.

46. *Aphyllus* Caulis, Foliis deſtitutus.
47. *Apophyſis* (in muſcis) Pars inferior Antherae (41) cartilaginea incraſſata, qua Pedunculo (565) adſigitur *Polytrichum*.
48. *Appendiculatus* Petiolus (585) ramentis foliaceis ad baſin inſtructus.
49. *Appreſſum* Folium, cum Diſcus (257) folii approximatur Cauli.
50. *Approximata* Folia, ad ſe invicem proxime accedentia.
51. *Approximata* Volva (907) fungi Pileum (586) accedens.
52. *Arboreus* Caulis, Perennis Caudice (127) ſimplici gemmifero.
53. *Arillus*, Tunica propria exterior ſeminis ſponte ſecedens, eſtque Cartilagineus (*Cynogloſſum*) vel ſucculentus. (*Evonymus*).
54. *Ariſta*, Mucro ſubulatus Glumae (364) inſidens graminibus, eſtque *Recta* (664) *Tortilis* (831) &c.
55. *Arma*, Mucrones arcentes animalia, ne laedant Plantam.
    a. Aculei (11) b. Furcae (341) c. Spinae (761) d. Stimuli (776).
56. *Articulata* Radix (648) geniculis (349) intercepta.
57. *Articulata* Siliqua (729) geniculis coarctatis intercepta. *Raphanus*.
58. *Articulata* Spica (759) Internodiis (419) geniculata. *Carex pulicaris*.
59. *Articulate* dehiſcens Pericarpium (573) ſecundum articulos monoſpermos transverſim. *R. Raphaniſtrum*.
60. *Articulate* pinnatum Folium, Petiolo communi (885) articulato.
61. *Articulatum* Folium, cum unum ex alterius apice excreſcit.
62. *Articulatus* Bulbus (106) conſtans lamellis catenulatis. *Adoxa*.

63. *Articulatus* Caulis ſ. Culmus (205) Internodiis (419) geniculatus.
64. *Articulatus* Pedunculus (564) Geniculo (349) plerumque unico inſtructus. *Rumex.*
65. *Articulus*, Culmi (205) pars geniculis duobus interjecta. Internodium (419).
66. *Aſperum* Folium, idem ac ſcabrum. (702).
67. *Aſſurgens*, Caulis. Folium, arcuatim erectum, primum declinatum (215. 216) deinde apice erectum.
68. *Attenuatus* Pedunculus (564) verſus apicem ſenſim craſſitiem perdens.
69. *Auctum* Perianthium. (111).
70. *Auriculata* Folia, lobo laterali minore prope Baſin aucta. *Jungermannia.*
71. *Avenia* Folia, Venis deſtituta. Oppoſita Venoſis (888).
72. *Axilla*, *Axillaris*, eſt denominatio quae ſpatium comprehendit inter Caulem Ramum et Folium. Ala (21).
73. *Axillare* Folium (ſubalare) quod ad rami exitum inſeritur.
74. *Axillaris* Pedunculus, ex ala (21) ſcilicet inter folium et ramum &c. ortus. *Dulcamara.*

B.

75. *Bacca*, Pericarpium (573) farctum evalve, non dehiſcens, ſemina nuda nidulantia (499) continens, eſtque mono-di-tri-tetra-penta-polyſperma.
76. *Barba* Corollae Ringentis (693) Labium (433) inferius.
77. *Barba* Species Pubis (628). Pili (591) paralleli. unde:
78. *Barbatum* Folium, pilis parallelis obſitum.
79. *Bicapſulare* Pericarpium (573) tri multicapſulare, a numero Capſularum. *Aſclepias. Aconitum. Aquilegia.*
80. *Bicornes*, dicuntur Plantae, quarum Corollae antheris cornutis inſtructae ſunt. *Erica. Vaccinium.*

81. *Biennis* Radix, altero anno florens, & deinde emoritura. *Cynogloſſum*.

82. *Bifaria* Folia, ad latera rami oppoſita, tantum enata.

83. *Bifidum* Folium, tri - quinque - Multifidum Folium a numero Fiſſurarum. Species Fiſſi. (306).

84. *Biflora* Gluma (364) duos tantum Flores amplectens. *Aira*.

85. *Bigeminum* Folium, cum Petiolus dichotomus (238) apicibus adoectit foliola (323) quatuor.

86. *Bijugum* Folium *trijuga*, *quadrijuga*, *quinquejuga*, *ſejuga* &c. Pinnatum (593) ſed foliolis (323) tantum quatuor, ſex, octo, decem, duodecim &c.

87. *Bilobum trilobum* &c. Folium, a numero loborum. Lobati (462) Species.

88. *Bilocularis tri - quadri - quinque - decem*' locularis Capſula (119) a numero Loculamentorum (463)

89. *Bina* Folia - prout Terna, Quaterna, &c. Species verticillatorum (895.)

90. *Binatum* Folium, *ternatum*, *quinatum*, eſt digitatum (247) foliolis tantum duobus, tribus, quinis.

91. *Bipartitum tri - quinque multipartitum* Folium, a numero Laciniarum (438) Partiti (557) ſpecies.

92. *Bipinnatum* Folium, ſ. Duplicato pionatum, cum Petiolus (585) lateribus adfigit foliola pinnata (593).

93. *Biternatum* Folium, ſ. Duplicato ternatum, cum Petiolus (585) adfigit tria foliola ternata (812).

94. *Bivalvis* Capſula, *tri - quadri*, *quinque* ſex &c. valvis a numero valvatum (885) in quas dehiſcit.

95. *Bivalvis* Gluma (364) duabus conſtans ſquamis.

96. *Brachiae*, arborum Rami craſſiores.

97. *Brachiatus* Caulis, Ramos decuſſatim (224) oppoſitos habet.

98. *Brachium*, *Brachialis*, Menſura, ab axilla ad apicem Digiti intermedii. *Pedes duo*.

99. *Bractea*, Folium florale (311) Colore & Figura a ceteris foliis recedens. *Tilia*, *Fumaria bulboſa*.

100. *Bra-*

100. *Bracteatus* Pedunculus, Bracteis (99) inſtructus.
101. *Brevis* Petiolus, longitudinem Folii non attingens.
102. *Breviſſima*, Filamenta (303) Corolla breviora.
103. *Breviſſimus* Petiolus. (885) Folio multoties brevior.
104. *Bulbiferus* Caulis, Bulbos (106) gerens in axillis (72) Foliorum.
105. *Bulboſa* Radix, Bulbo (106) inſtructa.
106. *Bulbus*, Hybernaculum (387) Plantae (600) ex rudimentis foliorum praeteritorum.
107. *Bullatum* Folium, ex Rugoſo (698) fit, rugis contractis, ab altera parte coocavis.

C.

108. *Caduca* Corolla, Perianthium, ad explicationem Corollae mox decidens. *Thalyctrum; Actea; Chelidonium; Papaver.*
109. *Caducum* Folium, brevi decidens, nec per integram aeſtatem permaneos.
110. *Calcar*, Nectarium (496) ex Corolla pone in Conum extenſa. *Antirrhin. Linar. Orchides* unde *calcarata* Corolla.
111. *Calyculatum* Perianthium, ſ. auctum, quaſi alio minore Calyce exterius ad baſin cinctum. *Crepis Dianthus.*
112. *Calyptra* Calyx (113) Muſci Cucullatus, antbetae (41) ſuperimpoſitus (665) (513) (900).
113. *Calyx*, Cortex Plantae in fructificatione (331) praeſens. Species ſeptem numerantur. I. *Perianthium* (572). II. *Involucrum* (427). III. *Gluma* (364). IV. *Amentum* (29). V. *Spatha* (756). VI. *Calyptra* (112). VII. *Volva* (907).
114. *Campanulata* Corolla, Ventricoſa (890) abſque Tubo (857) Limbo (456) dilatato. *Campanula.*
115. *Canaliculatum* Folium, ſupra longitudinaliter ſulco profundo excavatum.

116. *Capillaris* Pappus (548) radiis ſeu pilis indiviſis. *Crepis.*

117. *Capillus*, Menſura, eſt diameter Crinis. *Lineae pars duodecima.*

118. *Capitulum* conſtat Floribus pluribus in Globum ferme congeſtis. (249) (361) (804) (503) (324) (295).

119. *Capſula*, Pericarpium (573) membranaceum cavum, determinate Valvis (884) dehiſcens. Conſtat *Valvis* (884). *Loculamentis* (463). *Diſſepimento* (259). *Seminibus* (712). *Proprio Receptaculo* (626) & *Columella* (149).

120. *Carina* Corollae Papilionaceae (545) conſtat duobus Petalis coadunatis, excipit & includit Stamina (771). Piſtillaque (598).

121. *Carinatum* Folium ſi pars prona ſ. inferior Diſci (257) prominet longitudinaliter, unde *Carina acuta, obtuſa ciliata*, in foliolis Calycis, & valvis (95). Glumae (364).

122. *Carnoſum* Folium, interne polpa ſolidiuſcula ſucculenta repletum. *Sedum.*

123. *Cartilagineum* Folium, cujus margo Cartilagine a ſubſtantia folii diverſiſſima firmatur.

124. *Caſtrata* Stamina (771) Antheris (41) deſtituta. *Geranium Herniaria.*

125. *Cauda* Filum nudum (*Geum urban.*) ſ. plumoſum (*Clematis vitalba*) Semen terminans. Unde:

126. *Caudata* Semina dicuntur.

127. *Caudex* dicitur Arborum Truncus. (850) eſtque adſcendens, ſ. deſcendens, (Radix).

128. *Caulescens* Planta, Caule inſtructa. Oppoſita Acaulis (4).

129. *Caulinum* Folium, Cauli (132) non Ramo inſertum.

130. *Caulinus* Bulbus (130) Cauli inſidens. Axillis. *Dentaria. Lilium.* Apice *Allium.*

131. *Caulinus* Pedonculus, e Caule, non ex ramo ortus.

132. *Caulis*, Truncus (850) proprius Herbae (375) elevat folia, fructificationemque (331).

133. *Cernuus* Pedunculus, cum apice incurvatur (402) ut Flos verſus latus vel Terram nutet. *Bidens cernua.*

134. *Ceſpitoſa* Planta, cum multi caules ex eadem Radice ſimul prodeunt.

135. *Ciliatum* Folium, cujus margo (473) ſetis parallelis longitudinaliter obvallatur. Baſi ciliata folia *Thymus. Serpillum.*

136. *Circinalia* Folia, *Vernatio*, ſ. *Spiralia*, quum Folia deorſum ſpiraliter involvuntur. *Filices.*

137. *Circumſciſſa* Capſula, (119) quae matuto fructu horizontaliter diſcedit. *Anagallis. Lyſimachia. Plantago.*

138. *Circumſcriptio* Folii, conſiderat Peripheriam Fol. ſimplicis, abſque ſinubus (745) & angulis (36). Idem ac Figura (805) (533) (527) (529) (516) &c.

139. *Circumſepiens* ſomnus (752), cum Folia (alias horizontaliter poſita) noctu eriguntur in formam Infundibuli (412).

140. *Cirrhoſum* Folium, quod terminatur Cirrho (142).

141. *Cirrhoſum pinnatum* Folium, eſt Pinnatum (693) terminatum Cirrho (142).

142. *Cirrhus*, eſt Vinculum filiforme ſpirale, quo Planta alio Corpori alligatur.

143. *Clavatus* Pedunculus, Clavaeformis ſ. verſus apicem ſenſim incraſſatus (400).

144. *Coadunata* Folia, quae invicem annectuntur, ut plura inter ſe baſi concreſcant.

145. *Coalitae* antherae (41) idem ac connatae (179).

146. *Coarctata* Panicula (543) ſ. *contracta*, cum Pedicelli (561) culmo approximantur.

147. *Coarctati* Rami (650), verſus ſummitatem fere incumbentes.

148. *Colorata* Folia, & omnes partes Plantae (excepta Corolla) dicuntur, quae alium colorem quam viridem induunt.

149. *Columella*, Capſulae (119) pars, connectens parietes (259) interius cum ſeminibus.

150. *Coma* conſtat Bracteis (99) quae Caulem terminant magnitudine inſignes *Fritillar. Coron. Imper.*

151. *Commune* Perianthium (572) plures flores congregatos continens cingensque.

152. *Commune* Receptaculum (661) plures flores eorumque fructus connectens.

153. *Communis* Gemma (344) flores & folia includens.

154. *Communis* { Pedunculus, pluribus floribus communis. / Petiolus plura quam unum adnectens folia. }

155. *Compactum* Folium, ſubſtantia ſolida conſtans.

156. *Compoſita* Corolla, pluribus conſtans floſculis intra commone Perianthium (151) ſupra Receptaculum commune (152).

157. *Compoſita* Fructificatio, (331) pluribus floſculis confluenribus.

158. *Compoſita* Spica (759) pluribus ſpicillis (760) pedunculo inſidentibus.

159. *Compoſita* Umbella (862) omnibus pedunculis apice Umbellulas (863) gerentibus.

160. *Compoſitum* Folium, Petiolo (154) plura quam unum proferente folia, ſecundum Gradus (367) compoſitionis.

   a. *compoſita* (61. 180. 247. 90. 560. 593. 86.)
   b. *decompoſita* (218).
   c. *ſupra decompoſita* (814.)

161. *Compoſitus* Caulis, in ramulos ſubdiviſus, deliqueſcens aſcendendo.

162. *Compoſitus* Flos (156), Receptaculo (152) dilatato integro floſculis ſeſſilibus antheris connatis. *Syngeneſia.* Eſtque 1. *Ligulatus* (455). 2. *Tubuloſus* (855). 3. *Radiatus* (638).

163. *Compoſitus* Pappus (548). Radiis ſ. pilis ramoſis (659) (605) inſtructus.

164. *Compoſitus* Racemus (635), ramoſus ſ. diviſus in plures.

165. *Compreſſa* Siliqua (729) lateribus oppoſitis proxime ad ſe invicem accedentibus.
166. *Compreſſum* Folium, eſt Polpoſum (630) lateribus magis quam diſco (257) complanatis.
167. *Compreſſus* Caulis, duobus lateribus oppoſitis fere planis.
168. *Concavum* Folium, Margine Diſco (257) arctiore, ut deprimatur Diſcus.
169. *Conceptaculum*, Folliculus (326).
170. *Conduplicans* Somnus (752) quando foliola ſibi invicem ut libri folia approximantur, ſuperiorem paginam tegentia.
171. *Conduplicata* a) Vernatio (891). b) Folia, cum folii latera *parallele* (*) ſibi invicem approximantur. *Quercus*; *Corylus*; *Carpinus*; *Fagus* &c.
172. *Conferta* Folia, cum ita copioſa, ut ramos occupent totos, vix relicto ſpatio.
173. *Confertus* verticillus (897), pedunculis approximatis.
174. *Confluentia* Folia, ad baſin inter ſe cohaereontia.
175. *Conglomerati* Flores ſ. Peduncoli, cum Pedunculus ramoſus flores ferat breviſſimis pedicellis, absque ordine arcte congeſtos & compactos. *Dactyl. glomer.*
176. *Conicum* Receptaculum (661) teres (816) verſus apicem attenuatum.
177. *Connata* filamenta (303) in unum corpus coalita *Monadelphia*.
178. *Connata* folia, ſi oppoſita (524) paria baſi utrinque inter ſe coadunantur.
179. *Connatae* Antherae (41) in unum Corpus concretae *Syngeneſia*.
180. *Conjugatum* Folium, Pinnatum (593) foliolis binis lateralibus, nec pluribus.
181. *Connivens* Corolla, cujus Limbi (456) lobi apicibus covergunt.

(*) *Lineae parallelae* ſunt rectae, aequali ubique ſpatio ſejunctae. *Geometr.*

182. *Connivens* Somnus (752) quando duo folia oppoſita, pagina (534) ſuperiore tam arcte ad ſe mutuo applicantur, quaſi unicum eſſet Folium.
183. *Contorſio* v. *Torſio* (830).
184. *Contortum* Pericarpium (573) cum Spiraliter contorquetur. *Medicago. Spirea. Ulmaria.*
185. *Convexum* Folium, Margine Diſco (257) arctiore inſtructum, ut elevetur diſcus.
186. *Convoluta* Folia, Vernatio (891) cum unius lateris margo ambit alterum ejusdem folii marginem inſtar cucalli (204).
187. *Convolutus* Cirrus (142) in annulos coototius.
188. *Corculum*, novae Plantae primordium intra ſemen, conſtat Plumula (606) & Roſtello (695).
189. *Cordato-oblongum* folium, oblongum (516) angulis poſticis obtuſis ſinis, baſi excavatum.
190. *Cordato-lanceolatum*, lanceolatum (447) angulis poſticis obtuſis, baſi excavatum.
191. *Cordato-ſagittatum*, ſagittatum (700) marginibus verſos angulos convexis.
192. *Cordatum* Folium, ovatum (533) baſi ſinu (745) excavatum, angulis poſticis deſtitutum.
193. *Corolla* Liber (alburnum) Plantae (600) in flore (316) praeſens, eſtque Monopetala (485) Tubo (857) & Limbo (456), vel Polypetala (611) Ungue (868) & Lamina (443) conſtans.
194. *Corolla* eſt Compoſiti floris (162) Corolla partialis.
195. *Corona*, *Coronula* Seminis, Calyculus ſupra adbaereos, quo volitat. *Scabioſa. Dipſacus.*
196. *Coronata* Semina, 1) Pappum (548). (*Hieracium. Crepis. Picris*) vel 2) Perianthium parvum, (195) (*Scabioſa*) vel 3) Setas hiſpidas (*Bidens*) ſupra adfixa habent.
197. *Corticalis* Gemma (344) e corticis ramentis confecta.
198. *Corymbus* fit ex Spica, (759) dum ſinguli florea pedunculis propriis inſtruuntur, ſitu elevato proportionali. *Tetradynamia.*

199. *Cotyledon*, Corpus laterale ſeminis (712) bibulum Caducum, unde *Acotyledones* (8), *Monocotyledones* (482) & *Dicotyledones* (241).

200. *Crenatum* Folium, margine inciſuris ſine reſpectu extremitatis ſecto, unde *acute-obtuſe crenatum duplicato crenatum*, crenis iterum crenatis.

201. *Criſpum* Folium, margine luxuriante, ut Diſcus (257) evadat major, ſua Rachi (637. b.) omnia folia criſpa ſunt monſtroſa. *Malva criſpa. Lepid. naſturt.*

202. *Cruciformis* ſ. *Cruciata* Corolla, Petalis (581) quatuor aequalibus parens. *Tetradynamia.*

203. *Cubitus*, *Cubitalis*, Menſura, & flexura Cubit. ad extimum apicem Digiti intermedii. *Unciae ſeptemdecim.*

204. *Cucullatum* Folium, lateribus ad baſin conniventibus, apice vero dilatatis.

205. *Culmus*, Truncus (850) Graminibus proprius, elevat Folia fructificationemque, plerumque geniculatus (348) Articulis inanibus. Europaei annui (39) omnes.

206. *Cuneiforme* ſ. cuneatum Folium, ſenſim verſus baſin angulatum.

207. *Cuneiforme emarginatum* Folium (206) apice ſinu excavatum.

208. *Cuſpidatum* Folium, terminatum apice ſetaceo rigidiuſculo.

209. *Cyathiformis* Corolla, cum ex cylindro (*) ſuperne parum dilatata eſt.

210. *Cylindrica* Spica (759) cylindriformis ſ. tereti-uſcula, *ſecunda* vero dimidiata.

211. *Cyma*, Receptaculum omnes pedunculos primarios ex Centro eodem univerſali educens, partiales vero vagos ſpargens. V. *Opulus.*

D.

212. *Daedaleum* Folium, una flexuoſum lacerumque (435).

(*) *Cylindrus* oritur, circulo ad lineam rectam, motu parallelo, deſcendente, *Geometr.*

213. *Decidua* Corolla, cum floris caſu. *Pleraeque.*
214. *Deciduum* Folium, peracta unica aeſtate caſurum.
215. *Declinatum* Folium, deorſum flexum inſtar Carinae Naviculae.
216. *Declinatus* Caulis, arcuatim deſcendens.
217. *Decompoſita* Umbella (862) ſ. *Prolifera*, ſi ex umbellula (863) ſimplici, aliae enaſcuntur umbellulae. Gradu iterum aucto dicitur *ſupradecompoſita.*
218. *Decompoſitum* Folium, cum Petiolus ſemel diviſus adnectit foliola (323) plura. (85. 93. 92).
219. *Decompoſitus* Flos, compoſitus (162) ex *compoſitis*, continet intra Calycem communem (151) minores Calices, communes multis floribus. *Spaeranthus.*
220. *Decumbens* Caulis, procumbens (618) altiore baſi.
221. *Decurrens* Folium, baſi folii deorſum per caulem extenſa. *Carduus*, v. *Thapſus.*
222. *Decurrens* Petiolus, lateribus deorſum per caulem vel Ramum extenſis.
223. *Decurſive pinnatum* Folium, Pinnatum (593) foliolis (323) decurrentibus (221) per petiolum.
224. *Decuſſata* Folia, ita oppoſite (524) diſpoſita, ut rami apice inſpecto, quatuor ordines referant.
225. *Deflexi* Rami, arcuatim deorſum inclinati.
226. *Defoliatio*, Tempus autumnale, quo Arbores folia dejiciunt.
227. *Dehiſcentia*, Tempus quo fructus maturus ſemina diſpergit; ſitque apice (*Ceraſtium*) baſi (*Triglochin*) angulis (*Oxalis*) Poro, (*Campanula*) horizontaliter (137) vel articulate (59).
228. *Deltoideum* Folium, Rhombeum (694) ex quatuor angulis, quorum laterales minus a baſi diſtant, quam reliqui.
229. *Demerſum* Folium, quod intra aquae ſuperficiem abſconditur.
230. *Dentata* Radix, moniliformis, ex articulis concatenatis.

231. *Dentato Sinuatum*, Dentatum (232) Sinubusque excavatum.
232. *Dentatum* Folium, quod acumina horizontalia, folii conſiſtentia, ſpatio remota habet.
233. *Dependens* Folium, quod recta terram ſpectat.
234. *Dependens* Somnus (752) foliolis demiſſis.
235. *Depreſſum* Folium, Pulpoſum (630) Diſco (257) magis quam lateribus complanato.
236. *Determinatio* Foliorum (317) non a propria. Structura, ſed a loco (465) Situ (746) Inſertione (413) & Directione (255) ſ. Expanſione, deſumitur.
237. *Dextrorſum* (743).
238. *Dichotomus* Caulis, bifariam ſemper diviſus.
239. *Diclinia*, Flores maſculi (476) & feminei (300) in eadem ſpecie, ſed diſtinctis Thalamis, gaudentes. Comprehendit, a. *Monoeciam*, b. *Dioeciam*, & c. *Polygamiam*.
240. *Dicocca* Capſula (242).
241. *Dicotyledones*, foliis ſeminalibus duobus ſub ſeminis germinatione *Plantae* (600).
242. *Didyma* ſ. *Dicocca* Capſula, duobus nodis extus gibba. *Didyma* Anthera, duobus globulis diſtinctis, latere connatis. *Mercurialis*.
243. *Difformia* Folia, ſi in eadem planta variant figura. *Ranuncul* ▽. *Rudbeck. lacin.*
244. *Difformis* Corolla, Irregularis (430).
245. *Diffuſa* Panicula (543) cum laxe divaricantur pedicelli (561) angulis rectis ſ. obtuſis (12. in not.)
246. *Diffuſus* Caulis, Ramis abſque ordine patentibus.
247. *Digitatum* Folium, cum Petiolus ſimplex, ſeu indiviſus, adnectit foliola (323) plura.
248. *Dimidiata* Spatha (756) latere tantum interiore fructificationem (331) obveſtiens.
249. *Dimidiatum* Capitulum (118) ab altero latere rotundum, ab altero planum.
250. *Dimidiatum* Involucellum (425) extrorſum ſitum, eſtque patens vel dependens. *Aethuſa*.

251. *Dioica* Planta, quae flores maſculos (476) & fœmineos (300) in diſtincto individuo profert. *Dioecia.*
252. *Diphyllus* Pedunculus, foliolis duobus oppoſitis inſtructus.
253. *Diphyllum* Perianthium (486).
254. *Dipetala* Corolla (485).
255. *Directio*, fol. (236) eſt expanſio, quam Folia a baſi ad apicem adquirunt (288. 791. 49. 385. 558. 410. 662. 514. 682. 667. 688. 233. &c.)
256. *Diſcus* Floris, in compoſito radiato (638) pars media, ex corollulis (194) minoribus regularibus (672) conſtat.
257. *Diſcus* Folii ſ. Pagina (534) dicitur folii ſuperficies, (811) ſuperior, plerumque coelum ſpectans.
258. *Diſſectum* Folium, laciniatum (438) Inciſum (398).
259. *Diſſepimentum*, Paries quo Fructus (119. 573. 729.) interne diſtinguitur in concamerationes (463) plures, *Parallelum* (887) *contrarium* (886).
260. *Diſtans* Verticillus (897) pedunculis remotis.
261. *Diſticha* Folia, duo latera rami tantum reſpicientia, licet undique inſerta.
262. *Diſticha* Spica (759) floribus ad utrumque latus ſpectantibus, unde tetrasticha, hexaſticha, a numero ordinum.
263. *Diſtichus* Caulis, Ramos ſitu horizontali, nec decuſſatim (224) ſitos, exſerit.
264. *Diſtinctae* Antherae (41) inter ſe non cohaerentes.
265. *Divaricata* Panicula (543) cum ſtricte divaricantur pediculi ad angulum obtuſum ſ. rectum (12. in not.)
266. *Divaricati* Rami, a trunco ad angulum obtuſum diſcedentes.
267. *Divergens* Somnus (752) ſi foliola baſi approximantur, apicibus vero patent.
268. *Divergentes* Rami, a trunco ad angulum rectum diſcedentes.
269. *Dodrans*, *dodrantalis* (Menſura) eſt ſpatium inter apicem Pollicis & Indicis extenſum. *Unciae ſeptem.*

270. *Dolabriforme* Folium, Compreſſum (166) ſubrotundum (805) extrorſum gibbum (353) acie acuta, inferne teretiuſcula.

271. *Dorſalis* Ariſta (54) lateri exteriori Glumae (364) adfixa.

272. *Drupa*, Pericarpium (573) farctum evalve, continens Nucem (511) eſtque *Sicca* (727) vel *Succulenta* (808).

273. *Duplicato crenatum* Folium (200).

274. *Duplicato pinnatum* Fol. (92.)

275. *Duplicato ſerratum* Fol. (720).

276. *Duplicato ternatum* Fol. (93.)

277. *Duratio* Foliorum, reſpicit Tempus a frondeſcentia (328) uſque ad caſum eorum (214. 109. 577. 569. 718.)

E.

278. *Ebracteatus* Pedunculus. Bracteis (99) deſtitutus.

279. *Echinatum* Pericarpium, (571) cum aculeis (11) ſeu Spinis (761) undique adſperſum. *Datura Stramon.*

280. *Efflorescentia* eſt Tempus Menſis, quo ſingulae ſpecies Plantarum primos Flores oſtendunt.

281. *Ellipticum* Folium, Lanceolatum (447) latitudine Ovati (533) folii.

282. *Emarginatum* Folium, quod terminatur Crena. Unde *acute*, *obtuſe* emarginatum.

283. *Enerve* Folium, Nervis deſtitutum. Nervoſo (497) oppoſitum.

284. *Enodis* Culmus, qui continuus eſt, nec articulis (65) interceptus.

285. *Enſiforme* Folium, anceps (31) a baſi ad apicem ſenſim attenuatum.

286. *Equitantia* Folia. Vernatio. Marginibus convenientia (182) ſitu oppoſito, ut alterum includat alterum. *Acorus. Carex. Iris.*

287. *Erecta* anthera (41) quae baſi adfigitur filamento (303.)

288. *Erectum* Folium, ſ. caulis fere ad perpendiculum conſtitutus.
289. *Erectus* Culmus, ſitu ſubperpendiculari, articulis infimis ſaepe obliquis.
290. *Eroſum* Folium, ſinuatum (744) ſinubus minimis obtuſis laciniiſque inaequalibus inſtructum.
291. *Extrafoliacei* Pedunculi, ſ. Stipulae (781) infra folium collocatae.

F.

292. *Farctum* Folium, medulla farctum, non tubuloſum (856).
293. *Faſcicularis* Radix, e partibus carnoſis baſi ſeſſili connexis.
294. *Faſciculata* Folia, plura ex eodem puncto prodeuntia. *P. Larix.*
295. *Faſciculus*, Capitulum (118) colligens flores erectos parallelos faſtigiato-approximatos. *Dianth. barb*,
296. *Faſtigiati* Flores, Faſciculus (295) floribus omnibus aequalis altitudinis.
297. *Faſtigiatus* Caulis, Ramis omnibus aequali altitudine.
298. *Faux* Corollae, hiatus inter lacinias (437) Corollae Ringentis (693), ubi tubus (857) terminatur.
299. *Femina* Planta (600) quae flores tantum femineos (300) profert.
300. *Femineus* Flos, qui Piſtillum (598) absque ſtaminibus (771) habet.
301. *Feminina* Genitalia (350) ſunt Stigmata (775) germinibus (351) ubique adnexa.
302. *Fibroſa* Radix, tota conſtans filamentis ſimplicibus vel Ramoſis.
303. *Filamentum*, pars Floris (316) elevans adnectensque antheram (41).
304. *Filiforme* Folium, longiſſimum latitudine & craſſitie aequali.
305. *Filiformis* pedunculus, aequabili ubique craſſitie.
306. *Fiſſum* Folium, diviſum ſinubus (745) linearibus, marginibus rectis, *bi-tri-quinque multifidum* (83).

307. *Fiſtuloſus* Caulis, interne tubuloſus non farctus (292).
308. *Flaccidus* Pedunculus, debilis, ut a proprio floris pondere dependeat.
309. *Flexuoſus* Caulis, a Gemma (344) ad Gemmam horſum vorſum actus.
310. *Flexuoſus* Pedunculus, a flore ad florem flexus. *Aira flexuoſa.*
311. *Florale* Folium, Flori proximum: differt numero & figura.
312. *Floralis* Gemma (344) flores non folia continens.
313. *Floreſcentia* eſt Generatio, ſiſtens Plantarum ſponſalia in flore, & Nuptias in Anthefi (43).
314. *Floris* Perianthium ſ. Calyx, Stamina continet absque Germine.
315. *Floris* Receptaculum, baſis, ubi floris partes absque Germine adſiguntur.
316. *Flos*, Conſtat Calyce, Corolla (193) Stamine (771) & Piſtillo (598) antecedit omnem fructum, ut Generatio Partum.
317. *Folia*, Organa motus Plantae (600) conſiderantur ſecundum a) Simplicitatem (734), b) Compoſitionem (160), c) Determinationem (286), & Durationem (277).
318. *Foliacea* Spica (759) foliis interſtincta.
319. *Foliaris* Cirrhus (142) folio inſidens.
320. *Foliaris* Gemma (344) Folia continens, non flores.
321. *Foliatio*, Vernatio (891).
322. *Foliatus* Caulis, foliis inſtructus.
323. *Foliolum*, partiale eſt Folii compoſiti (160).
324. *Folioſum* Capitulum (118) foliis intermixtis floribus.
325. *Folium* (325) expandens per aëra ſuperficiem: attrahit praeparatque humores, volatile, a caſu nunquam renaſciturum.
326. *Folliculus* (169), Pericarpium (573), membranaceum univalve, altero latere longitudinaliter dehiſcens proprio Receptaculo (nec ſuturae) ſemina adfigens. *Aſclepias.*

327. *Fornicata* Corolla, dicitur ſi labium ſuperius Ringentis (693) fornicis io modum arcuatum. *Galeopſis. Lamium.*

328. *Frondeſcentia*, eſt Tempus aeſtatis, quo ſpecies ſingulae plantarum prima folia explicant.

329. *Frons*, ex Stipite (777) in folium tranſeunte facta, fructificationes in averſa folii parte, gereos. *Filices.*

330. *Fructeſcentia*, comprehendit tempus, quo Semina matura diſpergunt Plantae.

331. *Fructificotio*, Vegetabilium pars temporaria, generationi dicata, eſtque ſimplex (735) vel compoſita (157).

332. *Fructificationis* partes, ſeptem numerantur. 1) Calyx (113) ſ. Perianth. 2) Corolla (193). 3) Stamen (771). 4) Piſtillum (598). 5) Pericarpium (573). 6) Semen (712) & 7) Receptaculum (661).

333. *Fructificationis* Calyx ſ. Perianth. Germen (351). Staminaque includens.

334. *Fructificationis* Receptaculum (661), pro flore & fructu commune.

335. *Fructus* Perianthium, (572) ſ. Calyx, Germen abſque Staminibus (771) cootinens.

336. *Frutex*, Caudex perennis ſupra terram adſcendens abſque Gemmis (344).

337. *Fruticoſus* (336) Caulis, perennis, cum caudicibus pluribus.

338. *Fulcra*, adminicula Plantae (600) pro commodiore ſuſtentatione. Septem oumerantur ſpecies: 1) Stipulae (781). 2) Bractea (99). 3) Pubes (628). 4) Glandula (356). 5) Spina (761). 6) Aculeus (11). 7) Cirrhos (142).

339. *Fulcrati* Rami fulcris inſtructi.

340. *Furcatae* Setae (726). Ramoſae ſ. ſubdiviſae quaſi in ramulos. *Leontodon hiſpid. Arabis thal.*

341. *Fureae*, aculei (11) ramoſi ſ. triplices. *Berberis. Ribes uvacr.*

342. *Fuſiformis* Radix (648), Simpliciuſcula, oblonga, craſſa, verſus baſin ſenſim attenuata. *Daucus.*

G.

343. *Galea*, Corollae ringentis (693) labium ſuperius.
344. *Gemma*, Hybernaculum (387) Plantae (600), ex rudimentis foliorum futurorum.
345. *Gemmatio*, eſt Gemmae (344) conſtructio, ex Foliis, Stipulis (781) Petiolis (585) aut Squamis.
346. *Gemmina* Folia, Trina, quaterna &c. duo, tria, quaterna &c. ex eodem puncto prodeuntia.
347. *Geniculata* Ariſta (54) articulatione inſtructa. *Agroſt. canina.*
348. *Geniculatus* Culmus, geniculis (349) intercceptus.
349. *Genicula* Nodi, in culmo (205) Articulis (65) interjecti.
350. *Genitalia* Plantarum, Organa ſexualia, Stamina (771) & Piſtilla (598. 301. 475.)
351. *Germen*, Rudimentum Fructus immaturi in flore: eſtque inferum (407) vel ſuperum (812).
352. *Germinatio* eſt Tempus quo Semina Terrae mandata, eadem excludunt, in Cotyledonum (199) proventum.
353. *Gibbum* Folium, utraque ſuperficie (811) convexa (185) mediante copioſiori pulpa.
354. *Glaber* Caulis, ſuperficie laevi & lubrica.
355. *Glabrum* Folium, Diſco (257) laevi & lubrico, abſque omni inegalitate.
356. *Glandula*, Papilla humorem excernens, eſtque ſeſſilis vel ſtipitata.
357. *Glandulatio*, Vaſa ſecretoria offert, Glandulae (356) & Utriculi (879).
358. *Glanduloſum* Folium, quod Glandulas (356) infidentes gerit. vel in dorſo, vel in ſerraturis. *Salix.*
359. *Globoſa* Corolla, Sphaerica, Globum referens. Vaccin. *Myrtillus. R. Convallar.*
360. *Globoſa* Radix, ſubrotunda, carnoſa, radiculis lateralibus. *Bunium.*

261. *Globoſum* Capitulum (118) ab omni parte rotundatum. *Echinops.*
362. *Glochides*, mucrones apice retrorſum multidentati.
363. *Glomerata* Spica (759) Spicillis (760) varie congeſta.
364. *Gluma*, Calyx (113) Graminis, valvis amplexantibus.
365. *Glutinoſitas*, eſt qualitas humoris lubrici.
366. *Glutinoſum* Folium, humore lubrico (365) illitum.
367. *Gradus* foliorum, in Compoſitis (160) conſiderant ſubdiviſionem petioli communis (154) in Compoſitis (160) Decompoſitis (218) & Supradecompoſitis (814).
368. *Graminea* Folia, linearia (458) ſenſim verſus apicem anguſtata. Coalitant folio, vagina (880) & ligula (453).
369. *Granulata* Radix, particulis ſphaericis carnoſis adſperſa. *Saxifraga.*
370. *Gymnoſperma* Planta, Semina nuda, nec Pericarpio (573) tecta. Gymoo mono-di-tri-tetraſperma. *Didynamia Gymnoſp.*

H.

371. *Habitationes* Plantarum, ex loco ubi ſponte proguaſcuntur, reſpiciunt ſolum f. Telluris naturam.
372. *Habitus*, eſt conformitas Vegetabilium, affinium & congenerum, in Placentatione, Foliatione &c.
373. *Hami*, mucrones acuminati, curvati, quibus quasdam Plantarum partes adhaerent animalibus praetereuntibus. *Arctium.*
374. *Haſtatum* Folium, Sagittatum (700) angulis poſticis acutis ſinu diviſis, ad latera prominentibus, patulis. *Rumex acetoſella.*
375. *Herba* eſt, cujus caulis ſingulis annis perit: eſtque a) anoua, b) bima ſ. biennis ſeu c) ſempervirens. Conſtat Hybernaculo (387) Trunco (850), Folio (325), & Fulcro (338).

376.

376. *Herbarium*, Collectio Plantarum intra chartas ſiccatarum aſſervatarumque, omni Botanico neceſſarium.
377. *Herbaceus* Caulis, etiamnum annuus, non lignoſus.
378. *Hermaphrodita* Planta, quae flores tantum Hermaphroditos (381) gerit.
379. *Hermaphrodita* (*polygamiae*) Flos, quorum antherae non dehiſcunt, ſed decidunt, & Piſtillum mox in fructum, ab antheris alterius floris (380) foecundatum, excreſcit. A parte maſculina ſterilis dicitur. *Acer.*
380. *Hermaphroditus* (Polygamiae) Flos, quorum antherae pollen pluunt, Piſtilla vero ob labem Stigmatis non accreſcunt, ſed decidunt, a parte feminea ſterilis dicitur. *Acer.*
381. *Hermaphroditus* Flos, Piſtillo (598) Stigmate (775) & Antheris (41) inſtructus.
382. *Heteromalla* Panicula, Secunda (710).
383. *Hilum*, cicatrix externa Seminis, ab ejusdem adfixione in fructu.
384. *Hiſpidum* Folium, ſetis rigidis adſperſum.
385. *Horizontale* Folium, quod ad Angulum rectum (12. in not.) a Caule diſcedit.
386. *Horizontalis* Radix, quae ſub terra transverſim extenditur. *Iris.*
387. *Hybernaculum*, Compendium Herbae (375) totius, ſquamoſum. Eſtque Bulbus (106) vel Gemma (344).
388. *Hybrida* Planta. Polygama (610).
389. *Hypocrateriformis* Corolla. Limbus (456) planus tubo (857) impoſitus.

I

390. *Imbricans* Somnus, (752) foliolis imbricatim (391) complicatis.
391. *Imbricata* Folia, quando parallele ſuperficie recta ſibi invicem incumbunt, & ſe quo ad partem tegunt. *Vernatio* (872) imbricata. *Syringa. Lyguſtrum. Daphne.*
392. *Imbricatum* Perianthium (572) ſquamis variis imbricatim (391) ſuperimpoſitis. *Hieracium.*

393. *Imbricatus* Caulis, ſquamis tectus, ut ſuperficies non appareat.

394. *Inanis* Caulis, interne medulla Spongioſus.

395. *Inaequalia* Filamenta (303) aliquot majoribus vel minoribus. *Daphne. Didynam.*

396. *Inaequalis* Corolla, ubi partes non magnitudine, ſed proportione reſpondent, ut Regularis flos evadat. *Butomus.*

397. *Incana* Folia, Tomentoſa (827) colore glauco, ſ. fere argenteo.

398. *Inciſum* Folium, Laciniatum (438).

399. *Includens* Somnus (752), cum folia alterna (27) noctu ſe cauli approximant.

400. *Incraſſatus* Pedunculus, apice ſenſim majorem molem adquirens.

401. *Incumbens* Anthera, ſ. Verſatilis, quae latere filamento (303) adfigitur.

402. *Incurvati* Rami, introrſum nutantes.

403. *Incurvum* Folium (410).

404. *Incurvus* Aculeus (11) introrſum flexus.

405. *Indiviſum* Folium, integrum (416) Sinubus (745) deſtitutum.

406. *Inerme* Folium, Spinis (761) aculeis (11) & Stimulis (776) deſtitutum.

407. *Inferum* Germen (351) infra Corollam poſitum.

408. *Inferus* Flos, ſ. Calyx, cui Germen (351) ſupra Receptaculum (661), ſ. cujus Piſtillum abit in fructum. Tourn.

409. *Inflatum* Perianthium, inſtar Veſicae cavum. *Cucub. Behen.*

410. *Inflexum* Folium, ſ. incurvum, dum ſurſum arcuatur verſus caulem.

411. *Infloreſcentia*, eſt modus, quo Flores Pedunculo Plantae adnectuntur: 1) Verticillus (897). 2) Capitulum (118). 3) Spica (759). 4) Corymbus (198). 5) Thyrſus (826). 6) Racemus (635). 7) Panicula (543).

412. *Infundibuliformis* Corolla, ſi limbus (456) conicus tubo (857) impoſitus.
413. *Inſertio* Foliorum, reſpicit modum, quo folia Plantae adnectuntur (584. 567. 721. 13. 144. 30. 571. 178. 882.)
414. *Inſertus* Petiolus, perpendiculariter ramo inſidens.
415. *Integer* Caulis, ſimpliciſſimus (742) ramis anguſtatis.
416. *Integrum* Folium, indiviſum (405) omnique ſinu (745) deſtitutum.
417. *Integerrimum* Folium, margine continuo nec minimum ſecto.
418. *Interfoliucei* Pedunculi, inter Folia oppoſita, ſed alternatim collocati. *Aſclepias.*
419. *Internodum* (65) quod inter artus vel Genicula (349) medium intercedit. Eſtque convexum, concavum, vel planum.
420. *Interrupta* Spica (759) Spicis minoribus alternis diſtantibus.
421. *Interrupte Pinnatum* Folium, ſeu *Foliolis ruptis*, Pinnatum (593) foliolis alternis minoribus.
422. *Intorſio* v. Torſio (830).
423. *Intrafoliaceae* Stipulae (781) ſupra folium ſ. petiolum collocatae.
424. *Invertens* Somnus (752) foliolis demiſſis & ſimul inverſis.
425. *Involucellum*, eſt partiale Involucrum (427) umbellulae (863) ſubjectum (260).
426. *Involucratus* Verticillus (897) ſ. umbella (862) involncro (427) inſtructus. Oppoſitus *Nudo.*
427. *Involucrum*, Calyx (113) umbellae (862) a flore remotus. Eſt mono-di-tri-penta-polyphyllum, vel nullum.
428. *Involuta* Vernatio (891), Folia, quorum margines laterales utrinque introrſum ſpiraliter involvuntur. *Pyrus. Malus. Populus.*
429. *Involvens* Somnus (752) quando foliola erecta apice connivent, & cavitatem inter ſe formant.

430. *Irregularis* Corolla. (Difformis, Anomala). Limbi (456) partibus, figura, magnitudine, & proportione diverſis. *Aconitum.*

431. *Iſthmis interceptum* Legumen (452) interne transverſim in varia loculamenta (463) diviſum.

L.

432. *Labiata* Corolla, Ringens (693) bilabiata. Labium ſuper. & inferius.

433. *Labium* ſ. Barba (76) Corollae, pro ringentis (693) labio inferiore ſaepe ſumitur.

434. *Lacera* Corolla, cujus limbus (456) tenuiſſie diſſectus eſt.

435. *Lacerum* Folium, margine varie diviſum: Segmentis difformibus.

436. *Laciniae* Calycis ſ. Perianthii, numerantur praeſertim in monophyllo (486).

437. *Laciniae* Corollae, numerus in Monopetala (486) a medio limbi (456) in Polypetala (611) laminae (443) deſumitur.

438. *Laciniatum* Folium, varie & indeterminate in partes ſectum.

439. *Lacteſcentia* eſt copia Liquoris, qui effluit laeſa planta, eſtque alba (*Euphorbia*) lutea (*Chelidon.*) vel rubra. (*Rumex Sangu.*)

440. *Lacunoſum* Folium, Diſco (257) depreſſo (235) inter venas interjectas. *Lich. pulmon.*

441. *Laevis* Caulis, folium, ſuperficie aequali.

442. *Lamellae*, membranae transverſae fructificantes, Pileo (586) Fungorum ſubtus adnatae.

443. *Lamina*, Corollae Polypetalae (611) pars ſuperior patula.

444. *Lana* Species Pubis (628), Pili (591) curvi denſi, ſervat plantam ab aeſtu nimio. *Stachis german.*

445. *Lanatum* Folium, pilis incurvatis imbricatis, quaſi tela araneae indutum. *Salvia.*

446. *Lanceolato*-ovatum Folium, Lanceolatum (447) ad ovatam (533) figuram ſubaccedens.

447. *Lanceolatum* Folium, oblongum (516) ab utraque Extremitate attenuatum.
448. *Laterales* Stipulae (781), Lateribus Petioli ſeu foliorum inſerti.
449. *Laterifolii* Pedunculi, ad latus baſeos folii inſerti. *Solanum.*
450. *Laxa* Panicula (543) Pedicelli debiles, libere & laxe ſine ordine Sparſi.
451. *Laxi* Rami, libere in arcum flexiles.
452. *Legumen*, Pericarpium (573) membranaceum bivalve, adſigens ſemina ſecundum ſuturam alteram tantum, eſtque 1) uni- 2) biloculare 3) vel Iſthmis interceptum (431). 1) *Vicia. Piſum.* 2) *Aſtragalus.*
453. *Ligula*, membrana tenuis Oris foliorum, in graminibus, eſtque truncata, lanceolata, bifida, fiſſa &c.
454. *Ligulata* Corolla, ſimplex, tubo brevi, limbo (456) plano extrorſum vero, apice acuto, vel truncato tri ſ. quinquedentato.
455. *Ligulatus* Flos, compoſitus (162) Corollulis floſculorum omnibus planis imbricatis verſus exterius latus expanſis (454).
456. *Limbus* Corollae monopetalae (485) pars ſuperior dilatata.
457. *Linea* Linearis menſura, eſt Lunulae longitudo, ab unguis radice verſus ungnem extenſa. (non vero in Pollice.) *Linea una.*
458. *Lineare* Folium, aequali ubique latitudine, interdum utraque extremitate anguſtatur.
459. *Lineari*-lanceolatum Folium, Lineae (457) ad lanceolatam (447) figuram accedens.
460. *Lineatum* Folium, nervis depreſſis excavatum. *Euphraſia.*
461. *Lingulatum* ſ. *Linguiforme* Folium, lineare (458) Carnoſum (122) ſubtus convexum (185).
462. *Lobatum* Folium, usque ad medium in partes diſtantes divíſum, unde biloba- triloba- &c. a numero Loborum.

463. *Loculamentum* Capſulae (119) Concameratio cava, pro ſeminum loco.
464. *Loculare* (88) Pericarpium, uni- bi- tri- quadri-quinque &c. loculare, a numero loculamentorum.
465. *Locus*, in Determinatione (236) Folii reſpicit partem plantae, qua folia adnectuntur (715. 640. 129. 73. 311)
466. *Longus* Petiolus, longitudinem folii ſuperans.
467. *Longiſſimus* Petiolus, aliquoties folii longitudinem ſuperans.
468. *Lucidum* Folium, quaſi illuminatum.
469. *Lunatum*, *Lunulatum* Folium, ſubrotundum (805) baſi ſinu excavatum, angulis poſticis acutis.
470. *Lyratum* Folium, transverſim diviſum in lacinias (438) quarum inferiores minores remotioresve, terminalis maxima.

M.

471. *Maculatum* Folium, Colorati (148) Species. Albo maculata, (*Trifol. repens*) nigro - maculata, (*Arum Orchides*) rubro-maculatae. (*Ranunc. acris.*)
472. *Marceſcens* Corolla, contabeſcens, nec decidens. *Campanula. Orchis.*
473. *Margo*, eſt extrema ora folii ad latera, intacto diſco Folii (763. 720. 677. 232. 200. 123. 135. 290. 435. 416.)
474. *Mas* Planta, quae flores tantum maſculos (476) profert.
475. *Maſculina* Genitalia (350) ſunt Antherae (41) Polline (607) repletae.
476. *Maſculus* Flos, ſi ſtamina (771) ſine Stigmatibus (775) continet.
477. *Mediocris* Petiolus, longitudine folii.
478. *Membranaceum* Folium, quod inter utramque ſuperficiem nulla evidenti pulpa ſcatet.
479. *Membranatus* Caulis, Complanatus more folii.
480. *Menſura*, qua in Dimenſione partium Plantae utimur: Capillus (117) Linea (457) Unguis Pollex (608)

Palmus (541) Dodrans (269) Spithama (767) Pes (579) Cubitus (203) Brachiom (98) Orgya (528.)

481. *Monoclinia*, Flores omnes Hermaphroditi (381) ſ. Stamina (771) cum Piſtillis (598) in eodem flore. Comprehendit Claſſes Plaotarum a Monandria usque ad Polyadelphiam, incluſive.

482. *Monocotyledones*, unico Cotyledone (715) germinantes. Fruges ſ. *Palmae. Gramina. Lilia.*

483. *Monogynia*, *Digynia*, *Trigynia* &c. id eſt Piſtillo unico, duobus, tribus &c. inſtructi flores. Numerus deſumitur a baſi Styli (796) ſi Stylus autem deficiat, (*Myriophylum*) a numero Stigmatum calculus ſit.

484. *Monoica* Planta, (*Androgyna*) qoae flores maſculos (476) & ſemineos (300) diſtinctos in eadem planta gerit. *Monoecia.*

485. *Monopetala* Corolla, ſ. Petalo unico conſtans. Staminibus (771) Semper Petalo inſertis, exceptis Bicornibus (80).

486. *Monophyllus* Calyx ſ. Perianth. unico ſoliolo abſolutum, quoties monopetala (485) Corolla eſt, unde di-tri-tetra-penta-hexaphyllus, &c. a numero foliorum.

487. *Monoſperma*, di-tri-tetra, penta-hexa polyſperma capſula, a numero ſeminum quae includit.

488. *Monoſtachius* Culmus, uoicam Spicam gerens. *Lolium.*

489. *Mucronatum* Folium, terminatum mucrone exſtante.

490. *Multiflora* Gluma (364) plures flores includens.

491. *Multivalvis* Gluma (364) pluribus quam duabus Squamis conſtans.

492. *Muniens* Somnus (752) dum Folia (antea horizontaliter pateotibus petiolis) circumcirca dependent, & quaſi fornicem formant.

293. *Muricatus* Caulis, punctis ſubulatis mollibus adſperſus.

494. *Mutica* Gluma (364), Mucrone ſ. Ariſta deſtituta.

N.

495. *Natans* Folium, ſuperficiei aquae incumbens, ſ. innatans. *Potamogeton.*
496. *Nectarium*, Pars mellifera flori propria, eſtque proprium (625) vel Petalinum (580).
497. *Nervoſum* Folium, venis ſimpliciſſimis eminentibus a baſi ad apicem extenſis.
498. *Neuter* Flos, qui neque Stamina (771) neque Stylum (796) vel Stigma habet. *Coreopſis. Rudbeckia.* (Radius).
499. *Nidulantia* Semina, per pulpam absque ordine Sparſa, in Baccis (75).
500. *Nitidum* Folium, Glabritie lucente.
501. *Nodi*.. *Nodoſus* (349).
502. *Nucleus*, Pars edulis Fructuum, in oſſea Capſula, Nuce (511) recondita.
503. *Nudum* Capitulum (118) foliis & ſetis deſtitutum.
504. *Nudum* Folium, Setis & Pilis (591) deſtitutum.
505. *Nudum* Receptaculum (661) ſuperficie nec villis nec paleis (536) tectum.
506. *Nudus* Caulis, Foliis deſtitutus. *Cuſcuta.* Oppoſito Foliato (322) & imbricato (393).
507. *Nudus* Flos, caret Calyce, non Corolla.
508. *Nudus* Verticillus (897) nec bracteis (99) nec Involucro (427) inſtructus.
509. *Nutans* Caulis, apice extrorſum reflexus.
510. *Nutans* Flos, non proprio Pondere, ſed peculiari ſtructura Pedunculi, extrorſum reflexus. *Carduus. Nutans.*
511. *Nux*, ſemen tectum epidermate oſſea; uni ſ. bilocularis. Nucleum (502) condens.

O.

512. *Obcordatum*, Obverſe cordatum (521) (192).
513. *Obliqua Calyptra* (112) ad aliquod Latus flexa.
514. *Obliquum* Folium, baſi coelum, apice horizontem ſpectans.

515. *Obliquus* Caulis, a perpendiculari aut horizontali Linea diſcedens.

516. *Oblongum* Folium, Diametro (*a*) longitudinali aliquoties ſuperante transverſalem.

517. *Obovatum* Folium, obverſe Ovatum (533. 521.)

518. *Obtuſe Crenatum* Folium (200).

519. *Obtuſum* Folium, intra ſegmentum (*b*) circuli terminatum.

720. *Obtuſum* acumine, Obtuſum (519) nervo medio apice prominulo.

521. *Obverſa* Folia, quorum baſis anguſtior evadit regione Apicis. Unde *Obverſe Cordata* ſ. *Obcordata* (512) *Obverſe Ovata* ſ. *Obovata* (517).

522. *Obvoluta* Foliatio (891) cum margines alterni comprehendunt oppoſiti folii marginem rectum. *Lychnis. Saponaria. Scobioſa.*

523. *Operculum* (Muſcis) Membrana Antherae (41) Orificium ſupra ciliis claudens, calyptra (112) tota aut ſemitecta. Varias aſſumit figuras: obtuſum, conicum, ſubulatum, arcuatum, rectum & obliquum.

524. *Oppoſita* Folia, duo per paria decuſſatim e regione collocata.

525. *Oppoſite-pinnatum* Folium, Pinnatum (593) foliolis oppoſitis (524).

526. *Oppoſiti-foliae* Stipulae (781) in latere folii oppoſito collocatae.

527. *Orbiculatum* Folium, Peripheria (*c*) circinata, (Diameter (516) longitudinalis aequalis transverſali.)

528. *Orgya*, *Orgyalis* Menſura, hexapoda ſ. humana altitudo, eſt Menſura inter manus expanſas. *Pedes Sex.*

529. *Ovale* Folium, ex orbiculato (527) oblongum (526) utraque extremitate rotondata aequali.

(*a*) Linea, quae ab uno extremitatis puncto ad aliud in circuli ambitu, per centrum vadit. *Diametrus* dicitur. *Geometr*

(*b*) Si circulum & ejus chordas duco pars ejus arcu uno & chorda comprehenſa, ſub *Segmenti* nomine venit. *Geometr.*

(*c*) Linea illa in ſe rediens, quae circulum conſtituit, quoniam radio in orbem circa ſe eunte deſcribitur, *peripheria* appellari ſolet.

530. *Ovato-lanceolatum* Folium, Ovatum (533) ad lanceolatam (447) figuram accedens.

531. *Ovato-oblongum* Folium, Ovatum (533) ad oblongam (516) figuram accedens.

532. *Ovato-rhombeum* Folium, ovatum (533) ſimulque rhomboideum (694).

533. *Ovatum* Folium, cujus diameter longitudinalis ſuperat transverſalem, baſi ſegmento circuli circumſcripta, apice angoſtiore.

P.

534. *Pagina* dicitur folii ſuperficies (811) utraque, onde pagina ſuperior & inferiot.

535. *Palatum* Corollae, Gibboſitas prominens in Fauce (298) Corollae. *Antirrhinum.*

536. *Paleae*, Lamellae Receptaculo (661) innatae floſculos & tandem ſemina diſtinguens, in floribus Compoſitis (162). *Anthemis. Bidens. Hypoehaeris.*

537. *Paleaceum* Receptaculum. Paleis (536) inſtructum.

538. *Paleaceus* Pappus (548) membrana inaequalis tenuis apici ſeminis adfixa.

539. *Palmata* Radix, Carnoſa, lobata. *Orchis.*

540. *Palmatum* Folium, diviſum ultra medium in Lobos ſubaequales baſi cohaerentes.

541. *Palmus*, *Palmaris* Menſura, Diameter quatuor digitorum transverſorum parallelorum, demto Pollice. *Unciae tres.*

542. *Panduraeforme* Folium, Oblongum (516) infetne latius, lateribus coarctatum.

543. *Panicula*, Flores ſparſi (755) in pedunculis diverſe diviſis & ſubdiviſis. Eſtque aequalis, vel ſecunda (710).

544. *Paniculatus* Caulis, ramis varie ſubdiviſis, floribus numeroſis. *Eriger. canadenſe.*

545. *Papilionacea* Corolla, Irregularis (430) Petalo inferiore cymbiformi, (Carina (120) ſuperiore adſcendente), (Vexillum (898) lateralibus ſolitariis), (Alae (23).

646. *Papilloſum* Folium, tectum ponctis catnoſis.

547. *Pappoſum* Semen, Pappo tenuiſſimo inaequali inſtructum. *Populus Salix.*
548. *Pappus*, Corona (195) ſeminis pennacea piloſave, volitans. Eſtque ſimplex vel compoſitus.
549. *Papuloſum* Folium, quod tegitur punctis veſiculiribus.
550. *Parabolicum* Folium, cujus diameter longitudinalis ſuperat transverſalem, verſus apicem ſenſim anguſtius rotundatum.
551. *Parallelum* Diſſepimentum (887).
552. *Paraſiticus* Caulis, alteri Plantae nec terrae innatus. *Viſcum.*
553. *Partiale*, Involucrum, Involucellum (425).
554. *Parallelepipeda* (a) Anthera (41) idem ac quadrangularis. *Polytrichum.*
555. *Partialis* Pedunculus, aliquot flores pedunculi communis (154) proferens.
556. *Partialis* Umbella (862) Umbellula (863).
557. *Partitum* Folium, ad baſin fere diviſum, unde bi-tri-multipartitum (91) a numero partium.
558. *Patens* Folium, ad angulum acutum (12. in not.) cauli inſidens.
559. *Patulo* Panicula (543) Pedunculis pedicelliſque undique diſperſis, floribus remotis Oppoſit. *Coarctatae* (146).
560. *Pedatum* Folium, Petiolo bifido, latere tantum inferiore adnectente foliola plura. *Helleborus.*
561. *Pedicellus*, Pedunculus (564) partialis (555) ſeu proprius floribus in Pedunculo communi (154).
562. *Peduncularis* Cirrhus (142), pedunculo inſidens.
563. *Pedunculatus* Verticillus (897) pedunculis flores elevantibus.
564. *Pedunculus*, Fulcrum (338) ſuſtinens Fructificationem (331) nec folia.

(a) *Parallelepipedum* dicunt orti, parallelogrammo ad perpendiculum, motu parallelo, demiſſo. *Geometr.*

565. *Pedunculus* (Muſcis) Seta (725) plerumque Colorata, antheram (41) ſuperne ſuſtinens, baſi tuberculata (852) nuda (*Bryum*) vel Perichaetio (574) veſtita (*Hypnum*)
566. *Pelta* (Lichenibus) Fructificatio plana ſ. revoluta, margini vel apici folii verticaliter adglutinata. *Lich. Canin. Aphtoſ. &c.*
567. *Peltatum* Folium. Petiolo Diſco Folii non baſi inſerto.
568. *Pennatus* Surculus (815) in Muſcis, quum Folia ad rachis utrinque latus annexa, alternata vel oppoſita ſunt.
569. *Perenne* Folium, per aliquot annos virens.
570. *Perennis* Radix, per plurimos annos regerminans.
571. *Perfoliatum* Folium, baſi transverſim cingente, (nec antice dehiſcente) Caulem. *Bupleurum.*
572. *Perianthium* Calyx (113) Fructificationi contiguus.
573. *Pericarpium* Viſcus Plantae, gravidum ſeminibus, quae matura demittit. Capſula (119) Siliqua (729) Legumen (452), Folliculus (326) Drupa (272) Pomum (614) Bacca (75) Strobilus (795).
574. *Perichaetium* (Muſcis) Congregatio foliorum anguſtiorum, tuberculum (852) ſetarum (726) cingentium.
575. *Perpendicularis* Radix, quae recta deſcendit.
576. *Perſiſtens* Corolla, Perianth. ad maturitatem Fructus. *Nymphaea.*
577. *Perſiſtens* Folium, peracta aeſtate, non caſurum.
578. *Perſonata* Corolla, Ringens (693) ſed inter labia (433) Palato (535) Clauſa.
579. *Pes, Pedalis* Menſura, menſuratur a flexura Cubiti, ad baſin Pollicis. *Unciae duodecim.*
580. *Petalinum* Nectarium (496) Petalis inſertum. Porus (*Ranunculus*) Rima, *Hydrophyllum.*
581. *Petalum* Corollae, Pars Corollae in plures diviſae.
582. *Petiolaris* Cirrhus (142), Petiolo inſertus.
583. *Petiolaris* Gemma (344) e foliorum rudimentis confecta.

584. *Petiolatum* Folium, Petiolo ad baſin inſerto. Seſſili (721) oppoſitum.

585. *Petiolus*, Fulcrum (338) ſuſtinens Folium, nec Fructificationem.

586. *Pileus* (Fungi) Orbiculus horizontaliter expanſus, ſubtus fructificationes in lamellis (442) gerens.

587. *Piliferum* Folium, apice in pilum deſinens. *Bryum*.

588. *Piloſum* Folium, quum Pili diſtincti elongati tegunt ſuperficiem.

589. *Piloſum* Receptaculum, pilis erectis tectum.

590. *Piloſus* Caulis, Pilis diſtinctis elongatis tectus.

591. *Pilus*, Ductus excretorius Plantae ſetaceus. Species Pubis (628).

592. *Pinnatifidum* Folium, transverſim diviſum in lacinias horizontales oblongas.

Bipinnatifidum quum bis laciniis lateralibus diviſum.

593. *Pinnatum* Folium, Petiolo ſimplici lateribus adnectente Foliola plura.

Abrupte (3) *Alternatim* (28) *Articulate* (60) *Cirrhoſum* (141) *Decurſive* (223) *Duplicato* (274) *Interrupte* (421) *Oppoſite* (525) *Triplicato* (843) pinnatum.

594. *Pinnatum cum impari*, Folium, Pinnatum (593) foliolo unico (impari) terminatum.

595. *Pinnatum ſine impari*, Folium (3).

596. *Pinnatus* ſurculus (815) oppoſitos alternatosve admittit Ramos.

597. *Pinnae* vocantur Foliola conjugata. *Pinnae pinnatae* quando foliola conjugata profundis inciſuris minores *Pinnulas* repraeſentant.

598. *Piſtillum* Organum genitale femineum, conſtat Germine (351) Stylo (796) & Stigmate (775).

599. *Placentatio*, eſt Cotyledonum (199) Diſpoſitio ſub ipſa ſeminis Germinatione. *Mono*- (482) *Di*- (241) *Acotyledones* (8).

600. *Plantae* dicuntur Dicotyledones (241) Herbae (375) & arbores.

601. *Planum* Folium, ſuperficie ubique aequali.
602. *Plicata* Vernatio (891) in plicas varias coarctata longitudinaliter. *Betula. Crataegus* &c.
603. *Plicatum* Folium, Diſco (257) plicis acutis alternatim flexo, angulis dependentibus, & adſcendentibus, *Alchemilla.*
604. *Plumoſae* Setae (726) villoſae, compoſitae.
605. *Plumoſus* Pappus (548) pilis pennatis conſtans.
606. *Pluntula*, Pars Corculi (188) ſquamoſa adſcendens.
607. *Pollen* Pulvis Floris anthera (41) incluſus, humore rumpendus, atomosque elaſticos ejaculans. (Genitura Plantarum).
608. *Pollex*, Pollicaris menſura, eſt longitudo aut Diameter extimi Articuli Pollicis. *Uncia una.*
609. *Polyanthos* Caulis, qui plures quam unum ſuſtinet florem.
610. *Polygama* Planta, (Hybrida) quae flores hermaphroditos neceſſario, dein alios flores alterius ſexus, feminens vel maſculos, in eadem ſpecie profert.
611. *Polypetala* Corolla, Petalis pluribus. Numerus ab ordinibus Inſertionum determinatur. *Anemone. Hepatica.*
612. *Polyphyllum* Perianthium. Foliolis pluribus conſtans.
613. *Polyſtachius* Culmus, plures quam unam Spicam gerens.
614. *Pomum* Pericarpium (573) farctum evalve, capſulam (119) continens.
615. *Praemorſa* Radix, deorſum truncata, Radiculas (645) laterales emittens. *Sc. Succiſa. Plantago.*
616. *Praemorſum* Folium, Obtuſiſſimum, terminatum.
617. *Priſmaticum* (a) Pericarpium, lineare polyëdrum, lateribus planis.
618. *Procumbens* Caulis, debilis horizontaliter terrae innitens.

(a) *Priſma* effici, ajunt, cum figura rectilinea ad rectam deſcendat, motu parallelo. *Geometr.*

619. *Prolifera* Umbella (862).
620. *Prolifer* Flos, cum ex uno Flore alius enaſcitur. *Scabioſa. Geum rivale. Bellis hortens.*
621. *Prolifer* Caulis, ex apricis centro emittens tantum ramos. *Pinus.*
622. *Propagines*, Muſcorum ſemina nuda ſ. Tunica cotyledonibusque deſtituta.
623. *Proprium* Involucrum, cuilibet Flori ſubjectum.
624. *Proprium* Perianthium, quemlibet florem reſpiciens.
625. *Proprium* Nectarium, a petalis & ceteris partibus diſtinctum. *Aconitum.*
626. *Proprium* Receptaculum, quod partes unius tantum Fructificationis reſpicit.
627. *Proſtratus* Caulis, baſi decumbente erectus.
628. *Pubes*, Hirſuties omnis in Planta, Pili (591) Lana (444) Barba (77) Tomentum (828) Strigae (793) Setae (726) Hami (373) Glandulae (356) Viſcoſitas (905) Glutinoſitas (365).
629. *Pubeſcens* Folium, Caulis, tectum pilis (591) raris brevibus ſibi incumbentibus.
630. *Pulpoſum* Folium, materia tenaci farctum.
631. *Punctatum* Folium, punctis excavatis adſperſum.
632. *Pungens* Folium Aculeis (11) ſ. Spinis (761) Armatum.

Q.

633. *Quinatum* Folium. Digitatum (247) foliolis quinis.
636. *Quinquangulare* Folium, angulis quinis prominentibus. Spec. Angulati (34.

R.

635. *Racemus.* Pedunculo communi, pedicellisque lateralibus, inſtructo. *Ribes.*
636. *Rachis*, Receptaculum filiforme floſculos longitudinaliter adnectens, in Spicam (759).
637. *Rachis* ſ. *Coſta*, Productio Petioli ſ. Nervus intermedius, foliorum medium longitudinaliter percurrens.

638. *Radiatus* Flos. Corolliilis Diſci (256) Tubulatis (854) Ambitus (527) vero Ligulatis (454) difformibus, compoſitus (162).
639. *Radiata* Umbella (862) petalis florum marginalium, reliquis majoribus. *Tordyl. Caucalis.*
640. *Radicale* Folium, quod ex radice immediate exit.
641. *Radicans* Caulis, aliis ſe adfigens Radiculis lateralibus. *Hedera. Cuſcuta.*
642. *Radicans* Folium, ſi radices agat. unde.
643. *Radicata* Folia, quae radiculas demittunt ex ſubſtantia ipſius folii.
644. *Radicatio*, eſt Radicis diſpoſitio Caudice adſcendente (127) Deſcendente (648) & Radiculis (645).
645. *Radicula*, Pars Radicis (648) fibroſa.
646. *Radius*, Floris Compoſiti (638) ambitus ex Corollulis ligulatis (454).
647. *Radii* (a) dicuntur etiam Pedunculi Umbellae (862) & Setae rigidiores Pappi (548).
648. *Radix* Organum nutriens Plantam (600) Conſtat Caudice deſcendente & Radiculis (645).
649. *Rameum* Folium, quod Ramo (non Cauli) inſidet.
650. *Rami* Partes caulis. Situs notetur.
651. *Ramificatio*, manifeſtatur in ſitu Ramorum, quem folia ſequuntur (147. 268. 266. 263. 896. 225. 669. 683. &c.)
652. *Ramoſa* Radix, in fibras (645) ſubdiviſa.
653. *Ramoſa* Spica (759) varie in Spicas partiales diviſa.
654. *Ramoſa Spina* (761) diviſa, apice partita.
655. *Ramoſae Setae* (726) ſ. *Furcatae*, ſubdiviſae quaſi in Ramulos. *Leontodon. hiſpid. Arabis thaliana.*
656. *Ramoſum* Folium, Pedatum (560).
557. *Ramoſus* Aculeus (11), *Furcae* (341).
658. *Ramoſus* Caulis, Ramis lateralibus pluribus inſtructus.

659. *Ra-*

(a) Lineae pares, quae ex medio puncto, quod *Centrum* dicunt, ad puncta peripheriae ducuntur, *radii* appellantur. *Geometr.*

659. *Ramoſus* Pappus, (548) Radiis (647. b.) ſubdiviſis. *Carlina.*

660. *Ramoſiſſimus* Caulis, Ramis numeroſis absque ordine cumulatis.

661. *Receptaculum*, Baſis qua partes Fructificatioois (331) connectuntur. Eſtque Commuoe (152) vel Proprium (626).

662. *Reclinatum* Folium, deorſum verſus petiolum flexum, ut arcus ſit baſi inferior, apice adſcendente.

663. *Reclinatus* Caulis, arcuatim verſus terram. *Ficus.*

664. *Recta* Ariſta, perpeodiculariter exiens. *Agroſtis Spica Venti.*

665. *Recta* Calyptra, (112) undique aequalis.

666. *Rectus* aculeus, flexuris deſtitutus.

667. *Recurvatum* Folium, deorſum, ut Convexitas Arcus ſuperiora ſpectet.

668. *Recurvi* Aculei (11), extrorſum reflexi. *Roſa.*

669. *Reflexi* Rami (650) perpendiculariter depeodentes.

670. *Reflexum* Folium, deorſum curvatum, ut apex baſi inferior evadat.

671. *Reflexum* Perianthium, partibus retrorſum flexis.

672. *Regularis* Corolla, aequalis (17) figura, magnitudine & proportione partium.

673. *Remota* Corolla, a Calyce interjecto Germine, (351). *Sanguiſorba. Poterium.*

674. *Remota* Folia, Spatio e ſe invicem diſtantia.

675. *Remota* Volva, (907) a Capitulo (118) Spatio recedens.

676. *Reniforme* Folium, ſubrotundum (805), baſi ſinu excavatum, angulis poſticis deſtitutum.

677. *Repandum* Folium, cujus margo angulis, eisque interjectis ſinubus circuli ſegmento inſcriptis, terminatur.

678. *Repens* Caulis, Terrae incumbens, radiculasque agens.

679. *Repens* Radix, longe ſub terra excurrens, hinc inde germinans, & Radiculas demittens.

680. *Reſtantes* Pedunculi, poſt Caſum fructificationis.

681. *Reſupinata* Corolla, Tubo contorto, ut Labium ſuperius Terram, inferius coelum ſpectet. *Viola. Scrophularia.*

682. *Reſupinatum* Folium, Pagina (534) ſuperiore inferiore, & inferiore ſuperiore facta.

683. *Retroflexi* Rami, horſum vorſum divaricati (266).

684. *Retrofractus* Pedunculus, vi quaſi ad dependendum redactus.

685. *Retrorſum* Sinuatum, Fol. Runcinat. (699).

686. *Retuſum* Folium, quod terminatur ſinu obtuſo.

687. *Revoluta* Vernatio (891), lateribus verſus Paginam inferiorem utrinque ſpiraliter contortis. *Primula. Tuſſilago.*

688. *Revolutum* Folium, quod deorſum in Spiram revolvitur.

689. *Revolutus* Cirrhus, Spira dimidio itinere retorta. *Bryonia. Leguminoſae.*

690. *Rictus* Corollae, hiatus inter duo Labia Corollae Ringentis (693).

691. *Rigidus* Caulis, flexurae impatiens.

692. *Rimoſus* Caulis, Cortice exteriore fiſſuras ſponte agens. *Acer.*

693. *Ringens* Corolla, Limbo (456) irregulari in duo Labia hians (343. 433.)

694. *Rhombeum* Folium, Figura Rhombi (*a*).

695. *Roſtellum.* Pars Corculi (188) in ſemine, ſimplex deſcendens.

696. *Rotata* Corolla, Monopetalae, Limbus (456) planus, partitus, nulli tubo (857) impoſitus.

697. *Rotundum* Folium, ſ. *Rotundatum*, angulis orbum.

698. *Rugoſum* Folium, Rugis confertum. *Salvia.*

699. *Runcinatum* Folium (685), Pinnatifidum (592), ita ut lobi antice convexi, poſtice transverſi ſint. *Leontod. Taraxac.*

(*a*) Cujus figurae quadratae latera aequalia quidem, non autem recti ſunt anguli, *Rhombus*; cujus neque recti anguli, neque omnia latera ſed oppoſita tantum, aequalia ſunt, *rhombiformis* dicitur. *Geometr.*

S.

700. *Sagittatum* Folium, Triangulare (834) baſi ſinu excavatum, angulis poſticis acutis.

701. *Sarmentoſus* Caulis, filiformis ſubnudus, geniculis radicantibus.

702. *Scaber* Caulis, Punctis eminentibus rigidiuſculis exaſperatus.

703. *Scandens* Caulis, alta petens, aliisque corporibus ſuſtinendus.

704. *Scapus*, Pedunculus, Radicatus, caulis faciem induens. *Viola odorata.*

705. *Scapus*, Trunci (850) Species, fructificationem ſuſtinens, abſque foliis. *Narciſſus.*

706. *Scarioſum* Folium, ſubſtantia ſicca arida, tactu ſonora.

707. *Scarioſum* Perianthium, imbricatum (392) ſquamis margine ſ. apice membrana auctis, arida ſonora. *Chryſanthem.*

708. *Scutellum*, Fructificatio orbiculata, concava: margine undique elevato. *Lichenes.*

709. *Scyphus*, in Lichenibus pyxidaris, conſtat ſtipite baſi attenuato, ſuperne dilatato excavato, fructificationes ſeſſiles, ſeu pedunculatas ſcutelliformes, proferens.

710. *Secunda* Panicula (382), Pedunculis floribusque omnibus verſus unum idemque latus flexis. *Feſtuca. Dactyl. glom.*

711. *Secunda* Spica, floribus omnibus ad unum latus verſis.

712. *Semen*, Vegetabilis Pars decidua, novi rudimentum, pollinis (607) irrigatione vivificatum, veſica tunicatumque. Partes: Hilum (383) Cotyledon (199) Corculum (188).

713. *Semiamplexicaule* Folium, gradu minore differt a fol. amplexicauli (30).

e 2

714. *Semicylindricum* Folium, Teres (817) ſed altero latere longitudinaliter planum.
715. *Seminale* Folium, quod antea Cotyledon (199) fuit, & primum in Planta eſt.
716. *Seminum* Receptaculum, Baſis, qua ſemina intra Pericarpium adfiguntur.
717. *Semiteres* Caulis, hinc planus, inde tereti uſculus.
718. *Sempervirens* Folium, per omnia tempora anni virens.
719. *Sericeum* Folium, tectum pilis appreſſis, molliſſimis nitidis.
720. *Serratum* Folium, margine inciſo: omnibus inciſuris extremitatem reſpicientibus. *Duplicato ſerratum* (275) inciſuris iterum inciſis.
721. *Seſſile* Folium, immediate Cauli vel Ramo, abſque petiolo inſidens.
722. *Seſſilis* Pappus, (548) Semine abſque Stipite (779) adhaerens.
723. *Seſſilis* Umbellula (863) plures Pedunculos ſimplices ex eodem centro, ambitu aequali, prodeuntes.
724. *Seſſilis Verticillus* (897) abſque pedicellis manifeſtis.
725. *Seta* dicitur Pedunculus (565) in Muſcis.
726. *Setae*, Pili rigidiuſculi tereti uſculi, Spec. Pubis (628).
727. *Sicca* Drupa (272), non ſucculenta (808).
728. *Silicula*, Siliqua (729) ſubrotunda, oblonga, obcordata ſtylo inſtructa. *Lepidium. Draba. Thlaſpi.*
729. *Siliqua*, Pericarpium (573) membranaceum bivalve, adfigens ſemina ſecundum utramque ſuturam: conſtat valvis (884) & Diſſepimento.
730. *Simplex* Aculeus (11), non diviſus (666) (404) (668).
731. *Simplex* Caulis, continua ſerie verſus apicem extenſus.
732. *Simplex* Cirrhus, indiviſus.

733. *Simplex* Flos, intra Perianthium aut Corollam unicum receptaculum conſtituit.

734. *Simplex* Folium, cum Petiolus gerit unicum Folium, differt: 1) Circumſcriptione (138). 2) Angulis (30). 3) Sinubus (745). 4) Apice (45). 5) Margine (473). 7) Superficie (811). 8) Subſtantiæ (806). 9) Duratione (277).

735. *Simplex* Fructificatio (331), Paucis floribus conſtans.

736. *Simplex* Pappus (548), radiis pluribus indiviſis in orbem poſitis. *Hieracium.*

737. *Simplex* Perianthium, compoſitum dum ſeries unica ſquamarum ambit floſculos. T. *Farfara.*

738. *Simplex* Radix, quae non ſubdividitur.

739. *Simplex* Seta (725), continuo extenſa longitudinaliter.

740. *Simplex* Spica, Rachi (637) indiviſa.

741. *Simplex* Umbella (862), Pedunculis non ramoſis omnibus ex uno eodemque Receptaculo ortis.

742. *Simpliciſſimus* Caulis, idem ac Integer. (415).

743. *Siniſtrorſum*, hoc eſt: quod reſpicit ſiniſtrum, ſi ponas te ipſum in centro conſtitutum, meridiem adſpicere; *Dextrorſum* itaque contrarium. (908. 909.)

744. *Sinuatum* Folium, a lateribus ſinubus dilatatis.

745. *Sinus*, Diſcum Folii in partes ſecant. (676. 192. 374. 700. 306. 540. 592. 470. 699. &c.)

746. *Situs* Foliorum. Inſertio (413).

747. *Solidus* Bulbus (106) Carnoſus, intus indiviſus. *Tulipa.*

748. *Solidus* Caulis, interne fartus (292) non tuluboſus (856).

749. *Solitariae* Stipulae, ſimplices, ſparſae.

750. *Solitarius* Pedunculus, qui unicus eſt in loco.

751. *Solutae* Stipulae, Folia, baſi productae, craſſitiem perdentes.

752. *Somnus*, nocturna Foliorum mutatio in Planta. Connivens (182), Includens (399), Circumſepiens

(139), Muniens (492), Conduplicans (170), Involvens (429), Divergens (267), Dependens (234), Invertens (424), imbricans (390).

753. *Spadix*, Receptaculum (661) Palmae, enatum intra Spatham, in ramulos fructificantes diviſum.

754. *Sparſa* Folia, abſque certo ordine conſtituta.

755. *Sparſi* Pedunculi, ubi plures abſque ordine progna ſcuntur.

756. *Spatha*, Calyx (113) membranaceus, longitudinaliter ruptus. *Narcissus*.

757. *Spatulatum* Folium, ſubrotundum (803) baſi anguſtiore lineari (458).

758. *Sphaerophyllum*, Fructificatio feminea ſeſſilis vel pedunculata, conſtans minutiſſimis foliis congregatis imbricato-patulis. *Mnium pellucid. Androgyn.* & *Fiſſum*.

759. *Spica*, Floribus ſeſſilibus alternis, pedunculo communi ſimplici (Rachi) adfixis.

760. *Spicula*, *Spicilla*, partialis ſpica, compoſitae (158) Locuſta dicta.

761. *Spina*, Mucro durus, pungens, e ligno, (non ex cortice) protruſus. A cultura ſaepe evaneſcens. *Pyrus. Prunus. Rhamnus.*

762. *Spineſcens* Petiolus, induteſcens & pungens.

763. *Spinoſum* Folium, quod margine exit in acumina rigida ſubulata & pungentia. *Carduus. Ilex.*

764. *Spinoſum* Perianthium, Squarroſum (770), Squamis in mucrones pungentes terminatis. *Onopordon.*

765. *Spinoſus* Caulis, Spinis (761) armatus.

766. *Spiralia* Vernatio (136).

767. *Spithama*, Spithamalis, Menſura, Spatium inter Apicem Pollicis & Indicis extenſum. *Unciae ſeptem*.

768. *Squamoſus* Bulbus, (106) Lamellis f. ſquamis imbricatus. *Lilium.*

769. *Squamoſus* Caulis, ſquamis adſperſus.

770. *Squarroſum* Perianth. imbricatum (392) ſquamis undique divaricatis patentiſſimis. *Onopordon. Conyza.*

771. *Stamen*, Viſcus pro Pollinis (607) praeparatione, (Organum Genitale maſculinum). Conſtat Filamento (303), Anthera (41) & Polline (607).
772. *Stella* ſ. *Stellula*, Fructificatio in Muſcis: Surculi terminalis expanſio pluribus foliis patentibus conflata cujus medio (in quibusdam) minuta folia compactiſſima, in aliis diſtinctiora corpora cylindrica (109, in not.) imbricata, inſident. *Polytrichum. Mnium.*
773. *Stellata* Folia, Verticillata (895).
774. *Stellatae* Setae (726), decuſſatim diſpoſitae.
775. *Stigma*, Summitas Piſtilli (598) madida humore, pro Pollinis receptione. Numerus & Figura notetur.
776. *Stimuli*, Mucrones punctura inflammatorias efficientes, unde pruriginoſae evadunt Partes. *Urtica.*
777. *Stipes* Frondis (329), Trunci (850) Species, in Folium tranſiens. *Filices.*
778. *Stipes* Fungi, Truncus ſ. Pes fungi, eſtque farctus, vel fiſtuloſus; nudus vel annulatus (37).
779. *Stipes* Pappi (548), Filum elevans connectensque Pappum & Semen. Unde
780. *Stipitatus* Pappus, Stipite (779) inſtructus, non ſeſſilis (722).
781. *Stipula*, Foliorum ſ. Squamula, baſi petiolorum enaſcentium ubique adſtans. Fulcri (351) Species.
782. *Stipulares* Glandulae (356) Stipulis inſertae.
783. *Stipularis* Gemma (344) ex Stipulis (781) confecta.
784. *Stipulatio*, Stipularum (781) ſitus & ſtructura ad Baſin Foliorum.
785. *Stipulatus* Caulis, Stipulis (781) notatus.
786. *Stolones* (786) nova Plantarum Soboles, e Radicibus fructificantes, per quas Plantae quoque multiplicantur. *Ajuga. Viola od.*
787. *Stoloniferus* Caulis, Turiones (861) ad radicem emittens.
788. *Striatum* Folium, Lineis ſuperficialibus excavatis parallelis inſcriptum.

789. *Striatus* Caulis, Lineis tenuiſſimis excavatis longitudinalibus.
790. *Stricta* Panicula (543) pedunculis pedicelliſque rigidiuſculis. Oppoſit. Laxae (450).
791. *Strictum* Folium, omnino perpendiculare abſque flexura.
792. *Strictus* Caulis rectus, perpendicularis, non flexuoſus.
793. *Strigae*, Pili rigidiuſculi planiuſculi.
794. *Strigoſum* Folium, aculeis lanceolatis rigidis in ſuperficie.
795. *Strobilus*, Pericarpium (573) imbricatum, ex Amento (29) coarctato factum, ſquamis induratis. *Pinus*.
796. *Stylus*, Pars Piſtilli (598) intermedia, elevans Stigma (775) a Germine (351) Situ, Diviſione, & figura differt.
797. *Subalare* Folium, Axillare (73).
798. *Subcordatum* Folium, ad hanc figuram (192) fere accedens.
799. *Subdiviſus* Caulis, in ramos abſque ordine.
800. *Suberoſus* Caulis, Cortice exteriore molliore, ſed elaſtico indutus.
801. *Submerſum* Folium, intra aquae ſuperficiem abſconditum.
802. *Subovatum* Folium, ad ovatam figuram (533) ſubaccedens.
803. *Subramoſus* Caulis, ramis pauciſſimis lateralibus.
804. *Subrotundum* Capitulum (118), fere globoſum.
805. *Subrotundum* Folium, cujus figura Orbiculato (527) proxime accedit.
806. *Subſtantia* Folii, conſideratur ſecundum latera (478. 706. 353. 235. 166. 155. 630. 122. 6. 270. &c.)
807. *Subulatum* Folium, ad baſin lineare (458) verſus apicem ſenſim attenuatum.
808. *Succulenta* Drupa (272) humorem continens. *Prunus*.

813. *Suffruticoſus* Caulis, baſi permanens, ramis quotannis marceſcens.

810. *Sulcatum* Folium, Diſco (257) lineis profundis excavatum.

811. *Superficies* Folii, Paginam (534) Supinam (ſuperiorem) vel pronam (inferiorem) tegit. Communiter prima coelum, ſecunda terram ſpectat. (504. 500. 355. 148. 497. 840. 839. 845.)

812. *Superum* Germen, (351) Corolla incluſum.

813. *Superus* Flos, Calyx. Cui Germen ſub receptaculo, ſ. cujus Calyx abit in Fructum. *Tourn.*

814. *Supradecompoſitum* Folium, cùm Petiolus aliquoties (bis-ter) diviſus, adnectit plurima Foliola. (818. 848. 841.)

815. *Surculus*, Caulis ſpecies in Muſcis, reptans, procumbens vel erigens; expanſione continue multiplicatur. (568. 596. 393.)

T.

816. *Teres* Caulis, cylindricus (209. in not.) ſ. angulis deſtitutus.

817. *Teres* Folium, quod maxima ex parte cylindricum.

818. *Tergeminum* Folium (842), Petiolus bifidus utroque apice foliola duo ferens, & inſuper foliola duo ad divaricationem petioli communis.

819. *Terminalis* Ariſta (54), apici Glumae adfixa.

820. *Terminalis* Pedunculus, ſ. Flos, ad apicem Caulis ſ. Rami poſitus.

821. *Terna* Folia (89).

822. *Ternatum* Folium, eſt Digitatum (247) foliolis tantum tribus. Eſtque foliolis ſeſſilibus vel petiolatis.

823. *Teſſelata* Folia, Colorat. Species (148), maculis quadrangularibus diſcoloribus picta.

824. *Tetragonus* Caulis (837).

825. *Thalamus*, Receptaculum (661).

826. *Thyrſus*, Panicula (543) coarctata in formam ovatam. *Syringa*. T. *Petaſites*.

827. *Tomentoſum* Folium, villis intertextis (828) obductum.

828. *Tomentum*, Spec. Pubis (628) villi intertexti vix conſpicui.

829. *Toroſa* Siliqua (729), *Toruloſum* Pericarpium. Prominentiis hinc inde Gibba.

830. *Torſio*, *Intorſio*, Contorſio (183) Flexio Partium Plantae, verſus alterum latus. (681. 682. 910. 908. 909. 186.)

831. *Tortilis* Ariſta (54), funis inſtar flexa. *Avena*.

832. *Tranſverſum* Diſſepimentum (886).

833. *Trapeziforme* Folium, Quadrangulare, lateribus inter ſe inaequalibus.

834. *Triangulare* Folium, angulis tribus prominentibus. Angulati Spec. (34).

835. *Triangularis* Caulis, *Quadrangularis* &c. a numero angulorum longitudinaliter prominentium.

836. *Tricocca* Capſula (119), tribus nodis protuberans, intusque in tria Locolamenta (463) diviſa. *Euphorbia*.

837. *Trigonus* Caulis, tetragonus, pentagonus, hexagonus. Angulis tribus, quatuor, quinque, ſex, prominentibus. *Ancipitis* Spec. (31).

838. *Trilobum* Folium, (462).

839. *Trinervatum* Folium, Nervoſum (497) tribus nervis, *pone Baſin* Folii concurrentibus.

840. *Trinerve* Folium, Nervoſum (497) tribus nervis in *Baſi* Folii concurrentibus.

841. *Tripinnatum* Folium (843), cum Petiolus communis adſigit plura foliola bipinnata (92).

842. *Triplicato-geminatum*, (818).

843. *Triplicato-pinnatum*, (841).

844. *Triplicato-ternatum*, (848).

845. *Triplinerve* Folium, nervoſum (497) tribus nervis, *ſupra Baſin* concurrentibus.

846. *Triqueter* Culmus, lateribus tribus exacte planis.
847. *Triquetrum* Folium, Tribus lateribus longitudinaliter planis, in folio ſubulato (807).
848. *Triternatum* Folium (844), cum petiolus adſigit tria foliola biternata (93):
849. *Truncatum* Folium, quod tranſverſali terminatur.
850. *Truncus*, Organum multiplicans Plantam, quatuor numerantur Species: 1) *Caulis* (132). 2) *Culmus* (205). 3) *Scapus* (705). 4) *Stipes* (777). *Rami* partes ſunt Trunci.
851. *Tuberculum* (*Lichen.*), Fructificatio, conſtans punctis ſcabris, ex pulvere quaſi congeſtis.
852. *Tuberculum* (*Muſci*), baſis Pedunculi (565) Ovata, ſeu conica; nuda vel Perichætio (574) veſtita, qua ſurculo (815) adſigitur.
853. *Tuberoſa* Radix, e partibus carnoſis filo quaſi connexis. *Filipendula. Poeonia.*
854. *Tubulata* Corolla, Monopetala (485) Tubo (857) Cylindrico, (209. in not.) Limbo Campanulato, 4 f. 5 fido.
855. *Tubuloſus* Flos, Compoſitus (162) Corollulis ſloſculorum omnibus tubulatis (854) ſubaequalibus.
856. *Tubuloſum* Folium, quod interne ſi detruncetur, cavitatem habet.
857. *Tubus* Corollae, Monopetalae (485) pars inferior cylindracea.
858. *Tunicatus* Bulbus (106), Tunicis numeroſis veſtitus. *Cepa.*
859. *Tunicatus* Caulis, membranis veſtitus.
860. *Turbinatum* Perianthium, obverſe Conicum (176).
861. *Turiones*, Tenellae plantarum ſobolos, verno tempore cum foliis e terra erumpentes (786). *Aſparagus. Humulus.*

U.

862. *Umbella*, Receptaculum ex eodem centro elongatum in pedunculos filiformes proportionatos.

863. *Umbellula* eſt partialis Umbella (556).
864. *Umbilicatum* Folium, Peltatum (567).
865. *Umbo*, Diſcus (256).
866. *Undatum*, Diſco (257) plicis obtuſis alternatim flexo.
867. *Undulatum* Folium, Margioe plicis alternatim flexo.
868. *Unguis* Corollae Polypetalae (611) pars inferior anguſtata, qua Receptacolo adfigitur.
869. *Unguis*, Unguicularis Menſura, eſt longitudo Unguis. *Lineae ſex.*
870. *Uniflora* Gluma (364), unicum Florem amplectens. *Agroſtis.*
871. *Uniflorus* Pedunculos, bi-tri-multiflorus, pro numero florum quos profert.
872. *Unilateralis* Racemus, (635) Flores omnes ad alterum latus inſerti.
873. *Univalvis* Gluma (364), unica conſtans ſqnâma.
874. *Univalvis* Spatha (756), uno latere dehiſcens. *Levcojum.*
875. *Univerſale* Involocrum (427), Umbellae univerſali ſubjectum.
876. *Univerſalis* Umbella (862), qoae alias Umbellulas (887) Apicibus gignit.
877. *Urceolata* Corolla, quae Urceoli ſ. Pelvis inſtar inflata, & undique gibba eſt.
878. *Urens* Caulis, Stimulis (776) adſperſus.
879. *Utriculi*, Vaſcula liquore ſecreto repleta.
880. *Vaginae* Foliorum, Vaginantis (882) Folii, Tubus cylindricus Culmum vel Caulem veſtiens.
881. *Vagina* (Muſcis), Membrana pervia tuboloſa, ſurculo inſidens, & tuberculum (852) Peduoculi (565) arcte veſtiens. *Polytrichum.*
882. *Vaginans* Folium, baſi formante tubum, culmnm veſtientem (880).
883. *Vaginatus* Culmus, Foliorum Vaginis (880) cinctus.

884. *Valvae*, *Valvulae*, Paries quo tegitur fructus externe.

885. *Valvis* dehiſcit Capſula (119), unde tri-quadri-quinque-ſex-valvis, a numero ſegmentorum.

886. *Valvis contrarium*, ſ. Transverſum Diſſepimentum (259) anguſtius, ubi Valvulae (884) coarctatae evadunt concavae. *Thlaſpi.*

887. *Valvis Parallelum* Diſſepimentum (259) latitudine & Diametro transverſali ad Valvulas (884) accedens. *Alyſſum. Turritis.*

888. *Venoſum* Folium, Vaſis diſcurrentibus multifariam diviſis.

889. *Ventricoſa* Spica (759) lateribus gibba.

890. *Ventricoſa* Corolla, Perianth. in ventrem intumeſcens.

891. *Vernatio* (321) Foliorum Diſpoſitio intra gemmam (344), Conduplicata (171), Convoluta (186), Involuta (428), Revoluta (687), Obvoluta (522), Equitantia (286), Imbricata (391), Plicata (602), Reclinata (662), Circinalia (136).

892. *Verſatilis* Anthera (41), incumbens (892).

893. *Verſus* Florum, eſt eorum certa verſus Plagam quaedam diſpoſitio.

894. *Verticale* Folium, paginam ſuperiorem meridiei (non coelo) obvertens.

895. *Verticillata* Folia, ſ. Stellata, plura quam duo folia caulem ambientia (821).

896. *Verticillati* Rami, plures truncum (850) ad genicula (362) circumdantes.

897. *Verticillus*, Floribus pluribus Caulem annulatim ambientibus. *Didynamia.*

898. *Vexillum*, Superius Petalum Corollae Papilionaceae (545), Alis (23) & Carinae (120) incumbens.

899. *Vigiliae* Plantarum, abſolvuntur determinatis horis Diei, quibus Plantae Flores quotidie aperiunt, expandunt & claudunt. *Tragopogon. Hierac.* &c.

900. *Villoſa* Calyptra, ſurſum vel deorſum piloſa. *Bryum Striat. Polytrichum.*
901. *Villoſum* Folium, Tectum pilis mollibus.
902. *Villoſus* Caulis, Pilis mollibus pubeſcens. *Rhus.*
903. *Virgatus* Caulis, ramuſculis debilibus numeroſis inaequalibus.
904. *Viſcidum* Folium, oblinitum tenaci humore.
905. *Viſcoſitas*, Qualitas humoris tenacis.
906. *Vivipara* Gramina fiunt, dum glumae Corollae excreſcunt in folia, tumque abortiunt, & Stamina cum Piſtillis plane evaneſcunt.
907. *Volva*, Calyx Fungi membranaceus, undique lacerus.
908. *Volubilis* Caulis, ſpiraliter adſcendens per ramum alienum.
909. *Volubilis* dextrorſum (743), ☽ contra motum Solis. *Convolvul.*
910. *Volubilis* Siniſtrorſum (743), ☾ Secundum ſolem. *Humulus. Polyg. Convolvul.*
911. *Vulgaris* Planta, ſ. *Frequens*, quae in ſolo apto ſponte & copioſe provenit.

CLASSIS

CLASSIS I.

MONANDRIA.

A. *MONOGYNIA.*

HIPPURIS.

Linn. Gen. Plant. No. 11.

Cal. o. *Petala* o. *Stigma* ſimplex. *Semen* 1. *Linnaei Syſt. Nat.* T. II. pag. 52.

1. Hippuris, *vulgaris.* *Linn. Spec. Plant.* pag. 6. [*Limnopeuce. Hall. Hiſt. Stirp. Helv.* No. 1572.]
   H. in foſſis & piſcinis ad *Driedorff*; *Beilſtein*, alibique. Floret Majo.

B. *DIGYNIA.*

CALLITRICHE. *G. P.* 13.

Cal. o. *Petala* 2. *Capſ.* 2-localaris, 4-ſperma. *S. N.* 52.

2. Callitriche, *verna*, foliis ſuperioribus ovalibus, floribus androgynis. *Linn. Spec.* 6. [*Stellaria. Hall.* 553.]
   β. Stellaria foliis imis linearibus, ſupremis ſubrotundis. *Hall.* 554.
   H. α. in aquis ſtagnantibus paſſim; β. ſimilibus locis *im Fiſchweyher-Grund, bey der untern Walkmuhle.* Floret α. Majo, β. Junio.
   Var. β. Flores *ſuperiores* maſculi; *inferiores* fœminei, *uti in* α, folia *caulina linearia, apice bifida, uti in ſequente.*
3. Callitriche, *autumnalis*, foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Linn. Spec.* 6. [*Hall.* 555.]
   H. in foſſis aquoſis, & aquis quietis, *bey der Papiermühle*; & alibi rarius. Floret Auguſto & ſeq.

CLASSIS II.
DIANDRIA.
A. MONOGYNIA.

* *Flores inferi, monopetali, regulares.*

LIGUSTRUM. *G. P.* 18.

Cor. 4-fida. *Bacca* 4-ſperma. *S. N.* 55.

4. LIGUSTRUM, *vulgare. Linn. Spec.* 10. [*Hall.* 530.]
H. ad ſepes paſſim. Floret Junio.
Pharm. LIGUSTRI Flores.

SYRINGA. *G. P.* 22.

Cor. 4-fida. *Capſ.* 2-locularis. *S. N.* 56.

5. SYRINGA, *vulgaris*, foliis ovato-cordatis. *Linn. Spec.* 11. [*Hall.* 531.]
H. ad ſepes frequens, frutex perficæ originis; Var. Floribus albis in Hortis *auf dem Berg.* Floret Majo.

** *Flores inferi, monopetali, irregulares.*

Fructus capſularis.

VERONICA. *G. P.* 25.

Cor. Limbo 4-partito: lacinia infima anguſtiore. *Capſ.* 2-locularis. *S. N.* 57.

a. *Spicatæ.*

6. VERONICA, *ſpicata*, ſpica terminali, foliis oppoſitis crenatis obtuſis, caule adſcendente ſimpliciſſimo. *Linn. Spec.* 14. [*Hall.* 542.]
H. in ſterilibus ſylvaticis, *in der Hörre*, rarius. Floret Julio.

7. VERONICA, *officinalis*, ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. *Linn. Spec.* 14. [*Hall.* 540.]
H. in ſylvis paſſim. Floret Junio & ſeq.
Pharm. VERONICÆ Herba.

b. *Corymboſo-racemoſa.*

8. VERONICA, *ſerpillifolia*, racemo terminali ſubſpicato, foliis ovatis glabris crenatis. *Linn. Spec.* 15. [*Hall.* 546.]

H. In paſcuis, riguis, ad vias, ubique. Floret Majo & ſeq.
Corolla, *pallide cærulea, infima lacinia anguſtiſſima alba. Tota Planta glabra.*

9. VERONICA, *Beccabunga*, racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Linn. Spec.* 16. [*Hall.* 534.]

H. In foſſis aquoſis, ſtagnis, rivulis, abunde. Floret Junio. *Pharm.* BECCABUNGÆ Herba.

Folia *primo vere in acetaria recipiuntur.*

Radix *perennis.* Caulis *procumbens, baſi repens.* Folia *ſubpetiolata obtuſa.* Corollæ *ſaturate cærulea.* Capſulæ *ſubrotundæ, gibbæ.*

10. VERONICA, *Anagallis aquatica*, racemis lateralibus, foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto. *Linn. Spec.* 16. [*Hall.* 533.]

H. In foſſis, & aquis ſtagnantibus, *bey der obern Papier-Mühle* frequens; *bey der untern Walkmühle*, rarius. Floret Junio, Julio.

Radix *annua.* Caulis *erectus.* Folia *amplexicaulia, acuta.* Corollæ *carneæ.* Capſulæ *obovatæ.*

11. VERONICA, *ſcutellata*, racemis lateralibus, pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Linn. Spec.* 16. [*Hall.* 532.]

H. in pratis paludoſis, circa pagum *Sinn*, frequens. Floret Julio.

Radix *ſubrepens.* Caulis *pedalis, ſimpliciſſimus, ſuberectus, teres, lævis.* Folia *oppoſita, lineari lanceolata; inferiora integerrima, ſuperiora longiora ſerrata; ſerraturis oppoſitis remotis, inciſura inæquali bifidis, retrorſum verſis.* Pedunculi *ex alis ſuperioribus, foliis longiores, pauci* (5-7) *flori, alterni.* Pedicellis *antheſi peracta ſecundis, pendulis.* Calyx *æqualis, Corolla brevior.* Corolla *dilutiſſime cærulea, demum lactea. Lacinia ſuperiore venis ſanguineis lineata.* Capſula *cordata, profunde emarginata, acute marginata, octoſperma.* Semina *planiuſcula.*

12. VERONICA, *Teucrium*, racemis lateralibus longiſſimis, foliis ovatis rugoſis dentatis obtuſiuſculis, caulibus procumbentibus. *Linn. S. N.* 58. *Spec.* 17. [*Hall.* 537.]

H. unico in loco ſterili, montoſo, umbroſo, in dumetis *oben im Fiſchweyer-Grund.* Floret Junio, Julio.

In meis Speciminibus Caules *quam* VER. *Chamædr. duriores, villoſiores, baſi ramoſi, procumbentes;* Folia *ſolidiora, omnia ſubpetiolata, ſupra fere lævia, ſubtus nervoſa, obtuſiora, obtuſiusque dentata.* Racemi *ex axillis ſuperioribus & inferioribus prodeunt longiſſimi, ſtrictiores, denſioresque.* Flores *numeroſiores, ſubſpicati.* Bracteæ *minores.* Calycina *foliola ſubinæqualia, trinervia.* Corollæ *lacinia ſuperior ſaturatius & pulchrius cærulea.* Capſulæ *non diſſimiles.*

TEUCRIUM hoc eſt VERUM BEROLINENSIUM, *ad uſum diæteticum,* Theæ chinenſis *præſtantiſſimum ſuccedaneum.* A TEUCRIO SPURIO (VER. *Chamædr.*) *his notis facile diſtinguendum.*

13. VERONICA, *montana*, racemis lateralibus pauciſloris, calycibus hirſutis, foliis ovatis rugoſis crenatis petiolatis, caule debili. *Linn. Spec.* 17. [*Hall.* 539.]

H. in ſylvis umbroſis, *im Hirſchberg* frequens. Floret Julio. Caulis *ultrapedalis, procumbens baſi repens, teres, diſtiche piloſus* Folia *magna, omnia oppoſita petiolata; terræ incumbentia ſubtus rubra, nitida.* Pedunculi *longiſſimi, ex foliorum alis intermediis.* Pedicellis 5-9. *remotis.* Calycina *Foliola ſubæqualia, imprimis baſi hirſuta.* Corolla *magnitudine fere ſequentis, dilutius cærulea.* Capſula *magna, ſuborbiculata, compreſſa, acute marginata, ciliata.* Semina *ſex ſeu octo, planiuſcula, ſtriata.*

14. VERONICA, *Chamædrys*, racemis lateralibus, foliis ovatis rugoſis dentatis ſeſſilibus, caule debili. *Linn. Spec.* 17. [*Hall.* 536.]

H. in pomariis, ad ſepes paſſim. Floret Majo, Junio. Radix *repens.* Caules *erecti, infirmi, ſimplices.* Folia *amplexicaulia, inferiora minora ovato-ſubrotunda, ſuperiora majora ovato-oblonga ſubacuta.* Racemi *laxi ex axillis ſuperioribus tantum foliorum.* Bracteæ *lanceolatæ obtuſæ.* Calycina foliola *lanceolata inæqualia.* Corolla *ſpectoſa, cærulea.* Capſula *exacte obcordata, polyſperma.*

c. *Pedunculis uniſloris.*

15. VERONICA, *agreſtis*, floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo brevioribus. *Linn. Spec.* 18. [*Hall.* 549.]

H. in agris (ſæpe flore albo) arvis & cultis, paſſim. Floret Aprili & ſeq.

16. VERONICA, *arvenſis*, floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus. *Linn. Spec.* 18. [*Hall.* 54.]
H. in cultis paſſim; *am Sieghauſs*, frequens. Floret Julio & ſeq.

17. VERONICA, *hederifolia*, floribus ſolitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Linn. Spec.* 19. [*Hall.* 550.]
H. in agris & cultis, vulgatiſſima. Floret Majo & ſeq.
Folia *inferiora triloba*. Calycis *foliola cordata, ciliata, æqualia*. Corolla *exigua, carnea*. Capſula *didyma*. Semina 4, *magna, hinc convexa rugoſa, inde excavata*.

18. VERONICA, *triphyllos*, floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus. *Linn.* S. N. 58. *Spec.* 19. [*Hall.* 551.]
H. in agris & arvis *am Dollberg*. Floret Martio, Aprili.

19. VERONICA *verna*, floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce brevioribus. *Linn.* S. N. 58. *Spec.* 19. [*Hall.* 552.]
H. cum præcedente rarius, in arvis *am Rehberg* infrequens. Floret Aprili.

20. VERONICA, *acinifolia*, floribus ſolitariis pedunculatis, foliis ovatis glabris crenatis, caule erecto ſubpiloſo. *Linn. Spec.* 19. [*Hall.* 547.]
H. in cultis oleraceis *in der untern Pütze*, rariſſima, jam dudum lecta. Floret Majo.

UTRICULARIA. *G. P.* 31.

Cor. ringens, calcarata. *Cal.* 2-phyllus, æqualis. *Capſ.* 1-locularis. S. N. 61.

21. UTRICULARIA, *vulgaris*, nectario conico, ſcapo paucifloro. *Linn. Spec.* 26. [*Hall.* 290.]
H. in paludibus infra pagum *Sinn*. Floret Julio.

*** *Flores inferi, monopetali, irregulares. Fructus gymnoſpermi.*

VERBENA. *G. P.* 32.

Cal. 5-dentatus, unico dente truncato. *Cor.* infundibuliformis, ſubæqualis, curva. *Sem.* 2-(4, nuda. (*Stam.* 2-(4.) S. N. 62.

22. VERBENA, *officinalis*, tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido - laciniatis, caule ſolitario. *Linn. Spec.* 29. [*Hall.* 219.]

H. in ſterilibus, ruderatis, ad vias prope *Burck* & *Offenbach*; in Horto meo vitium pervulgare. Floret Julio, Auguſto. *Pharm.* VERBENÆ Herba.

LYCOPUS. *G. P.* 33.

Cor. 4-fida: lacinia unica emarginata. *Stamina* diſtantia. *Semina* 4, retuſa. S. N. 63.

23. LYCOPUS, *europæus*, foliis ſinuato - ſerratis. *Linn. Spec.* 30. [*Hall.* 220.]

H. ad foſſas; ad ripas *Dillæ; an der Muhlbach*, paſſim. Floret Julio, Auguſto.

Semel hanc plantam legi: Caule *quadripedali.* Floribus *omnibus* femineis, *ſ.* ſtaminibus *deſtitutis.*

**** *Flores ſuperi.*

CIRCÆA. *G. P.* 24.

Cal. diphyllus, ſuperus. *Cor.* dipetala. *Sem.* 1. biloculare. S. N. 56.

24. CIRCÆA, *lutetiana.* caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis. *Linn.* S. N. 56. *Spec.* 12. [*Hall.* 813.]

H. in nemoroſis *in der Hörre*, verſus *Bicken*, copioſe. Floret Julio, Auguſto.

Fructus *ſiliculoſus, obovatus, exſiccatus levi preſſione baſi dehiſcens, bivalvis.* Semina *duo, oblonga, diſſepimento proprio, plano affixa.*

B. *DIGYNIA.*

ANTHOXANTHUM. *G. P.* 42.

Cal. Gluma 2-valvis, 1-flora. *Cor.* Gluma 2-valvis, acuminata. *Semen* 1. S. N. 6.

25. ANTHOXANTHUM, *odoratum*, ſpica ovato-oblonga, floſculis ſubpedunculatis ariſta longioribus. *Linn. Spec.* 40. [*Avena Hall.* 1491.]

H. in pratis, pomariis, inque ſylvis, abunde. Floret Aprili & ſeq.

T. II. f. 1. Gramen *odoratum*, *fœni aroma*. *Bobus*, *Ovibus* & *Equis gratum præbet pabulum*. Radix *fibroſa*, *odorata*, *perennis*. Culmi 1-2-*pedales*, *erecti*, *binodes*, *foliati*, *læves*. Folia radicalia *ſubanguſta*, *ſupra pubeſcentia*. Folia culmea *lanceolata*, *utrinque ſubſcabra*. Ligula *obtuſa*, *crenulata*. Vaginæ *ſtriatæ*, *læves*, *inferiores ſubvilloſæ*, *rufeſcentes*. Panicula *ſpicata*. Pedunculi *faſciculati*, *breviſſimi*, *ſubramoſi*, *erecti*, *ante & poſt floreſcentiam coarctati*, *inferiores remotiores*. Corollæ valvulæ *duæ æquales*, *parallelæ*, *baſi coalitæ*, *piloſæ*, *ſerrulatæ*, *ſemibifidæ*, *longitudine* Valvulæ calycinæ (a. A.*) *minoris*. *nec majoris* G. P. l. c.) V exterioris Ariſta *ex dorſi medio prodit*, *recta*, (X*) *calyce brevior*. V. interioris Ariſta *juxta baſin inſerta*, *geniculata*, (X) *calyce paulo longior*, *denum reflexa tortilis*. (a. f. f. c.) Nectarii Valvula exterior *trinervia*, *obtuſiſſima*: interiorem *duplo minorem*, *uninerviam*, *amplectens*, Germen, Filamenta *que includens*, *teretem figuram acquirit*. (L. l.)

Variat α) Spica duplici f. ramoſa; β) Glumis calycinis pubeſcentibus.

CLASSIS III.

T R I A N D R I A.

A. *MONOGYNIA.*

* *Flores ſuperi.*

VALERIANA. *G. P.* 44.

Cal. 0. *Cor.* 1-petala, baſi hinc gibba, ſupera. *Semen* 1. S. N. 72.

26. VALERIANA, *dioica*, floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Linn. Spec.* 44. [*Hall.* 208.]

H. in pratis uliginoſis, *in der Callenbach*, & alibi frequens. Floret Majo.

Maris Corolla Piſtillo *imperfecto ſterili*, Feminæ *triplo minor*, *rudimentis* ſtaminum *in fundo corollæ inſtructa*.

Radix *odoratu ſequente gratior*.

27. VALERIANA, *officinalis*, floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Linn. Spec.* 45. [*Hall.* 210.]

H. in pratis ſylvaticis, dumetis, *am Rehberg*; alibique. Floret Julio.

Pharm. VALERIANÆ MINORIS Radix.

28. VALERIANA, *Locuſta olitoria*, floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Linn. Spec.* 47. [*Hall.* 214.]

H. in agris inter ſegetes; in cultis ubique vulgaris. Floret Majo.

Hujus folia primaria hyberno tempore in acetaria recipiuntur, vulgo Korn-Lattig *dicta.*

Corollæ *cæruleæ.* Semina *nuda, bipartibilia.*

29. VALERIANA, *Locuſta dentata*, caule dichotomo, floribus triandris, foliis oblongis ſubſerratis, ſeminis corona tridentata. *Linn. Spec.* 48. *var. præc.* δ. [*Hall.* 215.]

H. inter ſegetes, *auf dem Reuterberg* frequens. Floret Julio.

Corollæ *carneæ.* Semina *hinc convexa enervia, inde angulata, binervia, non bipartibilia.* Corona *tri-ſæpe* 5-*dentata, dente intermedio triplo majore.*

IRIS. *G. P.* 59.

Cor. 6-partita: *Petalis* alternis reflexis. *Stigmata* petaliformia. S. N. 77.

30. IRIS, *Pſeud-Acorus*, corollis imberhibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. *Linn. Spec.* 56. [*Hall.* 1260.]

H. in foſſis, ad ripas *Dillæ; an der Muhlbach*, frequens. Floret Majo.

Pharm. ACORI PALUSTRIS, ſ. ADULTERINI (*male*) Radix.

** *Flores inferi.*

POLYCNEMUM. *G. P.* 53.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 5, calyciformia. *Sem.* 1, ſubnudum. S. N. 74.

31. POLYCNEMUM, *arvenſe. Linn. Spec.* 50. [*Hall.* 1570.]

H. in arvis & agris arenoſis *am Dollberg*, inter Solanum tuberoſum, lecta 1771, nunc rariſſima. Floret Julio, Auguſto.

Radix *annua.* Caulis *breves, jam baſi in ramos diviſus.* Rami *procumbentes, ſimplices ſ. ſubdiviſi, ſtriati, ſubpiloſi, baſi interiore callo nodoſi, proſtrati, unde Nomen.* Folia *numeroſa, ſubulata, carinata, mucronata.* Flores *axillares, ſeſſiles, ſolitarii.* Folie calycina *conſtanter duo in noſtrate, lanceolata, ariſtata, corolla duplo longiora.* Petala 5, *ovata, acuminata.*

Stamina tria corollæ breviora. Germen *intra tunicam filo, ex latere non baſi prodeunte affixum.* Stylus *bifidus, ex latere oppoſito adſcendit membranæ apicem perforans, uti in nonnullis* Chenopodiis; Stigmata *globoſa.* Semen *reniforme punctatum* Capſula *tenui membranacea* (Herniariæ) *incluſum, leviſſima preſſione baſi demittitur.*

*** *Flores Graminei, valvulis Glumæ calycinæ.*

SCHŒNUS. *G. P.* 65.

Glumæ paleaceæ, univalves, congeſtæ. *Cor.* o. *Sem.* 1, ſubrotundum, inter glumas. S. N. 80.

32. SCHŒNUS, *compreſſus,* culmo ſubtriquetro nudo, ſpica diſticha, involucro monophyllo. *Linn. Spec.* 65. [*Scirpus Hall.* 1342.]

H. in pratis uliginoſis *hinter dem Homberg.* Floret Majo.

T. I. f. 1. Radix *horizontalis, teres, articulata,* Geniculis *setoſis.* Culmi *ſpithamæi l. pedales, erecti, inferne ſquamati, ſubfoliati, ultra medium nudi, compreſſo-teretes, læves, infra ſpicam triquetri, ſcabri.* Folia *vaginantia, canaliculata, lævia, apice ſcabra, ſuperiora culmo florenti longiora.* Involucri Folium *baſi latiuſcula amplectente, ſetaceum, triquetrum, ſcabrum, ſpica vix longius.* (b) Spicæ Rachis *flexuoſa, compreſſa.* Spiculæ 9-11-13, *alternæ, diſtichæ, ovato-oblongæ,* (a. c.) *ferrugineæ, 7-9-floræ: Singulæ* Calyx proprius *univalvis, convexus, ſubtrinervius, acutus.* (a) Corollæ *univalves,* (c) *ſublanceolatæ, planiuſculæ, uninerviæ, anguſtiores, calycis longitudine:* (a. c.) Receptaculo *brevi, tereti, abſque ordine adfixæ. Singulæ* Filamenta 3, *ſupra* Antheras *in mucronem producta.* (M*) Germen Receptaculo proprio, *truncato adnatum.* (n) Stylus *longitudine corollæ.* Stigma *bifidum, cirrhoſum, pubeſcens.* (o) Semen *triquetrum,* (f.) *ſetis ſex ſcabris* (⊙) *obvallatum.*

CYPERUS. *G. P.* 66.

Glumæ paleaceæ, diſtiche imbricatæ. *Cor.* o. *Sem.* 1, nudum. S. N. 81.

33. CYPERUS, *fuſcus,* culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis ſimplicibus inæqualibus, ſpicis confertis linearibus. *Linn. Spec.* 69. [*Hall.* 1349.]

H. in foſſis, & pratis uliginoſis, infra pagum *Sinn,* rarius. Floret Julio.

T. I. f. 2. Radix *fibroſa, annua?* Culmi *ſpithamæi, foliis* 2. *ſ.* 3. *vaginantibus ad baſin veſtiti ſubnudi, triquetri, læves.* Folia radicalia *carinata; lævia, longitudine culmi.* Folium involucri *infimum, culmo fere longius, duo reliqua umbellam ſuperantia, ſæpe quartum breviſſimum.* Pedunculi *triquetri, baſi vaginati; (*) intermedius breviſſimus, ſpiculis obtectus.* Spiculæ *lanceolato-lineares, compreſſæ, e fuſco nigricantes,* 9-11-13-*floræ.* Glumæ *carinatæ, acutæ.* (c) Stilus *bi ſ. trifidus.* Semen *nudum* (ſ).

SCIRPUS. *G. P.* 67.

Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. *Cor.* 0. *Semen* 1, imberbe. S. N. 82.

34. SCIRPUS, *paluſtris*, culmo tereti nudo, ſpica ſubovata terminali. *Linn. Spec.* 70. [*Hall.* 1336.]

H. in foſſis, paludibus, ad ripas *Dillæ* frequens. Floret Majo & ſeq.

T. I. f. 3. Radix *obliqua, teres, articulata, ſubrepens, ſquamata.* Culmi 1-2-*pedales, erecti, ſtricti, teretes, læves, nudi, farcti.* Vaginis *ad baſin veſtiti obtuſis, aphyllis, ſumma longiore truncata.* Folia radicalia *culmo ſimillima, breviora, acuta.* Spica *ovato-oblonga, acuta, magnitudine varia,* Squamis *imbricata acutis:* (c) *quarum infimæ duæ oppoſitæ, latiores, obtuſiores,* (b) *fructificatione deſtitutæ.* Germen *apice productum, gibbum* (N). Stylus *ſemper bi-* (*nec* 3-) *fidus.* (o) Semen *ſetis quatuor, calyce brevioribus, cinctum.* (S.) *Suibus recens gratiſſimum pabulum.*

35. SCIRPUS, *ſetaceus*, culmo nudo ſetaceo, ſpicis lateralibus ſubſolitariis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 73. [*Mariſcus Hall.* 1345.]

H. in rivulis pratorum *hinter dem Homberg*; locis inundatis *bey der untern Walkmuhle*; & alibi frequens. Floret Julio.

T. I. f 6. Radix *horizontalis, fibroſa.* Culmi *palmares, ſpithamæi, erecti, ad baſin ſquamati, ſubfoliati, dein nudi, teretes, læves, acuti.* Folia *ſubvaginantia, ſetacea, canaliculata, lævia.* Spiculæ 1. ſ. 2, *rarius* 3, *ovatæ, exiguæ, pauciforæ: ex culmi fiſſura laterali, infra apicem rectum erumpentes, florentes ſeſſiles,* (⊙) *inferior ſiduæ*) *maturo ſemine pedunculata.* Pedunculo *brevi horizontali.* (+) Glumæ *ſubpurpureæ, nervo viridi.* (c) Semen *hinc convexum, ſtriatum, inde planum, nudum ſ. villis deſtitutum* (ſ. S)

36. SCIRPUS, *ſylvaticus*, culmo triquetro folioſo, umbella foliacea, pedunculis nudis ſupradecompoſitis, ſpicis confertis. *Linn. Spec.* 75. [*Hall.* 1340.]
H. in pratis udis, ſecus rivulos paſſim. Floret Junio, Julio.
T. I. f. 4. (Umbellæ pedunculus.) Radix *lignoſa*, *teres*, *deſcendens*. Culmus 1-2-*pedalis*, *erectus*, *foliatus*, *ſubtrigonus*, *lævis*. Folia *latiſſima*, *carinata*, *apice producto obtuſiuſculo*, *colorato: marginibus carinaque hiſpida*. Folia *umbellæ ſubjecta alterna*, *conſimilia*. Umbella *ſupradecompoſita*, *maxime multiflora*. Pedunculi *numeroſi*, *inæquales*, *ſubtrigoni*, *ad baſin vaginati*, *bracteati*. Spiculæ *exiguæ*, *ovatæ*, *ſolitariæ*, *& confertæ*, *ſeſſiles & pedicellatæ*, *e fuſco-nigricantes*. Semen *villis* 4 *ſ.* 6, *brevibus cinctum*. (f. S.)

ERIOPHORUM. *G. P.* 68.

Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. *Cor.* o. *Semen* 1, *Lana* longiſſima cinctum. S. N. 84.

37. ERIPHORUM, *polyſtachion*, culmis teretibus, foliis planis, ſpicis pedunculatis. *Linn. Spec.* 76. [*Hall.* 1331.]
H. in pratis uliginoſis, *hinter dem Homberg*, *im Guldners Grund*, alibique. Floret Majo.
T. I. f. 5. Radix *lignoſa*, *teres*. Culmus *ultrapedalis*, *erectus*, *foliatus*, *ſubtrigonus*, *lævis*, *ſubtrinodis*. Folia culmi 3, ſ. 4, *vaginantia*, *lanceolato-acuminata*, *latiuſcula*, *plana*, *lævia*. Involucrum *monophyllum*, *perſiſtens*, (b) *ſubulatum*, *ſubcarinatum*, *antrorſum obliquum*, *demum erectum*: *baſi ventricoſa*, *ſtriata*, *ſpicas amplectens*. Bracteæ *tot quot pedunculi*, *involucro ſimiles*, *gradatim minores*, *deciduæ* (b*). Pedunculi *alterni*, *inæquales*, *baſi vaginati*, *breves*, *dein longiores*. Spicæ *florentes ovatæ*, *erectiuſculæ*, *ſubnudæ*, *maturo ſemine oblongæ*, *pendulæ*, *villis occultatæ*. Glumæ *ovatæ*, *acutæ*, *nervo nullo*, (c) *dein majores* (c*). Semen *villis decuplo longioribus*, *albis*, (*per lentem*) *linearibus*, *planis*, *ſimplicibus*, *cinctum*. (S. c.)

NARDUS. *G. P.* 69.

Cal. o. *Cor.* 2-valvis. S. N. 84.

38. NARDUS, *ſtricta*, ſpica ſetacea recta ſecunda. *Linn.* S. N. 84. *Spec.* 77. [*Hall.* 1410.]
H. in pratis ſterilibus, ad pagos *Mademühlen* & *Rehe*; in udis infra *Sinn*. frequens. Floret Julio.

T. I. f. 7. Radix *denſa, fibroſa, perennis.* Culmi *ſpithamæi, pedales, erecti, ſtricti, nudi, ſubangulati, ſubpubeſcentes, ſcabriuſculi: unico Geniculo prope baſin, & uno Foliolo brevi, ſetaceo, ſupra baſin inſtructi.* Folia radicalia *numeroſa, longa, filiformia, ſubſcabra, erecta, inferiora ad angulum obtuſum diſcedentia.* Ligula *ovata, prominula* Vaginæ *folior. membranaceæ, albidæ, inferiores aphyllæ.* Spicæ Rachis *hinc convexa, inde excavata, marginibus alternatim dentatis, ſcabris, pro floſculorum inſertione;* (y) *apice ſupra floſculos in mucronem ſetaceum, brevem, producta* (+). Floſculi *ſubviolacei, pubeſcentes alterni, per paria magis approximati, ſecundi, erecti, ſubfloreſcentia diſcedentes.* (c. C.)

B. *D I G Y N I A.*

* *Flores uniflori, vagi.*

PANICUM. *G. P.* 76.

Cal. 3-valvis: valvula tertia minima. S. N. 86.

39. PANICUM, *glaucum*, ſpica tereti, involucellis bifloris faſciculato-piloſis, ſeminibus undulato-rugoſis. *Linn.* S. N. 86. *Spec.* 83.

H. in arvis *am Dollberg;* jam dudum repertum, nunc rariſſimum Gramen. Floret Julio.

T. II. f. 2. +. Radix *fibroſa, annua.* Culmi *pedales*, erecti, *foliati* (†) *quadrinodes*, apice ſulcati, læves. Folia *latiuſcula* (††), *plana, lævia:* (†††) *ſummo ſpica ſæpe longiore.* Ligulæ *loco*, Pili conſerti, albidi, longi, inprimis

---

(†) CULMUS:

1. Nudus - - -	*ſi baſi tantum*	*Foliorum* Vaginis *veſtitus.*
2. Subnudus - -	*ſi quarta pars inferior*	
3. Subfoliatus -	*ad medium usque*	
4. Foliatus - -	*ſi magna ex parte*	

(††) LATITUDINEM Foliorum graminum *determinavi:*

1. Capillaria, Filiformia; Setacea: *anguſtiſſima, lateribus involutis ſ. conduplicatis, ſupra ſulco exarata.*

2. Anguſtiſſima,	*Lineam dimidiam*	*lata.*
3. Anguſta -,	*Lineam unam*	
4. Subanguſta,	*Lineas duas*	
5. Latiuſcula,	*Lineas tres*	
6. Lata,	*Lineas quatuor*	
7. Latiſſima,	*Semipollicem & ultra*	

(†††) Folia lævia, *omni* ſcabritie *pagina* ſuperiore & inferiore (nec marginibus) *deſtituta.*

ex infimis vaginis longius prominentes. Vaginæ *ſtriatæ*, *læves*. Spica *ſequentis*: Floſculis in ſeries diſpoſitis, *triplo majoribus*, ſubſeſſilibus, ſolitariis, *geminisque*, & Setis *demum flavis* brevioribus, (b) quam in P. viridi *compoſita*. Calyx *nervoſus* pubeſcens. (A. *. **. ***.) Corolla *Calyce minor*. (c. C.) Petalum tertium *ovatum. acutum*, *planum*, (‡) *inter* Cal. *valvulam pläniorem*, & Corollæ *valvulam interiorem; ſecundi floſculi forte rudimentum*. Semen ſtriis *transverſis*, *undulatis* rugoſum. (f. S.)

40. PANICUM, *viride*, ſpica tereti, involucellis bifloris faſciculato - piloſis, feminibus nervoſis. *Linn. Spec.* 83. [*Hall.* 1542.]

H. in agris & arvis *am Dollberg & Homberg* frequens; in cultis *am Steghauſs*, rarius. Floret Julio, Auguſto.

T. II. f. 2. Radix *anaua*. Culmi 1 - 1½ *pedales*, *obliqui*, *foliati*, *trinodes*, apice ſtriati, ſcabri. Folia *latiuſcula*, pagina ſuperiore ſcabra. Lingulæ *loco*, ſeries pilorum brevium, decurrens. Vaginæ *ſubcompreſſæ*, *læves*. Spica *ovato-cylindracea*, *inæquali craſſitie*, *viridis*, *uno latere ſæpe ſubviolacea*. Pedunculi *breviſſimi*, Pedicellis *vix conſpicuis*, *nodoſo - truncatis*, *floſculos per paria* (3 f. 4.) *adfigentes*. (y. b.) *Singulum par* Setis *pluribus* albidis f. violaceis, Floſculis quadruplo longioribus *involucratum*. (b) Calyx lævis. Valvula minor 3 - *nervia*; (*) huic oppoſita *triplo major*, *margine tertiam amplectens*, *convexa*, 7 - *nervia*. (**) tertia *plana*, 5 - *nervia*. (***) Semen nervoſum nitidum (f.) Petalum Corollæ tertium *in præcedente*, *ſequente*, & P. miliaceo *ſemper præſens*, *in hoc nullum*.

41. PANICUM, *Crus Galli*, ſpicis alternis conjugatisque, ſpiculis ſubdiviſis; glumis ariſtatis hiſpidis, rachi quinquangulari. *Linn. Spec.* 83. [*Hall.* 1544.]

β. Gramen paniceum ſpica diviſa, ariſtis longis armata. Bauh *Pin.* 8.

H. α, Floſculis vix ariſtatis, in cultis *auf dem hinter Sand*; β. Ariſtis longiſſimis, humentibus locis *an der Muhlbach*, *bey dem Steghauſs Bruckgen*, frequens. Floret Julio, Auguſto.

T. II. f. 3. Radix *annua*. Culmi 1 - 2 *pedales*, *craſſi*, *obliqui*, *ſuberecti*, *ramoſi*. Ramis *floriferis*, *foliati*, *apice nudi*, *læves*: Articulis 3, f. 4, *inferioribus divaricatis*, Geniculis *incraſſatis*, *cylindraceis*, *fuſcis* Culmi Folia *latiſſima*, *plana*, *utrinque lævia*, *marginibus hiſpida*. Ligulæ *loco*, *membrana*

brevis, triangularis, adnata fuſca. Vaginæ *laxæ, ſubcompreſſæ, ſiſſæ, læves; inferiores acutæ, aphyllæ.* Rachis univerſalis *linearis, planiuſcula, ſcabra: ſubtus angulo unico vix eminente, duobus lateralibus acutioribus, & ſupra unico, ſulco diviſo, eminentiori, pro ramorum inſertione, inſtructa.* Spicæ *alternæ, rarius conjugatæ, ſubſecundæ, ſubdiviſæ, terminali ſimpliciore.* Rachis partialis *trigona, ſubflexuoſa, ſubdiviſa: ad baſin pilis faſciculatis, albidis, involuerata.* Floſculi *conferti, ſecundi:* Pedunculis *breviſſimis, ſubdiviſis, ad baſin faſciculatopiloſis, (in var. β, manifeſtius.)* (y. b.) *adfixi.* Calyx *nervoſus, pubeſcens, ſcaber*; Valv. minor (*) & convexa (** *mucronata;* Tertia *plana ariſtata:* (***) Ariſta *terminali, ſcabra, recta, in* var. *α*, *brevi*, (a. *** X) *in β, gluma decuplo longiore.* (a ſ. +) Petalum corollæ tertium *membranaceum, planum, acuminatum,* (c*) *inter calycis valv. planiorem & cor. V. interiorem.* (A. C*)

42. PANICUM, *ſanguinale*, ſpicis digitatis baſi interiore nodoſis, floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. *Linn. Spec.* 84. [*Digitaria Hall.* 1526.]

H. in arvis arenoſis *hinter dem Schloſs; am Dollberg* & *Homberg*, frequens. Floret Julio, Auguſto.

T. II. f. 6. Radix *annua.* Culmi *foliati, læves,* Articulis *tribus: inferioribus duobus procumbentibus, ſupremo obliquo longiſſimo. Ex* Geniculis Rami *floriferi.* Folia *latiuſcula, brevia, ſublanceolata, lævia.* Ligula *crenulota.* Vaginæ *ſubcompreſſæ, ſanguineæ, læves, punctatæ. punctis eminentibus, ſolitariis confertisque, ſetiferis, vix conſpicuis.* Spicæ 3-4 *ſ.* 5, *lineares, alternæ, breviſſime pedunculatæ, Culmo inter ſpicas lineari-trigono, flexuoſo, mediante callo axillari, pilifero,* (*) *inſertæ: ex vaginis erumpentes erectæ, parallelæ;* (+) *florentes horizontales, terminali erecta.* Rachis (y) *linearis, ſubflexuoſa, plana, ſcabra, ſupra nervo eminenti, pro Floſculorum inſertione inſtructa.* Floſculi *latere convexo Rachi appreſſi,* (y.) *gemini, ſæpe terni in ſingulo dente, pedunculati.* Pedunculo *infimo,* Floſculo *breviore, ſecundo ejusdem longitudinis, tertio* (ſi adeſt,) *longiore.* Calyx *muticus, pubeſcens.* (a A) Valv. minima (*vix lente dignoſcenda, ſæpiſſime omnino nulla*) *triangularis, trinervia.* (A*) Secunda *huic oppoſita, obtuſa, tertiam margine amplectens, ſubconvexa* 5-*nervia;* Tertia *plana, trinervia, acuta, ſubviolacea.* Corolla *calyce minor.* (c. C.) Stigmata *purpurea.* (o) Semen, *rufum nitidum.* (ſ. S.)

Digitized by Google

ALOPECURUS. *G. P.* 78.

Cal. 2-valvis. *Cor.* univalvis. S. N. 89.

43. ALOPECURUS, *pratenſis*, culmo ſpicato erecto, glumis villoſis, corollis muticis. *Linn.* S. N. 89. *Spec.* 88. [*Hall.* 1539.]

H. in pratis ubique copioſiſſime. Floret Majo & ſeq.

T. II. f. 4 Radix *multiplex*, *fibroſa*, *perennis*. Culmi 1-2-*pedales* & *erecti*, *trinodes*, *foliati*, *læves*. Folia *lata*, *lævia*. Ligula *ovata*, *obtuſa*. Vaginæ *læves*, *ſuprema longiſſima*, *ventricoſa*. Spica *ovato-cylindrica*. Floſculi *imbricati*. Rachis *glabra* Pedunculi *breviſſimi*, *congeſti*, ſubramoſi, *tri-quadriflori*. (+) Calycis Valvulæ *baſi connatæ*, *hinc convexæ*, *inde depreſſæ*, *trinerviæ*, *pubeſcentes*, *acutæ*; *carina pilis albidis*, *planis*, *flexuoſis*, *patulis*, *ciliatæ*. (A.) Cor. Valvula *compreſſa*, 5 *nervia* acuta, *nuda*, *vix calyce brevior*: Ariſtam *juxta baſin exſerens geniculatam*, *duplo longiorem* (X. c. C.) Antheræ *cæruleſcentes*, *flavæ*, *dein cinereæ*. *Bobus bonum præbet pabulum.*

Variat. Culmo *orgyali*; Spica 4-5-*pollicari*, *craſſa*, *ſubinterrupta*, Glumis *majoribus*, *villoſioribus*; Pedunculis *longioribus*, *multifloris*. Ad ripas *Dillæ* frequens. Floret ſerius Julio, Auguſto.

44. ALOPECURUS, *agreſtis*, culmo ſpicato erecto, glumis lævibus. *Linn.* S. N. 89. *Spec.* 89. [*Hall.* 1540.]

H. in agris inter Hordeum, *am Galgenberg*, rarius. Floret Junio.

T. II. f. 5. Radix *annua*. Culmus 1-1½ *pedalis*, *erectus*, *ſubtrinodis*, *foliatus*, apice nudus, *ſubſcaber*. Folia *ſubanguſta*, *ſupra ſcabra* Ligula *obtuſa*. Vaginæ *carinali nervo ſcabræ*, *ſuperior ſubventricoſa*. Spica *teres*, *gracilis*, *longa*, *lævis*. Floſculi *laxe imbricati*, *breviſſime pedunculati*, *ſolitarii*, *gemini*, *terni*. Pedunculi ſimplices ſ. indiviſi. Calycis Valvulæ nudæ, *ultra medium baſi connatæ*, *ſuperne latiores*, *acutæ*, *ſubviolaceæ*, (a. A.) carina ſetis breviſſimis, erectis, *ciliatæ*. Cor. Valvula obtuſa. (c. C.) Ariſta *ex baſi prodit duplo longior*, *geniculata*, *divaricata*. Filamenta *breviſſima*, *baſi lanceolata*, (m*) *ſub floreſcentia calyce longiora*, *æqualia*. (m)

45. Alopecurus, *geniculatus*, culmo ſpicato infracto, corollis muticis *Linn.* S. N. 89. [*Hall.* 1541.]

H. in pratis udis, ſtagnis, & foſſis aqua repletis, paſſim. Floret Junio & ſeq.

T. II. f. 7. Radix *fibroſiſſima, perennis.* Culmi *pedales, obliqui, adſcendentes, foliati: Articulis* 5-6. *divaricatis; in foſſis & aquis quietis, tri-quadripedales, ramoſiſſimi, Articulis, foliisque numeroſioribus, natantes.* Folia *latiuſcula, plana, pagina ſuperiore ſcabra.* Ligula *oblonga, obtuſa* Vaginæ *ſubcompreſſæ, laxæ, læves, ſuprema ſpicam ſæpe attingens, ventricoſa* Spica *cylindrica, florens ex viridi-violacea* Floſculi *denſius imbricati.* A. pratenſi *duplo minores.* Pedunculi *exigui, ſubramoſi,* 3-5-*flori* (+) Calyx *magis hians.* Valvulæ *vix ſupra baſin connatæ, pubeſcentes, carina ciliatæ, marginibus repandis.* (A.) Cor. Valvula *trinervia, nuda,* obtuſiſſima, crenulata. (c. C.) Ariſta *geniculata, calyce ſeſquilongior.* Antheræ *violaceæ, exiguæ.* (m) Styli *baſi connati.* (N.)

PHLEUM. *G. P.* 77.

Cal. 2-valvis, ſeſſilis, linearis, truncatus, apice bicuspidato. *Cor.* incluſa. S. N. 88.

46. Phleum, *pratenſe*, ſpica cylindrica longiſſima ciliata, culmo erecto. *Linn.* S. N. 88. *Spec.* 87. [*Hall.* 1528.]

H. in pratis humentibus frequens; Spica ſemipedali *unter der neuen Brücke* rarius. Floret Julio.

T. III. f. 1. Radix *ramoſa, perennis.* Culmus 3-ſ. 4-*pedalis, baſi bulboſus, erectus, ſtrictus, quadrinodis, foliatus, lævis.* Folia *lata, patentia, pagina ſuperiore carinaque ſcabra.* Ligula *oblonga, obtuſa, fiſſa.* Vaginæ *ſtriatæ, læves, nervo carinali ſcabra.* Spica *ſæpe ſemipedalis exacte cilindrica, obtuſiſſima.* Floſculi *denſiſſime conferti, florentes divergentes.* Pedunculi *breviſſimi, (per lentem) ſubramoſi:* Pedicellis *vix conſpicuis, baſi confluentibus, bifloris* (+) Cal. Valvulæ *punctatæ, punctis ſetiferis, trinerviæ, compreſſæ, cuſpidatæ. Carina ciliatæ ſetis albidis, patulis, flexuoſis, alternis brevioribus, ſuperioribus furcatis.* (a A) Cor. Valvula exterior 5-*nervia, nuda, acutiuſcula, crenulata.* (C.) Nectaria *duo, ovata, acuminata.* (l. L.) Germen (n) *baſi ambientia.* (L.) Antheræ *violaceæ, dein cinereæ. Equis gratiſſimum pabulum.*

47. Phleum,

47. PHLEUM, *nodoſum*, ſpica cylindrica, culmo adſcendente, foliis obliquis, radice bulboſa. *Linn.* S. N. 88. *Spec.* 88. [*Hall.* 1530.]

H. ad verſuras; *auf dem Schluſſel*; in campis ſteriliſſimis; *auf dem Homberg*, & alibi frequens. Floret Julio.

T. III. f. 2. Radix *ex* Bulbis *conſtat pluribus*, *concatenatis*, *tunicatis*, *fuſcis*, *baſi fibroſis*. *Singuli Bulbi* Culmus *ſolitarius*, *ſemi & pedalis*, *vaginis foliorum obtectus*, *articulis infimis* 5. f. 6. *divaricatis obliquis*, *reliquis* 2. f. 3. *longioribus*, *erectis*. Folia *bifaria*, *obliqua*, *anguſta*, *utrinque ſcabra*. Ligula *truncata*, *ſemimultifida*. Vaginæ *ſubcompreſſæ*, *ſubſcabræ*, *ſuprema ſpicam fere attingens ſubventricoſa*: Foliolo *brevi* (*ſæpe*) *ovato-acuto*, *inſtructa* Spica *præcedentis*, *magis ſcabra*, 1-1½ *pollicaris*; *Solo ſicciori ovalis*, *vix ſemipollicaris* (+). Floſculi *duplo minores*, (a A) *infimi ſemper emarcidi ſteriles*. Calycis *cuſpides maturo ſemine magis incurvæ*. (a. f.) Antheræ *albidæ*, *erumpentes ruſæ*.

Gramen *hoc ſolo ceſpitoſo pinguiori tranſplantatum*, *ſubſequenti anno in* P. pratenſe *tranſiit*.

PHALARIS. *G. P.* 74.

Cal. 2-valvis, carinatus, longitudine æqualis, corollam includens. *S. N.* 85.

48. PHALARIS, *canarienſis*, panicula ſubovata ſpiciformi, glumis carinatis. *Linn. Spec.* 79.

H. in cultis *auf dem Schieſsplatz* rarius, incerta civis exoticæ originis. Floret Julio.

T. VII. f. 3. +. Calyx exterior *membrana carinali auctus*, *corolla major*. (+. a.) Cal. interior *etiam bivalvis*, *baſin corollæ veſtiens*, *minor*, (a*) *cum corolla pubeſcens*. (c)

49. PHALARIS, *arundinacea*, panicula oblonga ventricoſa ampla. *Linn. S. N.* 86. *Spec.* 80. [*Arundo Hall.* 1524.]

H. ad ripas *Dillæ* frequens. Floret Junio, Julio.

T. VII. f. 3. Radix *craſſa*, *lignoſa*, *fibroſa*. Culmus *orgyalis*, *erectus*, *firmus*, *foliatus*, 5-6-*nodis*, *lævis*. Folia *bifaria*, *latiſſima*, *plana*, *lævia*, *ſuperne verſus apicem ſcabra*; *ad baſin utrinque aucta membrana cartilaginea*, *albida*, *acutiuſcula*. Ligula *crenulata*. Vaginæ *ſtriatæ læves*. Panicula *in ſpicæ formam coarctata*, *ſemipedalis*: *florens ventricoſa*, *mutica*,

varie colorata. Pedunculi *depreſſi*, *gemini* ſ. *terni*, *inferiores baſi coaluti*, *ſquamula acuta bracteati.* Floſculi *imbricati*, *ſecundi*, *ſub floreſcentia pedicellis breviſſimis divergentes.* Cal. Valvula exterior *paulo minor.* (a. A.) Corolla *baſi piloſa.* (c. C.) Antheræ *rubræ* Styli *baſi connati.* (N. O.) Nectaria 2, *lanceolato-acuminata*, (I. L.) *margine exteriore unidentata.* Gramen *noſtratium fere maximum*, *termetendum*, *ut gratius evadat pecoribus.* Var. viviparam: *Panicula ſpicata*, Petalis *in foliola excreſcentibus*, *ſæpe legi* an der Dille.

MILIUM. *G. P.* 79.

Cal. 2-valvis, uniflorus. *Cor.* breviſſima. *Stigmata* penicilliformia. *S. N.* 89.

50. MILIUM, *effuſum*, floribus paniculatis diſperſis muticis. *Linn. Spec.* 90. [*Hall.* 1525.]

H. in ſylvis, *in der Hörre* frequens. Floret Junio.

T. VIII f. 7. Radix *fibroſa.* Culmus 2 ſ. 3-*pedalis*, *erectus*, *binodis*, *ſubſoliatus*, *lævis.* Folia *latiuſcula*, *plana*, *utrinque ſcabra.* Ligula *oblonga*, *truncata.* Vaginæ *ſtriatæ*, *læves.* Panicula *ſemipedalis*, *laxa*, *patens.* Pedunculi *capillares*, *ſubramoſi*, *flexuoſi*, *ad baſin nodoſi*, *exiguis ſquamulis bracteati*, *horizontales*, *demum reflexi.* Calycis valv. exterior *ventricoſior*, *latior: utraque trinervia*, *glabra.* (a. A.)

AGROSTIS. *G. P.* 80.

Cal. 2-valvis, uniflorus, corolla paulo minor. *Stigmata* longitudinaliter hiſpida. *S. N.* 90.

a. *Ariſtatæ.*

51. AGROSTIS, *ſpica venti*, petalo exteriore ariſta recta ſtricta longiſſima, pauicula patula. *Linn.* S. N. 90. *Spec.* 91. [*Avena Hall.* 1480.]

H. inter ſegetes *in der Aue*, alibique copioſe. Floret Julio.

T. IIII. f. 1. Radix *annua.* Culmus 3. ſ. 4-*pedalis*, *foliatus*, *quadrinodis*, *lævis.* Folia *lata*, *patula*, *pagina ſuperiore pubeſcentia*, *inferiore ſcabra.* Ligula *longa*, *truncata*, *fiſſa.* Vaginæ *ſtriatæ*, *ſubſcabræ.* Panicula *ampla*, *pedalis*, *patens*, *colorata*, *demum ſubnutans.* Pedunculi *verticillati*, *numeroſi*, *patentes*, *compreſſi*, *ſcabri.* Calyx *lævis*, *apice ſcaber.* (a. A.)

Valv. exterior *paulo brevior.* Corollæ V. exterior *figura & magnitudine* V. Cal. *interioris:* (C.) Ariſtam *paulo infra apicem exſerens rectam, quadruplo longiorem.* (X.) Nectaria *ovata, acuta.* (I. L.)

AGROSTIS, *calamagroſtis*, panicula incraſſata, petalo exteriore toto lanato, apice ariſtato, culmo ramoſo. *Linn. Spec.* 32. [*Arundo Hall.* 1521.]

H. in ſylvaticis paludoſis *im Hirſchberg* ad *Pagum Guntersdorf.* Floret Julio.

Radix *denſa, fibroſa, arcte implexa.* Culmi 4. ſ. 5-*pedales, in noſtrate non ramoſi, erecti, ſtricti, ſcabri, binodes.* Geniculo *unico juxta baſin,* altero *in culmi medio.* Folia radicalia *ſesqui- & bipedalia, duriuſcula, lata, albido-viridia, baſi involuta, utrinque inprimis ſubtus ſcaberrima.* F. culmea, *inferiora plura præmorſa ſeu emarcida,* 2. ſ. 3. *ſtricta, patentiſſima:* Vaginis arctis, *ſcabriuſculis;* Ligula *oblonga, acuta, fiſſa.* Panicula *ſemipedalis, oblonga, ante & poſt floreſcentiam in ſpicæ formam contracta, florens, patens:* Pedunculis *verticillatis ſtrictis, ad angulum acutum diſcedentibus, baſi in nodum calloſum coalitis;* Pedicellis *breviſſimis:* Floſculis *denſe confertis, ſubſecundis.* Calyx *uniflorus, glumis æqualibus, ſubulatis, dorſo hiſpiduſculis: exteriore anguſtiore mucronata, ruſeſcente.* Corolla *membranacea, albida, baſi lanata, pilis inæqualibus, calyce paulo brevioribus:* Petalum exterius *acuminatum, apice fiſſo, calyce dimidio minus;* Ariſtam *ex dorſi medio exſerens rectam, craſſitie ubique æqualem, ſcabram, calyce breviorem:* Petalum *interius duplo minus, apice bifidum.* Nectaria *duo lanceolata, baſi calloſa, germen ambientia.* Stamina longitudine corollæ. Antheræ bifurcæ, ochroleucæ Germen *ſubrotundum.* Styli *patentes, craſſiuſculi.* Stigmata *denſa, plumuloſa.* Semen *acuminatum, corollæ adnatum, lana cinctum.* Ariſta *erecta, paulo longiore.*

52. AGROSTIS, *canina*, calycibus elongatis, petalorum ariſta dorſali recurva, culmis proſtratis ſubramoſis. *Linn.* S. N. 90. *Spec.* 92. [*Avena Hall.* 1479.]

H. in pomariis & pratis ſiccioribus *hinter dem Schloſs*; in humidioribus *im Guldners-Grund;* & alibi frequens. Floret Julio.

T. IIII. f. 2. Radix *ſubrepens.* Culmi 1-2 *pedales, erecti, foliati, læves, infimis articulis procumbentibus, divaricatis;* Geniculis 4. ſ. 5: *ex inferioribus faſciculi foliorum breves, ſæpe*

Rami *floriferi.* Folia radicalia *anguſtiſſima, longa, plana, lævia.* Culinea *latiora, utrinque ſcabra.* Ligula *oblonga, fiſſa, prominens.* Vaginæ *læves, ſuprema longiſſima, ſcabra.* Panicula *elongata, coarctata; florens diffuſa, e violaceo-purpurafcens, ſplendensque, demum palleſcens.* Pedunculi *numeroſi, capillares.* Calycis V. exterior *apicem verſus hiſpiduſcula.* (a. A.) Corolla *calyce minor, dorſo hiſpida, apice trifida.* Ariſta *ex dorſi medio prodit, alba, recta, demum geniculo fuſco reflexa, tortilis.* (C. S. X.) *Corolla duplo longior.* Cor. V. interior *ſæpiſſime omnino nulla: Si adeſt, minutiſſima, apice retuſa;* (C*) *ſi deficit.* Germen *baſi interiori adnatum,* Nectariis 2, *triangularibus antice cinctum.* Antheræ *cæruleæ.*

b. *Muticæ.*

53. AGROSTIS, *ſtolonifera*, paniculæ ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus æqualibus. *Linn.* S. N. 90? *Spec.* 93? [*Poa. Hall.* 1473?]

H. in ſylvis, locis umbroſis muſcoſis, *im Beilſtein, am Homberg*, frequens. Floret Julio.

T. IIII. f. 6. Culmi *plures, erecti, tenues, infirmi, pedales:* Articulis *inferioribus divaricatis repentibus baſi ſubbulboſa cohærentes, ramoſi.* Folia culmea *anguſta, plana, debilia, lævia, plerumque emarcida.* Ligula *brevis, obtuſa.* Vaginæ *laxæ, læves.* Panicula 2-3-*pollicaris, laxa, divaricata, pauciflora, mutica.* Pedunculi *capillo fere tenuiores, horizontales, recti.* Pedicelli *breves, undulato divaricati.* Floſculi *omnium noſtratum minimi, albidi.* Calyx *ſubæqualis:* V. exter. *dorſo,* interior *baſi ſcabra.* (A.) Cor. V. exterior *calyce paulo brevior, baſi ſubpiloſa, apice trifida.* (C.) V. interior ⅓ *brevior.* (C*) *Totum gramen albeſcit.* An Var. A. albæ? an ſequentis?

54. AGROSTIS, *capillaris*, panicula capillari patente, calycibus ſubulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. *Linn. Spec.* 93. [*Poa Hall.* 1475.].

H. in pomariis, pratis, & ad verſuras paſſim. Floret Julio.

T. IIII. f. 3. Radix *ſuprepens.* Culmi *obliqui, florentes erecti, foliati,* 3 *ſ.* 4-*nodes,* 1 *ſ.* 2 *pedales.* Folia *latiuſcula, utrinque ſcabra.* Ligula *brevis, truncata.* Vaginæ *læves, plerumque purpureæ.* Panicula 3-4-5-*pollicaris, patens, e ſpadiceo-purpuraſcens, demum palleſcens.* Pedunculi *verti-*

cillati, capillares, ramoſiſſimè, patentes. Calyx *æqualis, mucronatus, e violaceo purpureus, albido-marginatus, nervis viridibus:* V. exterior *dorſo denticulato tota*, interior *apice tantum hiſpida.* (A.) Corolla *calyce paulo minor, apice triſida, lævis.* (C.) Antheræ *albidæ. Hujus* Varietatem viviparam *annuatim legi, in montoſis ſterilibus* am Homberg: Calycibus *duplo majoribus;* Corollis *in foliola ſubulata excreſcentibus.* (+)

55. AGROSTIS, *alba*, panicula laxa, calycibus muticis æqualibus. *Linn. Spec.* 93? [*Poa, Hall.* 1475? Var. *major præcedentis.*]

H. in foſſis, & locis ſabuloſis inundatis, *auf der Burgermeiſter-Wieſe; unter der neuen Brucke.* Floret Julio.

T. IIII. f. V. Culmi 2-3 *pedales, erecti, foliati, articulis pluribus, infimis repentibus, cohærentes, ramoſi.* Folia *latiuſcula, utrinque ſcabra* Ligula *oblonga, obtuſa, prominens.* Vaginæ *læves, internodia vix ſemitegentes.* Panicula *ſemipedalis, coarctato-patula, mutica.* Verticilli *denſi, ſubremoti* Pedunculi *numeroſi, ſuberecti, flexuoſi, mutici:* Pedicellis *breviſſimis, divaricatis; copioſiſſimisque floſculis, ad baſin confertioribus, undique obtecti.* Floſculi *albidi, dein flaveſcentes.* Calycis Valvulæ *ſub antheſi horizontaliter diſcedente.* (A.) Corolla *erecta, ſubventricoſa, apice trifida, Calyce brevior.* (C.) Varietas Agr. *capillaris.*

56. AGROSTIS, *dubia*, calycibus æqualibus lævibus, corollis infra apicem mucronatis, foliis ſetaceis. [*Poa, Hall.* 1476?]

H. in montoſis apricis *am Homberg.* Semel jam dudum lectum. Floret Julio.

T. IIII. f. 4. Radix *ſubrepens.* Culmi *pedales, adgregati, adſcendentes, erecti, ſubfoliati, binodes* Folia radicalia *anguſtiſſima, ſetacea, apice ſcabra.* F. culmea *brevia, ſetacea, ſcabra,* Vaginis *lævibus,* Ligula *obtuſa.* Panicula 1-2-*pollicaris, anguſta, ſubcoarctata.* Pedunculi *breves, ſolitarii, inferiores terni.* Calyx *ſpadiceo-virens, lævis.* (A.) Corolla *dorſo ſcabra, apice bifida, mucrone brevi exſtante infra apicem inſtructa,* (C.) V. interior ½ *brevior, retuſa.* Var. AGR. *caninæ?*

DACTYLIS. *G. P.* 86.

Cal. 2-valvis, compreſſus: altera valvula majore, carinate. *S. N.* 95.

57. DACTYLIS, *glomerata*, panicula ſecunda glomerata. *Linn. Spec.* 105. [*Bromus Hall.* 1512.]

H. in pratis, & ad verſuras paſſim. Floret Junio & ſeq.

T. III. f. 3. Radix *multiplex*, *fibroſa*, *perennis*. Culmi 2-3-*pedales*, *erecti*, *foliati*, *quadrinodes*, *ſuperne nudi ſcabri*. Folia *lata*, *patentia*, *ſubglauca*, *utrinque ſcaberrima*. Ligula *oblonga*, *obtuſa*, *fiſſa*. Vaginæ *ſubcompreſſæ*, *acute carinatæ*, *ſcabræ*. Panicula *ſubſpicata*, *coarctata*, *florens ſecunda*, *ſæpe colorata*. Pedunculi *ſolitarii*, *alterni*, *angulati*, *firmi*, *ſubpubeſcentes*, *ſcabri*, *baſi interiore nodoſi*, *bis ſ. ter bifidi*: *quorum inferior* (*rarius duo*) *remotior*, *longior*, *patens*, *demum horizontalis*, *ſubreflexus*. Spiculæ *ſubſeſſiles*, *geminorum glomeratæ*, *oblongæ*, *obtuſiſſimæ*, *bi*- (**) *tri* (***) *rarius quadrifloræ*, (‡) *adpreſſæ*, *florentes divergentes*. Calyx *pubeſcens*, *ſæpe ciliatus*, *carinatus*, *ſcaber*, *ſubariſtatus*: *hinc convexus latior*, (+) *inde depreſſus duplo anguſtior*, (‡) *corolla tenuior*; V. interior *duplo major*, *ariſtata*, *floſculos ſi duo adæquans*, *ſi plures ipſa ſpicula brevior*. Floſculi *ſcabri*, *albido-marginati*, *obtuſi*: Ariſta *terminalis brevis*, *in ultimo floſculo breviſſima*, *ſæpe nulla*. (c.) Cor. V. interior *vix brevior*, *apice acute bifida*. (C*) Nectaria 2, *lanceolata-acuminata*. (L.) Filamenta *corolla duplo longiora*. (m.) Antheræ *flavæ*. Germen *ovatum*. (n.) Stigmata *plumoſa*. (o.) Semen *oblongum*, *ſulco brevi ſub apice notatum*. (S.) *diſcedens*. (c. f.) Duriſſimum dat pabulum; Equis vix pecoribus prodeſt. Canibus folia inſtante pluvia deglutientibus, vomitorium.

** *Flores biflori*, *vagi*.

AIRA. *G. P.* 81.

Cal. 2-valvis, 2-florus. *Floſculi* abſque interjecto rudimento. *S. N.* 91.

a. *Muticæ*.

58. AIRA, *cœrulea*, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto-ſubulatis, foliis planis. *Linn.* S. N. 91. *Spec.* 95. [*Arundo Hall.* 1518.]

H. in pratis humidis, *oben im Fiſchweyer-Grund.* Floret Auguſto.

T. IIII. f. 7. Radix *ſubbulboſa*, *vaginis tunicata*, *fibras ex baſi emittens tenaciſſimas*. *Singuli* Bulbi Culmus 1-2-*pedalis*, *ſubfoliatus*, *unico geniculo juxta baſin interceptus*, *dehinc longiſſime enodis*, *erectus*, *ſtrictus*, *nudus*, *lævis*. Folia radicalia *ultrapedalia*, *anguſta*: Culmea *latiuſcula*, *longa*, *plana*, *firma*, *ſtriata*, *apicem verſus involuta*, *lævia*, *ſupra marginibusque* (*ſæpe*) *ſubvilloſa*. Ligulæ *loco*, *ſeries villorum brevium*. Vaginæ *ſtriatæ*, *læves*. Panicula *elongata*, *coarctata*, *triquadripollicaris*, *Calycibus bifloris*, (1-2) *humidiori & fertiliori ſolo ſæpe ultrapedalis*, *Calycibus 3-floris*. (3) Pedunculi *plures*, *longi*, *erecti*, *flexuoſi*, Pedicellis *brevibus uni ſ. bifloris*. Calyx *inæqualis*, *corolla minor*: Valvulis *violaceis*, *uninerviis*. (A. a.) Corolla *trinervia*, *violacea*, *marginibus involutis*. (c. C) Stylus *inter floſculos*, *ex pedicello elongato*, *nudus*, (y*) *ſæpe floſculo imperfecto inſtructus*. (Y*) Nectaria *duo*, *apice crenata*. (l. L.) Antheræ *atro-cæruleæ*. Styli *baſi nudi*, *reflexi*. Stigmata *plumoſa*, *purpurea*. (O.) Semen *oblongum*, *ſubfuſcum*. (c. f.)

b. *Ariſtatæ*.

59. AIRA, *ceſpitoſa*, foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatisque: ariſta recta brevi. *Linn. Spec.* 96. [*Avena Hall.* 1487.]

H. in pratis copioſiſſime. Floret Junio, Julio.

T. IIII. f. 8. Radix *multiplex*, *fibroſa*. Culmi 3 *ſ.* 4 *pedales*, *erecti*, *ſtricti*, *ſubfoliati*, *binodes*, *læves*. Folia *plana*, *firma*, *ſubtus lævia*, *pagina ſuperiore epidermide plicato acutiſſimisque denticulis armato ſeptemſulcata*, *omnium noſtratium ſcaberrima*: Fol. radicalia *anguſta juniora conduplicata*; Fol. culmea *latiuſcula*, *patentia*. Ligula *oblonga*, *obtuſa*, *ſuprema bifida*. Vaginæ *ſtriatæ*, *læves*. Panicula *pedalis*, *patens*, *ſubfuſca*, *ſplendens*. Internodia *ſemiteretia ſcabra*. Pedunculi *verticillati*, *baſi in nodum coaliti*, *angulati*, *ramoſiſſimi*. Calyx *inæqualis*. (a. A.) Corolla inferior *baſi nuda*; (C. +) Superior *minor*, *baſi piloſa*, (C. X.) *pedicellata*, Pedicello *demum elongato*, *ſupra calycem prominens*. (C.) Cor. V. exterior *calyce brevior*, 3-*ſ.* 5-*nervia*, *apice* 3-*ſ.* 5-*fida*, *obtuſa*. (C.) Ariſta *ex baſi produt recta*, *corolla vix longior*. (X.) Nectaria 2, *ovata*. (L.) Stylus *inter floſculos*, *abſque rudimento tertii*. (C. y*) Var. Calycibus *tri & quadrifloris* (3. 4.) *ſæpe legi in pratis humentibus*, hinter dem Homberg. *Serius florens*, Auguſto.

60. AIRA, *flexuoſa*, foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuoſis. *Linn. Spec.* 96. [*Avena Hall.* 1486. var. β.]

H. in ſylvaticis montoſis, muſcoſis. *Am Homberg* rarius; *am Beilſtein* copioſe. Floret Julio.

T. V. f. 1. Radix *ramoſa*, *fibroſa*, *perennis*. Culmi 1-2 *pedales*, *ſubfoliati*, *erecti*, 2-ſ 3-*nodes*, *læves*. Folia *ſetacea*: radicalia *vaginis albidis nitidis*, *varie curvata*, *lævia*, culmea *recta*, *ſubſcabra*. Ligula *ovata*, *obtuſa*, *bifida*. Vaginæ *ſubſcabræ*, *ruf*e*ſcentes*. Panicula *pauciflora*. Pedunculi & Pedicelli *gemini*, *angulati*, *divaricati*, *cum internodiis flexuoſi*. Glumæ *ſubfuſcæ*, *nitentes*. Calyx *inæqualis*. (a. A.) Floſculus *inferior ſeſſilis*, ſuperior *breviſſime pedicellatus*; *uterque albidus*, 4-*nervius*, *baſi piloſus*, *apice quadrifidus*: (c C.) Ariſtam *ſupra baſin exſerens rectam*, *dein geniculo reflexam*, *tortilem*, (X c f.) *corolla paulo longiorem*. Valv. interior *vix brevior*. (C*)

61. AIRA, *montana*, foliis ſetaceis, panicula anguſtata, floſculis baſi piloſis ariſtatis: ariſta tortili longiore. *Linn. Spec.* 96? [*Avena Hall.* 1486. var. α]

H. in montoſis apricis, *im Beilſtein* copioſe. Floret Junio.

T. V. f. 2. *Specimina mea certe præcedentis ſunt varietates*: Foliis radicalibus *longioribus*, *erectis*; Culmis *agregatis*, *purpureis*; Panicula *magis & pulchrius colorata*, *ſplendente*; Pedunculis *rectis*, *nec undulatis*; Floribus *numeroſioribus*; Calycibus *ſub floreſcentia magis hiantibus*; Floſculis *baſi piloſioribus*, (C. c.) *longius ariſtatis*, (C. S.) *vix differunt*.

62. AIRA, *caryophyllæa*, foliis ſetaceis, panicula divaricata, floribus ariſtatis diſtantibus. *Linn. Spec.* 97. [*Avena Hall.* 1482.]

H. in campis apricis arenoſis, *an der Hörre*, verſus *Dreisbach* frequens. Floret Majo, Junio.

T. 5. f. 7. Radix *denſa*, *fibroſa*, *perennis?* Culmi *dodrantales*, *erecti*, *foliati*, *binodes*, *læves*. Folia radicalia *ſetacea*, *vix ultra pollicaria*, *lævia*: *plura baſi in faſciculos ſubbulboſos*, *tunicatos*, *collecta*. F. culmea *ſetacea*, *brevia*, *recta*, *ſcabra*. Ligula *oblonga*, *bifida*. Vaginæ *ſcabræ*: *ſuprema amplior*, *paniculam ante floreſcentiam baſi obvolvens*. Paniculæ Pe-

dunculi *gemini*, *longi*, Pedicellis *brevibus* Calyx *ſubinæqualis*, *albidus*, *purpureo-maculatus*, *nitidus*. Floſculi 2, *calyce fere breviores*, *baſi ſubpiloſi*, *apice ſubtrifidi*, *ſuperior pedicellatus*, *diſtans* *Utriuſque* Ariſta *ex baſi prodit*, *recta*, *purpurea*, *apice alba*, *ſubtortilis*, (c. f.) *vix calyce longior.*

MELICA. *G. P.* 82.

Cal. **2-valvis, 2-florus.** ***Rudimentum*** **floris inter floſculos.** ***S. N.*** **92.**

63. MELICA, *nutans*, petalis imberbibus, panicula nutante ſimplici. *Linn. Spec.* 98. [*Poa Hall.* 1472.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg*; *Beilſtein*; in rupibus *am Geiſtlichenberg*. Floret Majo.

T. III. f. 4. Radix *ſubrepens*. Culmus 1-2-*pedalis*, *erectus*, *compreſſo-tetragonus*, *tri-ſ. quadrinodis*: *ad baſin ſquamis vaginantibus*, *alternis*, *acutis*, *fuſcis*, *dein ultra medium uſque* Vaginis *folio-um tetragonis*, *ſcabris*, *veſtitus*. Folia culmea 3 *ſ.* 4; *quorum inferiora breviora*, *convexa*, *ſuperiora ſubcarinata*, *latiuſcula*, *pagina ſuperiore pubeſcentia*, *marginibus & partim carina ſcabra*. Ligulæ *loco*, *margo brevis*, *membranaceus*, *fuſcus*. Panicula *ſecunda*, *ſubnutans*: *vel*, *ſimpliciſſima*, *racemiformis*, *pedicellis alternis*, *flexuoſis*, *uni-ſ. bi-floris*; *vel ramoſa*. Pedunculo *uno alterovè inferiore longiore*, *patente*, 3 *ſ.* 4 *floro*. Calycis valvulæ *purpuraſcentes*, *albido-marginatæ*, (a A) exterior 3-interior 5-*nervia*. Cor. V. exterior *flaveſcens*, 7-*nervia*. (c. C) Nectarium *monophyllum*, *horizontale*, *orbiculatum*, *planum*, *foveola excavatum*, *pro* Germinis *inſertione*. (l. L.) Filamenta *baſi connata* (n. N.) Antheræ *flavæ*. (m) Germen *obovatum*, *turbinatum*. (N) Styli *infra medium nudi*. Stigmata *plumuloſa*. (o) Semen *fuſcum*, *hinc convexum*, *inde ſulco notatum*. (ſ) *Ex pedicello elongato* Stylus *inter floſculos prominens*, *capitulo turbinato*, (+) *ſeu tertii* (*ſæpe & quarti*) *floſculi rudimento*, *demum bivalvi*, (+*) *terminatus*.

*** *Flores multiflori, vagi.*

BRIZA. *G. P.* 84.

Cal. **2-valvis, multiflorus. Spicula diſticha: valvulis cordatis, obtuſis: interiore minuta, S, N, 94.**

64. BRIZA, *media*, ſpiculis ovatis, calyce floſculis (7) breviore. *Linn. Spec.* 103. [*Poa. Hall.* 1448.]

H. in pratis, inque ſylvis paſſim Floret Junio.

T. VII. f. 2. Radix *perennis.* Culmus 1-2-*pedalis*, *erectus*, *foliatus*, *bi-rarius trinodis*, *lævis.* Folia *erecta*, *anguſta*, *brevia*, *ſuperiora utrinque ſcabra.* Ligula *brevis*, *truncata*, *prominula.* Vaginæ *læves.* Panicula *triangularis pauci-*(20-30) *flora.* Pedunculi *gemini*, *patentes*, *longi*, *violacei.* Pedicelli *capillares*, *flexuoſi.* Spiculæ 7-*floræ*, *ovato-cordatæ*, *glabræ*, *nitidae*, *coloratæ*, *nutantes*, *tremulæ.* Cal. Valvulæ 3-*nerviæ.* (a) Corollæ Valv. exterior *calyce major*, *ſubviolacea*, *margine albido*, *ſcarioſo ultra baſin producto.* (C) V. interior *incluſa*, *minima*, *apice retuſa.* (C.*) Nectaria 2, *oblonga*, *apice truncata*, *crenulata*, *margine exteriore unidenta.* (L) Styli *penduli*, *longi*, *baſi nudi.* (O) Semen *hinc excavatum.* (S.) Spiculis *minus coloratis albidis*, 9-11 *floris*, *ſæpe ludit* in ſylvis *Am Homberg*, & *Beilſtein.*

POA. *G. P.* 83.

Cal. 2.-valvis, multiflorus. *Spicula* ovata: valvulis margine ſcarioſis acutiuſculis. S. N. 92.

65. POA, *aquatica*, panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris linearibus. *Linn. Spec.* 98. [*Hall.* 1454.]

H. ad ripas *Lahnæ* circa *Dietz.* Floret Junio.

Paniculam tantum examinavi; ipſe gramen hoc nondum legi.

T. V. f. 5. *Paniculae Ramus.* Panicula *maxima.* Pedunculi *triquetri*, *ſcabri*, *ſuperne flexuoſi.* Spiculæ *ovato-lineares*, *ſubcompreſſæ*: *inferiores* 6-*floræ*, *ſuperiores* 7-9-10 *floræ.* Cal. Valvulæ *uninerviæ*, *interior acutior longitudine corollæ.* Rachis *lævis.* (y) Cor. V. exterior *obtuſiuſcula*, *ſtriata*, *nervis* 7 *parallelis*, (*per lentem*) *denticulatis.* (c. C.)

66. POA, *trivialis*, panicula diffuſa, ſpiculis trifloris baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Linn.* S. N. 93. *Spec.* 99. [*Confer. Hall.* 1464 & 1469.]

H. in montoſis ſiccis *am Dolberg*, & *Homberg*; in muris urbis & pontis novi frequens. Floret initio Junii ad finem uſque.

T. VI. f. 2. Radix *multiplex.* Culmi *numeroſi, adgregati, paralleli, erecti, ſtricti, foliati, trinodes, læves; juxta baſin* Gemmæ *purpuraſcentes ad genicula, pro futuro anno.* Folia radicalia *ſubanguſta, plana, pagina ſuperiore ſubſcabra, demum involuta.* Ligula *brevis, truncata.* Vaginæ *læves, nervo carinali acutiuſculo.* Panicula 3-4- *pollicaris, anguſta, ſubdiffuſa.* Internodia *ſemiteretia, ſubſcabra.* Pedunculi *ſcabri, inferiores terni, ſeu quini, pauci-* (5-7-9-) *flori, pedicellis breviſſimis.* Spiculæ *tri-ſ. quadrifloræ, ovato-lanceolatæ, ſpadiceo-purpureæ, nitidæ, floſculis apice flavis, magis quam in reliquis tribus ſequentibus coloratis, dorſo & baſi ſubvilloſis.* (c. C.) Nectaria *lanceolata, ſæpe bifida* (L) Antheræ *flaveſcentes.* Stylus *inter floſculos nudus; in tri-quadrifloriſque ſpiculis ſemper præſens.* (Y.*)

67. POA, *anguſtifolia*, panicula diffuſa, ſpiculis quadrifloris pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Linn. Spec.* 99. [*Hall.* 1460.]

H. ad verſuras, ſecus vias paſſim. Floret initio Maji, ad finem uſque.

T. VI. f. 3. Radix *repens.* Culmi *pedales, fertiliori ſolo 2-3-pedales, erecti, firmi, ſtricti, foliati, trinodes, læves.* Folia radicalia *erecta, longa, anguſtiſſima, pagina ſuperiore ſubpubeſcentia, demum involuta, filiformia.* Fol. culmea *latiuſcula, plana, obtuſiuſcula, firma, lævia, ſubtus, ſtriata, glabra: nervo carinali in ſuperioribus partim ſcabra.* Ligula *brevis, truncata.* Vaginæ *longæ, ſtriatæ, glabræ.* Panicula 3-4-5-*pollicaris, triangularis, diffuſa, ante & poſt floreſcentiam copioſiſſimis ſpiculis quaſi imbricata.* Internodia *inferiora lævia.* Pedunculi *inferiores plerumque quinque plures.* Spiculæ *ovatæ, acutæ, compreſſæ, 4-floræ, magnitudine valde variantes.* (1. 2. 3.) *Semper latiores, pallidius virentes, minus coloratæ nitenteſque, quam in reliquis.* Calyx *corolla paulo minor.* (2 A) Floſculi *baſi & dorſo valde villoſi.* (C.) Nectaria *baſi connata, gibba, apice brevi acuto.* (L) Antheræ *erumpentes rubræ, mox demiſſo polline e viridi flaveſcentes.* Floſculi *maturo ſemine decidentes, villis cohærent vagi, penduli.* (ſ.) Stylus *inter floſculos,* (y*) *ſi quiai, nullus. Junio Menſe Gramen hoc omne defloratum reperitur.* Folia radicalia *hinc inde enaſcentia, præcedentibus multo latiora, brevioraque obſervantur.*

68. POA, *pratenſis*, panicula diffuſa, ſpiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Linn. Spec.* 99. [*Hall.* 1462.]

H. in pratis noſtratibus infrequens; *Unter der neuen Brücke; an der Muhlbach*, & alibi parcius occurrit. Floret Julio ad finem usque.

T. VI. f. 4. Radix *multiplex*, *ſubrepens*. Culmi 3-4-*pedales*, *erecti*, *ſtricti*, *firmi*, *foliati*, 5 ſ. 6-*nodes*. Folia radicalia *pauca*, *emarcida*. F. culmea *latiuſcula*, *plana*, *utrinque ſcabra*. Ligula *brevis*, *truncata*, *ſæpe fiſſa*. Vaginæ *ſtriatæ*, *glabræ*. Panicula *ſemipedalis*, *ſubdivaricata*, *mutica*, *ſcabra*. Internodia *teretia*. Pedunculi *longi*, *patentes*, *valde hiſpidi*, *inferiores quini ſ. ſeni*. Pedicelli *divaricati*, *breves*. Spiculæ *lanceolatæ*, *acutæ*, *compreſſæ*, *margine acuto*, 3-4-5-*floræ in eadem ſæpe panicula*: *anguſtiores*, *minus copioſæ*; *magis diſtantes*, *magisque e luteo-virentes*, *quam in præcedentibus & ſequente*, *defloratæ ſubfuſcæ*, *apicibus floſculorum luteis*, *nitidis*. Calycis valvulæ *trinerviae*, *dorſo ſcabræ*, *exterior mucronata*. (A) Floſculi *dorſo & baſi ſubvilloſi*. (C) Nectaria 2, *apice bifida*. (L) Antheræ *violaceæ*, *cæruleſcentes*, *dein ochroleucæ*. *Ex geniculis inferioribus ſæpe faſciculi foliorum breves*, & *Culmi ſerius florentes enaſcuntur*. Paniculæ *pars ſuperior*, *uti racemi inferiores*, *ob tenuitatem & pondus ſpicularum*, *ſæpiſſime cernua*, *ſubnutans*.

69. P O A, *dubia*, panicula diffuſa, ſpiculis ovatis obtuſis ſubtrifloris baſi pubeſcentibus, vaginis foliisque ſubtus ſcabris. [*Confer. Hall.* 1465.]

P. trivialis

H. in pratis humidiuſculis ubique frequens; ad foſſas; *an der Dillæ*, & *Muhlbach* copioſe, etiam ſiccioribus locis gramineis pervulgaris. Floret fine Junii in Septembrem usque.

T. VI. f. 5. Culmi *pars infima terram humidam profunde perforans*, *ſub terra*, & *partim extra terram*. Radiculas *ex nodis emittit numeroſas*. Culmus *ſupra terram* 3 ſ. 4-*pedalis*, *erectus*, *foliatus*, *teres*, *ſuperne nudus*, *ſcaber*. Geniculis 3 ſ. 4, *ſubcylindraceis*, *ſcabriuſculis*. Folia radicalia *emarcida*. F. culmea *latiuſcula*, *plana*, *pagina ſuperiore ſubſcabra*, *inferiore marginibusque ſcaberrima*. Ligula *oblonga*, *prominens*, *culmum ſemiobvolvens*, *obtuſa*, *ſæpe fiſſa*. Vaginæ *ſubcompreſſæ*, *ſtriatæ*, *undique imprimis carinali nervo ſcabræ*. Panicula *ſemi ſæpe pedalis*, *diffuſa*, *patens*: *vel tota viridis*, *vel uno latere tantum*, *vel tota e violaceo-nigricans*. Internodia *teretia*, *ſubſcabra*. Pedunculi *verticillati*, *longi*, *angulati*, *patentes*, *flexuoſi*, *ſubfloreſcentia*

horizontales, recti. Singuli baſi incraſſato-calloſa, cum culmi nodo coalita. Spiculæ *exiguæ, exacte ovatæ, margine & apice obtuſiſſimæ, ſubnutantes, bi-ſeu triſloræ.* Floſculi *obtuſiuſculi, baſi & dorſo villoſi, calyce* (A) *paulo majores* (c C) Nectaria 2, *triangularia, acuta.* (L) Antheræ *violaceæ, dein cinereæ.* Calyce *diutius perſiſtente, floſculi maturis ſeminibus decidentes, villis cohærent penduli.* (c f.) *An* POA *paluſtris Linn. Spec.* 89? *ſecundum deſcriptionem* Scheuchzeri *plurimis notis convenit.*

70. POA, *annua*, panicula diffuſa angulis rectis, ſpiculis obtuſis, culmo obliquo compreſſo. *Linn. Spec.* 99. [*Hall.* 1466.]

H. in cultis, ad vias paſſim. Floret Aprili in hyemem usque.
T. VI. f. 1. Radix *annua.* Culmi *ſemi- & pedales, declinati, obliqui compreſſi, foliati, binodes, læves.* Folia *latiuſcula, plana, lævia, partim carinali nervo ſcabra.* Ligula *oblonga, acuta, ſæpe crenulata.* Vaginæ *compreſſæ, fiſſæ, albido-marginatæ læves.* Panicula *triangularis, patentiſſima, diffuſa, ſubſecunda.* Pedunculi *gemini, angulati, læves, horizontales, dein ſubreflexi.* Spiculæ *ovato-lineares, compreſſæ, obtuſiſſimæ, 3-4-5-floræ, virentes, ſeu in altis ex purpureo-albido-viridique colore pulchre variegatæ.* Floſculi *baſi ſubvilloſi, margine apicem verſus dentato-laceri.* (C.) Nectaria 2, *ovato-acuta, ſæpe bidentata.* (L.)

71. POA, *compreſſa*, panicula ſecunda coarctata, culmo obliquo compreſſo. *Linn. Spec.* 101. [*Hall.* 1455.]

H. in muris cœmeterii, urbis, & pontis novi; in arvis arenoſis ubique frequens. Floret Julio, Auguſto.
T. V. f. 4. Radix *ſuprebens.* Culmi *pedales, declinati, obliqui, adſcendentes, foliati, compreſſi, 4 ſ. 5. nodes, firmi, læves.* Folia *anguſta, erecta, plana, ſubcarinata, pagina ſuperiore ſubſcabra.* Ligula *obtuſa.* Vaginæ *compreſſæ, læves* Panicula *1-2-pollicaris, coarctata, ſecunda.* Pedunculi *breves, gemini.* Pedicelli *breviſſimi.* Spiculæ *ſubſeſſiles, approximatæ, lanceolato-lineares, acutiuſculæ, 5-6, ſeu 7-9-floræ, ſæpe coloratæ.* Floſculi *baſi ſubvilloſi.* (C.)

72. POA, *nemoralis*, panicula attenuata, ſpiculis ſubbifloris mucronatis ſcabris, culmo incurvo. *Linn. Spec.* 102. [*Hall.* 1469.]

β. Gramen cirrhoſa & villoſa ſpongia, ad ſingula genicula donatum, paniculatum alpinum. *Scheuchz. Agr.* 165.

H. in dumetis *am Homberg*, & *Geiſtlichenberg* frequens; β, in nemoroſis *im Beilſtein*, prope viam publicam. Floret Julio.

T. V. f. 3. Radix *ſubrepens.* Culmi 1-2-*pedales, infirmi, foliati,* 4-*ſ.* 5-*nodes, erecti, apice cum panicula antrorſum curvati.* Folia *anguſtiſſima, plana, pagina ſuperiore ſcabra.* Ligula *obtuſa, breviſſima.* Vaginæ *ſubcarinatæ, inferiores ſubſcabræ.* Panicula *anguſta, elongata, nutans, coarctata, ſub floreſcentia patens.* Internodia *ſcabra.* Pedunculi *ſubflexuoſi, tenues, pauciflori.* Spiculæ *bi-rarius triſloræ, dilute fuſcæ, luteſcentes.* Calyx *longitudine* (‡) (*ſi duo*) *floſculorum, mucronatus, ſcaber.* (A) Floſculi *mucronati, ſcabri, baſi ſubvilloſi.* (C)

Varietas *major*: Culmo *tripedali, magis incurvo, ſæpe ramoſo;* Panicula *majore, multiflora;* Pedunculis *pluribus, inferioribus quinis, ſ. ſenis, magis patulis;* Spiculis *tri-ſ. 4-floris; annuatim provenit* am Homberg. Poæ pratenſi (*meæ*) *nimis adfinis.*

Varietas β. Gramen *omnibus partibus minus.* Culmus *vix pedalis, erectus.* Panicula *ſuberecta, fere racemoſa, pauciflora.* Spiculæ *exiguæ, biſloræ, demum rufeſcentes.* Floſculi *plerumque ſteriles. Ex inferioribus Geniculis, & quidem e culmi fiſſura, fibræ enaſcuntur numeroſæ, purpuraſcentes, glomeratim arcte implexæ, nodum & culmi partem undique ambientes.* (β) *Non eſt inſectorum opus. In his ſpongiolis, cultello ſæpiſſime examinatis, nunquam veſtigia ullius Inſecti detegere potui, uti in* Bedeguar Roſæ. *Veræ ſunt excreſcentiæ fibrarum radicalium* (†) *a nimio ſucco nutritivo enatæ, quibus deciduis Gramen forte propagatur.*

73. POA, *criſtata*, panicula ſpicata, calycibus ſubpiloſis ſubquadrifloris pedunculo longioribus, petalis ariſtatis. *Linn.* S. N. 94. *Aira criſtata. Spec.* 94. [*Feſtuca. Hall.* 1444.]

H. in montoſis apricis ſiccis paſſim. Floret Julio.

T. V. f. 6. Radix *multiplex, denſa.* Culmi 2-3-*pedales, erecti, ſtricti, ſubfoliati, baſi ſubbulboſa* Vaginis *albidis, aphyllis veſtiti, bi ſ. trinodes, ultra medium enodes, nudi, infra & inter paniculam ſubtomentoſi.* Folia radicalia *anguſta, plana, utrinque pubeſcentia, marginibus pilis albidis ciliata.* Folia culmea *latiuſcula, plana, ſupra pubeſcentia,*

ſubtus nuda, marginibus ſcabris, ſubciliatis. Ligula *breviſſima, truncata, ſubfuca, ſubciliata.* Vaginæ *inferiores ſubvilloſæ, ſuperiores longæ, nudæ, ſcabræ.* Panicula *florens ſpiculis divergentibus patula, ut culmi internodia ſubtomentoſa, & pedunculi viſui pateant: ante & poſt floreſcentiam in ſpicæ formam contracta, ſubcolarata, mutica.* Pedunculi *breves, pubeſcentes, ſcabri, inferiores gemini ſ. terni.* Pedicelli *breviſſimi, alterni, inferiores triflori.* Spiculæ *bi-tri-rarius quadrifloræ.* Calix *inæqualis, ſcarioſus, compreſſus, carinatus, pellucidus, mucronatus, ſuperficie punctatus (per lentem) punctis ſetiferis, carina ſcaber, ſubciliatus.* (A) Floſculi *longitudine calycis, ſubariſtati, dorſo ſcabri.* (c. C.) Nectaria 2, *apice latiori oblique truncata, crenulata, margine interiore unidenta.* (L) Antheræ *cæruleæ, dein flavæ.*

Variat. *α.* Panicula *ſemipedali.* *β.* Pedunculo *inferiore uno alterove longiore, horizontali.* *γ.* Spiculis *nudis, lævibus, forte Hall.* 1445?

FESTUGA. *G. P.* 88.

Cal. 2-valvis. *Spicula* oblonga, teretiuſcula, glumis acuminatis. S. N. 96.

a. *Panicula ſecunda.*

74. FESTUCA, *ovina*, panicula ſecunda coarctata ariſtata, culmo tetragono nudiuſculo, foliis ſetaceis. *Linn. Spec.* 108.

α. Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra. *Scheuchz. Agr.* 279. (*Hall.* 1442. *α.*)

β. Gramen capillaceum locuſtis pennatis non ariſtatis. *Scheuchz. Agr.* 276. (*Hall.* 1442. *β.*)

H. *α*, in collibus apricis aridis ubique; *β*, in montoſis ſterilibus, *auf der Steinſeite*, & alibi freqnens. Floret Majo.

T. VIII. f. 3. Radix *denſa, fibroſiſſima, nigra.* Culmi *palmares, dodrantales, erecti, ſtricti, tetragoni, læves, nudi, duobus geniculis fuſcis, totidemque foliis ſetaceis, brevibus, ad baſin inſtructi.* Folia radicalia *numeroſa, brevia, ſetacea, ſubſcabra.* Ligula *brevis, margine prominula.* Vaginæ *læves.* Panicula 1-2-*pollicaris, coarctata, ſecunda.* Pedunculi *ſolitarii, breves, uniflori, inferior* 3-*ſ.* 4-*florus.* Spiculæ *teretes, ariſtatæ, ſubviolaceæ, pubeſcentes,*

florentes ſubdiſtichæ, (*Fig. infer.*) *tri-ſ. quadrifloræ.* Calyx *exiguus*, *corolla brevior.* (a) Floſculi *apice ariſtati*, *pubeſcentes*, *dorſo & margine ſcabri*, *ſæpe ciliati.* Nectaria 2, ovata acuta. (L.)

Fig. 4. ‡. *β.* Panicula *anguſtiore*; Spiculis *minoribus*: Floſculis *muticis*, *differt.*

Fig. 4. +. Varietatem *hanc legi in ſylvis* in der Hörre: Folia radicalia *copioſiſſima*, *filiformia*, *lævia.* Culmus *fere pedalis*, *vix tetragonus*, *lævis.* Panicula *ſecunda*, *patula*, *minime contracta.* Spiculæ *exiguæ*, *virides*, *glabræ*, *muticæ.*

Ovibus gratiſſimum pabulum.

75. FESTUCA, *duriuſcula*, panicula ſecunda oblonga, ſpiculis oblongis lævibus, foliis ſetaceis. *Linn.* S. N. 96. *Spec.* 108? [*Hall.* 1473.]

H. in paſcuis ſiccis *auf dem Geiſtlichen Berg*; & alibi frequens. Flores Junio.

T. VIII. f. 2. Radix *multiplex*, *denſa*, *fibroſa*, *fuſca.* Culmi 1-1½ *pedales*, *erecti*, *ſtricti*, *teretes*, *ſubfoliati*, *binodes*, *læves.* Folia radicalia *filiformia*, *ſulco exarata*, *ſubtrigona*, *ſcabra*, *uti culmi tenaciſſima.* Folia culmea 2 ſ. 3, *brevia*, *lateribus conduplicatis ſetacea*, *demum planiuſcula*, *anguſta*, *lævia* Ligula *brevis*, *fuſca.* Vaginæ *longæ*, *læves* Panicula 3-4-*pollicaris*, *anguſta*, *oblonga*, *ſecunda.* Internodia *angulata*, *lævia*, *dein flexuoſa.* Pedunculi *ſolitarii*, *firmi.* Spiculæ 5-6, *floræ oblongæ*, (+) *ſub floreſcentia diſtichæ*, (‡) *adſcendentes*, *panicula ſubnutante.* Floſculi *longius ariſtati*, *læves*, *vix apice ſcabri*, (C.) An vera?

76. FESTUCA, *rubra*, panicula ſecunda ſcabra, ſpiculis ſexfloris ariſtatis, floſculo ultimo mutico, culmo ſemitereti. *Linn. Spec.* 109. [*Hall.* 1440.]

β. Feſtuca foliis hirſutis latiuſculis, locuſtis paniculatis quinquefloris, ariſtatis, glabris. *Hall.* 1435.

H. *α*, in montoſis ſterilibus paſſim; *β.* in pratis ubique. Floret Junio, Julio.

T. VIII. f. 1. Var. *β.* Var. *α.* Radix *multiplex*, *fibroſa.* Culmi 1-2-*pedales*, *erecti*, *ſtricti*, *læves*, *binodes*, *inferne ſubfoliati*, *teretes*, *ſuperne longe nudi*, *altero latere ubi primarii pedunculi prodeunt planiuſculi*, *ſemiteretes.* Folia radicalia *ſetacea*,

ſetacea, filiformia, ſubcompreſſa, ſcabra. F. culmea *duo, ſubanguſta, plana, lævia, pagina ſuperiore molliſſime albido-villoſa.* Ligula *obtuſa, brevis.* Vaginæ *ſtriatæ, læves.* Panicula *patula, ſecunda.* Internodia *ſemiteretia, ſcabra.* Pedunculi *ſcabri, primarii gemini, multiflori.* Spiculæ 5 ſ 6. *floræ, pubeſcentes, ſcabræ, defloratæ cum culmo rufeſcentes.* Floſculi *ariſtati, ultimus ſemper imperfectus, ſterilis, brevius ariſtatus.* Nectaria *duo germen cingentia, apice bidentata* (L.)

Fig. I. *var* β. Culmis *numeroſioribus, aggregatis, tripedalibus;* Panicula *majore, patente, ſubdiffuſa,* Spiculis 5-7-*floris, majoribus, minus ſcabris, longius ariſtatis* (C.) *differt.*

77. FESTUCA, *myurus*, panicula ſpicata nutante, calycibus minutiſſimis muticis, floribus ſcabris ariſtis longis. *Linn.* S. N. 96. *Spec.* 109. [*Hall.* 1443.]

H. in arvis, & campis ſterilibus, apricis. *auf dem Homberg* frequens; *am Dollberg, bey dem Graben* rarius. Floret Julio.

T. III. f. 5. Radix *fibroſa, annua.* Culmi 1-1½ *pedales, obliqui, foliati, trinodes, teretes.* Folia radicalia *pauca, breviſſima, ſetacea, lævia.* F. culmea 3. ſ 4. *involuto-ſetacea, lævia, vix apice ſcabra, ſuperiora gradatim longiora* Ligula *brevis, ſubbipartita.* Vaginæ *culmum undique veſtientes, ſubangulatæ, ſtriatæ, læves, ſubviolaceæ; ſuperior longiſſima, amplior, paniculam attingens, baſi obvolvenſque.* Panicula *fere ſemipedalis, ſpicæformis, ſecunda, nutans.* Internodia *ſemiteretia, valde ſcabra.* Pedunculi *inferiores gemini ſ terni, erecti, ſpiculis alternis, ſubſeſſilibus; ſuperiores ſolitarii, breviſſimi.* Spiculæ 5-6 8-*floræ, diſtichæ, ſcabræ, adſcendentes.* Calyx *floſculis duplo minor:* Valv. exterior *minutiſſima.* (a. A.) Floſculi *ſtriati, hiſpiduſculi: denticulis ſetaceis, apice confertioribus, dorſo marginibuſque ſubciliati.* Ariſta *terminalis recta, tenuiſſima, ſcaberrima, demum ſubflexuoſa, floſculo & ipſa ſæpe ſpicula longior.* (C. c.) Panicula *cum culmo, maturo ſemine, ſubrufeſcens.*

Variat *ſteriliori ſolo:* Culmo *vix ſpithamæo;* Folio *ſupremo a ſpica remotiore;* Panicula *ſpicata:* Spiculis *minoribus, diſtinctioribuſque.*

b. *Panicula æquali.*

78. FESTUCA, *decumbens*, panicula erecta, ſpiculis ſubovatis muticis, calyce floſculis majore, culmo decumbente. *Linn. Spec.* 110. [*Hall.* 1434.]

H. in paſcuis ſterilibus *am Homberg* rarius; in pratis depreſſis *hinter dem Homberg*; infra pagum *Sinn*, frequens. Floret Junio.

T. VII. f. 5. Radix *denſa*, *fibroſa*, *ſubrepens*. Culmi 1-1½ *pedales*, *baſi ſubbulboſi*, *foliati*, *trinodes*, *decumbentes*; *florentes obliqui*, *adſcendentes*. Folia radicalia *longa*, *ſubanguſta*, *plana*, *ſupra*, *inprimis baſi piloſa*. F. culmea *ſimillima*, *breviora*. Ligulæ *membrana breviſſima*, *villoſa*, *margine prominula*. Vaginæ *ſtriatæ*, *ſuperne villoſæ*. Panicula *ſimpliciſſima*. Pedunculi *alterni*, *ſimplices*, *breves*, *uniflori*; *infimus longior*, *unico ramulo biflorus*. Spiculæ 5-6 f. 7, *ovatæ*, *tumidiuſculæ*, *erectæ*, 3-4-*rarius* 5-*floræ*, *coloratæ*. Calycis V. exterior *ſæpe ipſa ſpicula longior*; *interior brevior*, *anguſtiorque*. (a.) Floſculi *baſi piloſi*. Valv. exterior 5-*nervia*, *margine ciliata*, *apice obtuſa*, *trifida*; (c. C.) interior *plana*, *apice bi-ſæpe trifida* (C*) Nectaria *duo*, *obtuſa*. (l. L.) Floſculus *ultimus teres*, *ſterilis*. (y*).

79. FESTUCA, *elatior*, panicula ſecunda erecta, ſpiculis ſubariſtatis: exterioribus teretibus. *Linn. Spec.* 111. *Poa.* [*Hall.* 1451.]

H. in pratis fertiliſſimis copioſe. Floret Julio & ſequ.

T. VIII. f. 6. Radix *articulata*, *profunde deſcendens*, *fibris ramoſiſſimis ſubtomentoſis*, *valde luxurians*. Culmi 3 f. 4-*pedales erecti*, *foliati*, 3 f. 4-5 *nodes*, *læves*. Folia *patentia*, *lata*, *ſæpe involuta*, *ſupra ſubſcabra*. Ligulæ *loco*, *margo brevis adnatus*. Vaginæ *ſtriatæ*, *læves*. Panicula *ſemipedalis*: *e vagina erumpens coarctata*, *nutans*: *florens patula*, *erecta*, *ſecunda*, *pedunculis ſtrictioribus divergentibus*. Internodia *ſemiteretia*, *ſcabra*. Pedunculi *gemini*, *compreſſi*, *ſemiteretes hiſpidi*, *ſuperiores ſolitarii*. Pedicelli *breviſſimi*. Spiculæ *teretes*, *rectæ*, *ſeu varie curvatæ*, *coloratæ*: *florentes compreſſæ*, *exſiccatione diſtichæ*, *ſquamoſæ*, 5-6-*fertiliori ſolo*, 9-11 *floræ*. Calyx *corolla minor*: (a) V. exteriore *exigua*. Floſculi *mutici*, *ſæpe apice ſub-*

ariſtati (†). Nectaria *duo, lanceolata, acuminata.* (I.I.) *Bobus & equis pabulum præbet præſtantiſſimum.* Variat *ſterilior ſolo*: Culmo *vix ultrapedali*; Panicula *ſpicata*: *ſpiculis ſubſeſſilibus, alternis, patentibus, inferioribus geminis; forte* HALL. 1452.

80. FESTUCA, *fluitans*, panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus, teretibus muticis. *Linn. Spec.* 111. [*Poa. Hall.* 1453.]

H. in foſſis & aquis ſtagnantibus paſſim. Floret Junio & ſequ.

Hujus Graminis (Mannæ) Semina, *Schwaden* dicta, a nonnullis in cibum recipiuntur ſapidiſſimum.

T. VIII. f. 5. Culmi *baſis craſſa, terram humidam profunde perforans, ex nodis gemmas, radiculaſque emittit fibroſas.* Culmi 3-4-*pedales, foliati, compreſſi,* 4 f. 5-*nodes, læves, inferne ramoſi, obliqui, ſuberecti; in aquis ſtagnantibus natantes, rarius florentes.* Folia *latiuſcula, plana, pagina ſuperiore ſubſcabra.* Ligula *oblonga, acutiuſcula.* Vaginæ *compreſſæ, læves.* Panicula *ſæpe ultrapedalis, ramoſa, patens, ſecunda.* Rami & Pedunculi *ſemiteretes, ſubſcabri, erecti, ſub floreſcentia ſtricti, exacte horizontales; in ſpecminibus natantibus, omnes erecti, minuſque ſtricti.* Spiculæ *lineares, teretes, ſubcompreſſæ,* 7-9-11-*floræ, ſubſeſſiles; ſub ipſa floreſcentia, axillares Culmo, rameæ Ramo parallelæ, adpreſſæ: ſuperiores plures ſolitariæ, alternæ, inferiores geminæ; quarum una ſemper longius pedicellata, pedicello ſæpe bifloro.* Calyx *exiguus.* (a. A.) Cor. V. exterior *ſeptnervia, obtuſiuſcula, marginibus albidis, ſubrepandis, ſæpe laceris.* (C.) Nectarium *monophyllum, planoconcavum, margine incraſſato, ſubemarginato, horizontaliter antrorſum a Germine diſcedens.* (I. L.) Germen *turbinatum.* (N.) Styli *baſi nudi.* Stigmata *penicilliformia, plumoſa.* (o.) *Equis & imprimis Suibus gratum præbet pabulum.* Varietatem viviparam: Spiculis *rachi elongata palmaribus, corollis germinibusque in foliola excreſcentibus,* ſæpe legi *unter der neuen Brücke.*

BROMUS. *G. P.* 89.

Cal. 2-valvis. *Spicula* oblonga, teres, diſticha: ariſta infra apicem. *S. N.* 97.

81. BROMUS, *ſecalinus*, panicula patente, ſpiculis ovatis, ariſtis rectis, ſeminibus diſtinctis. *Linn, S. N.* 97. *Spec.* 112. [*Hall.* 1502?]

H. in agris inter Secale, æſtate pluvia nimis frequens. Floret Junio, Julio.

T. XI. f. 2. Radix *annua.* Culmus 3 f. 4-pedalis, *erectus, ſtrictus, foliatus, lævis.* Geniculis 4 f. 6, ſubgloboſis, nudis. Vaginæ ſulcatæ, læves. Ligula *brevis, triangularis, ſubcrenulata, ſubfuſca.* Folia *lata, plana, firma, pagina ſuperiore ſubvilloſa, ſcabriuſcula.* Panicula *ſemipedalis*, patens, demum nutans. Internodia *ſemiteretia, nuda, lævia.* Pedunculi longi, patentes, ramoſi, *compreſſi, ſcabri.* Pedicelli *flexuoſi.* Spiculæ ovato-oblongæ, teretiuſculæ, nudæ, 9-11-floræ, nutantes. Calyx (a. A.) & *floſculi, ſubſcabri.* Cor. V. exterior 7-*nervia, punctata, albido marginata, apice bifida.* (c.) Ariſta *ex nervo medio dorſali, infra fiſſuram prodit* craſſiuſcula, *ſæpe ſubflexuoſa, longitudine corollæ.* Nectaria 2, *ovata, acuta.* (L.) Semina *matura elongata Rachi, diſtincta.* (c. f.) *Hujus* Semen *corollæ adnatum, verum eſt* Dort, *ſeu* Treſpe *germanorum; quod* Secali *immixtum, panem ingratum, amarumque reddit. Nec ſequentis,* (H. 1405.) *qui inter* Hordeum, *nunqnam* Secale *creſcit.*

82. BROMUS, *mollis*, panicula erectiuſcula, ſpiculis ovatis pubeſcentibus: ariſtis rectis, foliis molliſſime villoſis. *Linn. S. N.* 97. *Spec.* 112. [*Hall.* 1504.]

H. in agris inter Hordeum; in ruderatis, ſecus vias, ubique frequens. Floret Junio & ſequ.

T. XI. f. 1. Gramen *totum molle, albido-pubeſcens.* Radix *in arvis annua, locis deſertis minus tritis, biennis.* Culmi 1-2-pedales, *erecti, foliati, ſuperne ſubtomentoſi:* Geniculis *tribus incraſſatis, ſubcylindraceis*, villoſis. Folia latiuſcula *plana*, 7-*nervia, utrinque, ſupra magis, molliſſime albido-villoſa.* Ligula *brevis, ſemimultifida.* Vaginæ ſtriatæ, inferiores villoſæ. Panicula erecta. ſubcoarcta. Internodia *compreſſa, ſubtomentoſa.* Pedunculi breves, erecti, depreſſi, pubeſcentes, ſimplices, uniflori, rarius biflori. Spiculæ erectæ, ovatæ, ſubcompreſſæ, pubeſcentes, 5-7-floræ. Valv. Cor. exterior *apice acute*

biſida. (C.) Ariſta tenuis, *recta*, *corolla fere longior.* Nectaria 2, *ovata. obtuſa.* (L.) Germen *ſuperne villoſum.* (N.) Styli *infra apicem inſerti*, *reflexo - patentes.* (O.) Semen *corollæ adnatum*, (c. ſ.) *exſiccatione duplo anguſtius*, *teretiuſculum. uti in præcedente.*

Varietas in pratis ſterilibus: Culmo *vix ſpithamæo*; *ſpiculis 3-4-floris*, *flaveſcentibus*, *lævibus*, *duabus ſ. unica tantum ex apice culmi pendulis*, *primo adſpectu diverſiſſimum*, *tamen idem Gramen.*

83. BROMUS, *ſterilis*, panicula patula, ſpiculis oblongis diſtichis, glumis ſubulato - ariſtatis. *Linn. Spec.* 113. [*Hall.* 1505.]

H. ad margines agrorum, in arvis, ad ſepes, *auf dem Schieſplatz* frequens. Floret Junio, Julio.

T. XI. f. 4. Radix *annua.* Culmi 1-2-3-*pedales*, *erecti*, *foliati.* Geniculis 3-4, *ſubcylindraceis.* Folia *latiuſcula*, *plana*, *ſtriata*, *baſi ſubſcabra*, *inferiora pagina ſuperiore ſubvilloſa.* Ligula *triangularis*, *denticulato - ciliata.* Vaginæ *inferiores albido - villoſæ.* Panicula *ſemipedalis*, *patens*, *pauci-* (10-20) *flora.* Pedunculi *longi*, *filiformes*, *patentes*, *compreſſi*, *hiſpidi*, *uniflori*; *inferiores quini*, *baſi nodoſi*, *uno alterove longiore*, *biſloro*, *pedicellis divergentibus flexuoſis.* Spiculæ *magnæ*, *lineari - oblongæ*, *nudæ*, *ſcabræ*, *ſeptiſloræ*, *nutantes*: (‡) *ſub antheſi diſtichæ*, *ultimo floſculo brevius ariſtato*, *ſterili.* Calyx & *floſculi ſubangulati.* (à. c.) Cor. V. exterior 7-*nerviæ*: *nervis parallelis*, *viridibus*, *ſcaberrimis*; *albido - marginata*, *apice acutiſſime biſida.* Ariſta *infra fiſſuram prodit recta*, *longitudine corollæ.* Nectaria 2, *ovata*, *margine interiore crenulata.* (L.) Semina *rarius ad maturitatem perveniunt.* (c. ſ.)

Variat Culmo *proceriori*; Foliis *latioribus*, *omnibus villoſis*; Panicula *pedali*, *multiflora*; Spiculis *minoribus*, *brevius ariſtatis*, *undique pubeſcentibus*, *pendulis.* (*forte Hall.* 1507?) *Intermedius quaſi inter* BROM, *ſterilem* & *tectorum.* Habitat *im Zwinger* frequens.

84. BROMUS, *arvenſis*, panicula nutante, ſpiculis ovato - oblongis. *Linn. Spec.* 113. [*Hall.* 1509.]

H. ad margines agrorum, *in der Aue*; *am Dollberg*; alibique frequens, Floret Julio.

T. XI. f. 3. Radix *annua.* Culmi *obliqui*, *adultiores erecti*, *foliati*, *tri* - ſ. 4 - *pedales*: Geniculis 3, *incraſſatis*, *me-*

rioribus ſubvilloſis. Folia *latiuſcula, plana, pagina inferiore marginibusque ſcaberrima, ſuperiore albido-villoſa.* Ligula *acutiuſcula, multifida.* Vaginæ *ſtriatæ, villoſæ, ſuperiores ſubnudæ.* Panicula *fere pedalis.* Pedunculi *longi, filiformes, compreſſi, hiſpidi, baſi nodoſi, vel ſimplices, uniflori; vel pauciores ex infimis ſubramoſi, bi ſ. triflori:* Pedicellis *longis, flexuoſis, ad ramificationes nodoſis, foliologue brevi, ſubulato, (ſæpe) bracteatis.* Spiculæ *longæ, ovato-lineares, teretiuſculæ, 7-9-10-floræ, nutantes, coloratæ: hinc griſeo-viridescentes, inde ſpadiceo-purpureæ, glabræ, (per lentem) pubeſcentes.* Ariſta *corolla paulo longior, recta.* Nectaria 2, *ovata (L.)* Antheræ *rubræ dein flavæ.*

Variat ſpiculis *minoribus, magis coloratis,* (+) *pubeſcentibus* *Confer. Hall.* 1503?

85. BROMUS, *tectorum*, panicula nutante, ſpiculis linearibus. *Linn. Spec.* 114. [*Hall.* 1508.]

H. in collibus ſiccis, *am hohlen Weg, bey dem dicken Thurm;* in muris pontis novi; & alibi frequens. Floret Majo.

T. X. f. 2. Radix *annua.* Culmi *ſpithamæi ſ. pedales, tenues, erecti, foliati, tri-ſ. quadrinodes; deflorati terræ incumbentes, rufeſcentes.* Folia *anguſta, plana, pagina inferiore pubeſcentia, ſuperiore albido villoſa, marginibus verſus baſin ciliata.* Ligula *truncata, ſemimultifida.* Vaginæ *inferiores villoſæ, rufeſcentes.* Panicula *ex vagina erumpens erectiuſcula, demum nutans, ſecunda.* Pedunculi *capillares, laxi, cum internodiis pubeſcentes; ſcabri, inferiores quini.* Spiculæ *pendulæ, lineari oblongæ, pubeſcentes, quinquefloræ; maturo ſemine, floſculis apice divergentibus ſubſquarroſæ.* (c. ſ.) Floſculi *ſuperiores plerumque ſteriles.* Ariſta *longitudine corollæ, tenuiſſima, recta.*

86. BROMUS, *giganteus*, panicula nutante, ſpiculis quadrifloris: ariſtis brevioribus. *Linn. Spec.* 114. [*Hall.* 1510. & *forte* 1506? *ſecund. Deſcr.*]

H. locis umbroſis humentibus, ad ſepes *im Winkel bey dem Klingelborn, an dem Mühlbach bey dem Steghaus-Brückgen;* & alibi frequens. Floret Julio.

T. X. f. 1. Radix *perennis.* Culmus *fere orgyalis, erectus, firmus, foliatus, lævis;* Articulo *ſupremo longiſſimo;* Geniculis *quatuor, incraſſatis, fuſcis.* Folia *longa, latiſſima,*

plana, baſi utrinque membrana cartilaginea, acuta, aucta; pagina ſuperiore, & apice inferioris ſcabra. Ligula *breviſſima, truncata, fuſca.* Vaginæ *ſulcatæ, ſubcompreſſæ, inferiores ſcabræ.* Panicula *ultrapedalis, nutans.* Internodia *longa, lævia.* Pedunculi *ad ſingulum nodum gemini, patentes, longi, angulato-compreſſi, ſcabri, ultra medium indiviſi.* Spiculæ *tereiuſculæ: florentes lineari-lanceolatæ, ſubcompreſſæ, demum oblongæ,* (+) *tri quadriflora, in noſtrate ſæpiſſime 6-7-floræ.* Calyx *corolla minor, mucronatus,* (a) *valvula exteriore exigua.* Cor. V. exterior *5-nervia, albido-marginata, apice, ſubbifida.* Ariſta *infra apicem prodit capillo tenuior, ſubflexuoſa, longitudine corollæ, ſæpe tota ſpicula longior.* (c. C.) V. interior *lanceolata,* (C*) *longitudiue exterioris, ſæpe longior.* Nectaria 2, *lanceolata, acuta.* (L. l.) Semen *hinc convexum, inde planum, ſubexcavatum.* (ſ.)

87. BROMUS, *pinnatus*, culmo indiviſo, ſpiculis alternis ſubſeſſilibus teretibus ſubariſtatis. *Linn. S. N.* 98. *Spec.* 115. [*Triticum. Hall.* 1431.]

H. in montoſis ſylvaticis *am Homberg*, & alibi copioſiſſime. Floret Julio.

T. X. f. 3 Radix *multiplex, teres, articulata, ſquamata, fibroſa.* Culmus *tri-ſ. quadripedalis, erectus, ſtrictus, foliatus, ſuperne lævis;* Geniculis *tribus ſubvilloſis.* Folia *flavo-viridia, lata, plana, medio latiora, ſupra, ſubtus, marginibusque ſubpiloſa.* Ligula *brevis, obtuſa.* Vaginæ *ſtriatæ, molliſſime villoſæ.* Spica *terminalis.* Receptaculum *ſubflexuoſum, denticulis remotis ſpiculas adfigens.* Spiculæ *novem, alternæ, bifariæ, tereiuſculæ, pubeſcentes, 9-11-13-floræ: ſuperiores ſeſſiles, inferiores breviſſime pedunculatæ; ante & poſt floreſcentiam erectæ, commiſſuris glumarum ſ. latere planiuſculo Receptaculo adpreſſæ. florentes horizontales,* (+) *ſ. ad angulum rectum a receptaculo diſcedentes; terminali ſemper erecta, directione lateralibus contraria,* (‡) *uti in* Triticeis. Calyx & Floſculi *ſtriati, pubeſcentes, margine ſubciliati.* (a. c.) Ariſta *terminalis, recta, brevis, maturo ſemine longior.* (c. ſ.) Nectaria 2, *apicem verſus latiora, oblique truncata, multifido-ciliata.* (l. L.) Antheræ *flavæ.* Styli *cum apice* Germinis *toti villoſi* (N. O.)

AVENA. *G P.* 91.

Cal. 2-valvis, multiflorus: ariſta dorſali contorta. *S. N.* 99.

88. AVENA, *elatior*, paniculata, calycibus bifloris, floſculo hermaphrodito ſubmutico, maſculo ariſtato. *Linn. S. N.* 99. *Spec.* 117. [*Hall.* 1492.]

H. in pratis, pomariis, ad ſepes, ubique frequens. Floret Junio & ſequ.

T. X. f. 4. Radix *perennis*. Culmus *fere orgyalis*, *erectus*, *foliatus*, *quadrinodis*, *lævis*. Folia *lata*, *ſtriata*, *plana*, *ſupra ſubvilloſa*, *utrinque ſcabra*. Ligula *brevis*, *truncata*, *fiſſa*. Vaginæ *ſtriatæ*, *læves*, *inferiores ſubvilloſæ*. Panicula *ſemipedalis & longior*, *coarctata*, *nitida*; *florens patula ſubnutans*. Pedunculi *tenues*, *primarii ſquamula acuta*, *brevi involucrati*. Calyx *tenuis*, *pellucidus*, *mucronatus*, *coloratus*. (a. A.) Floſculi *duo*, *ſubæquales*, *vix calycem ſuperantes*: (1. 2. 3.) *quorum* inferior maſculus, *ſeſſilis*; (♂) ſuperior hermaphroditus *ſubpedicellatus*: (☿) *uterque baſi piloſus*, *ſeptinervius*, *coloratus*, *muticus*.

Maſculi Valv. exterior *ſupra baſin ariſtata*: Ariſta *colorata*, *geniculo tortili*, *floſculo duplo longiore*. (♂. x.) Nectaria *duo*, *exigua*. (♂. l.) Germen *minimum*. (♂. n.) Styli *breviſſimi*, *villoſi*. (n. ♂.) Semen *abortiens*. (♂. c. f.)

Hermaphroditi ariſta *ſub apice prodit breviſſima recta*. (☿ x*) Nectaria *duo*, *lineari-lanceolata*, *acuminata*, (l. L. ☿.) *germine longiora*. Stamina *tria uti in* Mare. Germen *obovatum*, *apice villoſum*. (☿. n.) Styli *toti villoſi*, *erectiuſculi*, (n. ☿.) *demum patentes*. (l. m.) Semen *compreſſum*, *acutum*, *ſulco notatum*, (☿. f.) Corollæ *adnatum*. (☿ c. f.)

Bobus & equis bonum præbet pabulum. Gallorum Fromental; *A nonnullis perperam* Raygraſs *dictum*, *quod* LOL. perenne.

Variat; α Radicalibus *fibris nodoſis*. *Linn.* var. β. *Hall.* α.

β. Floſculo Hermaphrodito & Maſculo, *inermi*, ſ. *utroque ariſta deſtituto*. (2).

γ. Ariſta *in utroque floſculo longiore* (3).

δ. Ariſta *in* Hermaphrodito *nulla*.

89. AVENA, *dubia*, paniculata, calycibus ſubtriflo-ris: floſculo infimo terminali ariſta recta; reliquis apice biariſtatis, dorſali ariſta reflexa.

H. in collibus ſiccis, apricis, in arvis ſterilibus paſſim. Floret Junio.

Gramen mihi dubium. An AVENA *Lœflingiana*, LINN. *S. N.* 99. *Spec.* 118? cum LINNÆI Charactere ſpecifico non exacte convenit, nec in *Scheuchzero*, nec HALLERI Opere, ſimile Gramen detegere poſſum.

T. IX. f. 3. Radix *fibroſa*, *annua*. Culmi *ſpithamæi*, *rarius pedales*, *erecti*, *foliati*, *tenues*, *læves*; *tribus* Articulis, *ſupremo longiſſimo*, Geniculisque *fuſco - purpureis intercepti*. Folia radicalia *pauca*, *brevia*. *anguſtiſſima*, *ſtriata*, *plana*, *nuda*. Folia culmi *conduplicato - ſubulata*, *ſubſcabra*. Ligula *oblonga*, *acuta*, *ſubbifida*, *longe prominens*. Vaginæ *teretes*, *ſtriatæ*, *læves*, *inferiores ruſeſcentes*, *ſuperior triplo longior*. *ampliorque*. Panicula *pauciflora*, *florens patens*. Internodia *teretia*, *ſubſcabra*. Pedunculi *filiformes*, *longi*, *patentes*, *ſubſcabri*, *ſimplices*, *uniflori*, *pauciores biflori*, *rarius terminali ſimiles triflori*; Glumis *apicem verſus alternatim pedunculo adpreſſis*, *ſubſeſſilibus*: Pedicellis *exiguis*, *valde incraſſatis*. Glumæ *oblongæ*, *ſubteretes*, *albidæ*, *ſubfuſcæ*, *maculis ſanguineis nitentes*, *bi*- (+) *rarius triſloræ*: (‡) Floſculis *omnibus fertilibus*. Cal. V. exterior 5-*nervia*; interior *duplo major*, 7-*nervia*: *nervis parallelis*, *viridibus*, *ſcabris*; *utraque acuminata*, *albido-marginata*. (a. A.)

Floſculus inferior (1) *ſeſſilis*, *baſi* nudus, (1. C. *) *longitudine calycis*. Cor. V. exterior *teres*, *ſubulata*, 5-*nervia*, *punctata*; Ariſta *terminalis*, recta *longitudine corollæ*. (1) Valv. interior *duplo brevior*, *plana apice bifida*. (c. C. *)

Floſculus ſuperior (2) *breviſſime pedicellatus*, baſi piloſus, (2. C. y.) *priori ſimilis*, *at apice & dorſo ariſtatus*: (2. C.) Ariſtæ terminales duæ, *capillo tenuiores*, *rectæ*, *parallelæ*, *longitudine corollæ*; (2-3.) Ariſta *dorſalis paulo ſupra medium prodit*, *geniculata*, *tortilis*, *gluma duplo longior*. (‡) Stylus *inter floſculos*; *in glumis bifloris*, *nudus*, *in trifloris*: *tertio floſculo*, *ſecundo ſimillimo*, *apice & dorſo ariſtato*, *inſtructus*. (3.) *Singuli Floſculi* Stamina *tria*; Antheræ *ochroleucæ*, *exiguæ*; (m. M.) Nectaria *duo*, *ovata*, (L.) Germen *obovatum*; (n. N.) Styli *toti*

villoſi; (O) Semen *corollæ adnatum*, (c. ſ.) *teres*, *acutum*, *hinc ſulco notatum*. (ſ.)

90. AVENA, *fatua*, paniculata, calycibus trifloris, floſculis omnibus baſi piloſis: ariſtis totis lævibus. *Linn. Spec.* 118. [*Hall.* 1495.]

H. in agris, vitium pervulgare, inter ſegetes nimis frequens. Floret Junio, Julio.

Eradicatur 1) Stipulis accenſis, requieſcente diutius agro, & arando poſt germinationem. LINN.

2) Repetita per plures annos ſeminatione graminum perennantium. SCHREBER.

T. IX. f. 4. Radix *annua*. Culmus 3. ſ. 4-*pedalis*, *erectus*, *firmus*, *foliatus*, *quadrinodis*, *lævis*. Folia *latiſſima*, *longa*, *ſtriata*, *undique ſcabra*. Ligula *obtuſa*, *fiſſa*, *brevis*. Vaginæ *ſtriatæ*, *læves*. Panicula *pedalis*, *patens*. Pedunculi *filiformes*, *patentes*, *compreſſi*, *ſcabri*, *uniflori*, *rarius biflori*, *inferiores quini*, *ſolo fertiliori plures*, *ramoſiores*, *multiflori*. Glumæ *ſubtrifloræ*, *nutantes*. Calyx *floſculis major*: V. exterior 9-*nervia*, interior 11-*nervia*. Rachis *piloſa*. (y) Floſculi *baſi & dorſo piloſi*, (c) 7-*nervii*, *dorſo ſcabri*, *acuminati*, *apice laceri*, *tertio duplo minore*, (c. 3.) *ſæpe deficiente*. *Singuli* Ariſta *dorſalis*, *geniculata*, *reflexa*, *tortilis*, *lævis*, (*per lentem ſcabra*,) (X. ⊙.) *floſculo duplo longior*. Nectaria 2, *ovato-acuminata*. (L.) Semen *piloſum*. (c. ſ. ſ.)

91. AVENA, *pubeſcens*, ſuſpicata, calycibus ſubtrifloris, baſi piloſis, foliis planis pubeſcentibus. *Linn. S. N.* 99. *Spec.* 1665. [*Hall.* 1498.]

H. in pratis ſiccioribus *an der Dille*, *am Sieghauſe*; & alibi frequens. Floret initio Junii.

T. IX. f. 2. Radix *ſubſtolonifera*. Culmi pauci, 3-4-ſ. 5-pedales, *erecti*, foliati, læves, geniculis *tribus* ſubrotundis. Folia radicalia *anguſta*, *plana*, *ſupra*, *ſubtus*, *marginibusque* piloſa. Fol. culmea *latiuſcula*, *obtuſa*, *utrinque tactu mollia*, pubeſcentia, *marginibus præſertim carinali nervo ſcabra*: *ſupremo breviſſimo*, *nudo*. Ligula *magna*, *obtuſa*, ſubcrenulata. Vaginæ *teretes*, *ſtriatæ*, læves, *inferiores villoſæ*. Panicula ſemipedalis, coarctata: *florens* patula, multiflora. Internodia teretia, lævia. Pedun-

culi tenues, *compreſſi*, *ſcabri*, 1-2-3-*flori*, inferiores quini. Glumæ tri-*rarius* biſloræ, *albido-purpuraſcentes*, *nitidæ*. Calyx *acuminatus*. (a.) Rachis *pubeſcens*. (y.) Floſculi baſi valde piloſi, (c. y.) 5-*nervii*, *apice laceri*, *multifidi*, *calycis longitudine*. Ariſta *dorſalis*, *albido-violacea*, *demum tortilis*, unicolor, ſubfuſca. Nectaria 2, *apice oblique* truncata, tridentata, (L.) longitudine Germinis. Semina *rariſſime ad maturitatem perveniunt*. (f.)

92. AVENA, *pratenſis*, ſubſpicata, calycibus quinquefloris. *Linn. S. N.* 99. *Spec.* 119. [*Hall.* 1499.]

H. in montoſis ſterilibus, & collibus apricis paſſim. Floret medio Junii.

T. IX. f. 1. Radix *multiplex*, *lata ſpatia occupat valde luxurians*. Culmi numeroſi, tripedales, *erecti*, ſtricti, ſubfoliati, ſ. *ultra medium nudi*, ruſeſcentes, ſcabri: Geniculis duobus baſi propioribus. Folia radicalia numeroſa, longa, anguſta, plana, nuda, marginibus ſcaberrima; dein involuta ſ. conduplicata, filiformia, extus lævia, Vaginis *baſi ſcabris*. F. culmea anguſta, *brevia*, *plana*, *obtuſa*, ſupra incana, ſcabra, ſubtus lævia: *omnia uti radicalia*, *apice purpurea*. Ligula *oblonga*, ſubfiſſa. Vaginæ ſubcompreſſæ, ſcabræ, purpureomaculatæ. Panicula ſpicata, contracta pauciflora. Internodia ſemiteretia, ſubflexuoſa, ſcabra. Pedunculi breves, compreſſi, ſtricti, hiſpidi, ſimplices, alterni, uniflori, culmo adpreſſi, ſub floreſcentia ad angulum acutum diſcedentes, inferiores gemini, uno longiore bifloro. Glumæ 5 floræ, *rarius triſloræ*, *magis coloratæ*, ſcaberrimæ, *præcedentis majores*. Calyx floſculis paulo brevior. (a.) Floſculi baſi ſubpiloſi, (c. y.) apice acuto, bifido. (c.) Ariſta *dorſalis longior*, (x.) inferne tetragona recta, verſicolor: dein tortilis, albo nigroque colore variegata. Nectaria 2, lanceolata, acuminata, germine longiora, (L.) margine exteriore unidentata. Semen *fuſcum*, *ſæpe abortiens*. (c. f.)

93. AVENA, *flaveſcens*, panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, floſculis omnibus ariſtatis. *Linn. Spec.* 118. [*Hall.* 1497.]

H. in pratis & pomariis frequens. Floret Junio & ſequ.

T. X. f. 5. Radix *perennis*. Culmi 2-3 *pedales*, *erecti*, *foliati*, *læves*: Geniculis *tribus*, *ſubvilloſis*, *remotis*. Folia *latiuſcula*,

pagina ſuperiore ſubvilloſa. Ligula *brevis, truncata, ſubcrenata.* Vaginæ *ſubvilloſæ.* Panicula *flaveſcens.* Pedunculi *verticillati.* Calyces *bi - tri - rarius quadriflori, ultimo floſculo ſemper ſterili.* (a.) Floſculi *calyce paulo longiores, baſi piloſi, apice bifidi:* Ariſta *dorſalis, tenuis, floſculo longior.* (c. C.) Nectaria *ovato-lanceolata.* (L.) Semen *flaveſcens.* (c. f.)

Variat in ſylvis: Panicula *anguſtata, coarctata, calycibus (Majo) biflaris, (Julio) 3-& 4-floris.*

Varietatem Viviparam legi ſingularem *unter der neuen Brücke:* Panicula *ſpicata, ſquarroſa, germinibus in faſciculos foliorum excreſcentibus villoſos, undique divergentes.*

ARUNDO. *G. P.* 93.

Cal. 2-valvis. *Floſculi* congeſti, lana cincti. *S. N.* 100.

94. ARUNDO, *phragmitis*, calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Linn. Spec.* 120. [*Hall.* 1515.]

H. ad ripas *Lahnæ*, circa *Dietz.* Floret Julio, Auguſto.

T. VII. f. 1. Panicula *pedalis, laxa.* Pedunculi *verticillati, numeroſi, angulati, ſcabri.* Spiculæ *quinquefloræ, rarius 4-6-floræ.* Calyx *inæqualis:* Valvulis *trinerviis, muticis;* exteriore *duplo fere minore.* (a.) Cor. Valv. exterior *uninervia, ſubulato-mucronata, Calyce longior;* (c. C.) Valv. interior *triplo brevior, plano-concava, apice retuſa.* (C*) Semen *villis* (+) *longitudine corollæ cinctum.* (f.)

**** *Flores multiflori, inſidentes receptaculi elongati dentibus.*

TRITICUM. *G. P.* 99.

Cal. 2-valvis, ſolitarius, ſubtriflorus. *Flos* obtuſiuſculus, acutus. *S. N.* 102.

95. TRITICUM, *repens*, calycibus quadrifloris ſubulatis acuminatis, foliis planis. *Linn. S. N.* 102. *Spec.* 128. [*Hall.* 1426.]

H. in agris & cultis nimis frequens. Floret Julio.
Pharm. GRAMINIS Radix. Verno tempore colligenda.

T. XII. f. 3. Radix *maxime repens.* Culmus *bipedalis*, *erectus*, *foliatus*, *trinodis*, *lævis.* Folia *latiuſcula*, *plana*, *viridia*, *baſi utrinque membrana aucta*, *ſupra pubeſcentia.* Ligulæ *margo brevis*, *truncatus.* Vaginæ *læves.* Spica *palmaris.* Receptaculum *flexuoſum*, *alternatim hinc convexum*, *inde excavatum*, *ſcabrum*, *dentibus interceptum.* (V.) Spiculæ *tri-ſ. quadrifloræ*, *ſeſſiles*, *latere plano receptaculo obverſæ: terminali lateralibus directione contraria.* Calycis Valvulæ *ſubæquales*, (a.) 5-*nerviæ*, *acutæ*, Cor. V. exterior 5-*nervia*, *punct ata*, *mucronata.* (c.) V. interior *plana*, *marginibus inflexis*, *ciliatis*, *apice bifida.* (c. *) Nectaria *ovato-lanceolata.* (l. L.) Antheræ *rubræ*, *dein flavæ.* Semen *diſcedens.* (c. ſ.)

Non amplius dubitandum, quin hujus Radix ſit antiqnorum vera GRAMINIS RADIX dulcis, homines pecudesque alens.

ELYMUS. *G. P.* 96.

Cal. lateralis, 2-valvis, aggregatus, multiflorus. *S. N.* 100.

96. ELYMUS, *caninus*, ſpica nutante arcta, ſpiculis rectis involucro deſtitutis: infimis geminis. *Linn. Spec.* 124. [*Triticum Hall.* 1426. *var.* β.]

H. ad ſepes paſſim. Floret Julio & ſeq.

Gramen noſtrum paucis notis a Tritico *repente* diverſum; certe ejusdem Varietas eſt conſtans. *Perill.* LINNÆUS ipſe vocavit: *Triticum calycibus ſubulatis quadrifloris ariſtatis Spec. Pl.* Edit. I. p. 86. Ob Radices maxime repentes, noſtrum non eſt *Triticum* HALL. 1429.

T. XII. f. 4. II. Radix *præcedentis.* Culmi 4-5-*pedales*, *erecti*, *foliati*, *quadrinodes.* Folia *latiora*, *glauceſcentia*, *ſupra ſubpubeſcentia*, *marginibus ſcabrioribus*, *magis baſi auriculatis.* Spica 5-6-*pollicaris*, *ob tenuitatem* Receptaculi, *& pondus ſpicularum*, *maturo ſemine*, *ultra medium usque nutans.* Spiculæ *majores*, *oblongæ*, *teretiuſculæ*, *minus diſtichæ*, *ariſtatæ*, *in* primario dente ſæpe geminæ (+) Calyx *ideoque duplex* ſ. tetraphyllus, (a. +) *ſubariſtatus.* Flores *præcedentis:* Ariſta *terminalis recta*, *longitudine glumæ ſeu brevior;* Cor. Valv. interior *magis ciliata.* (c.) Nectaria *baſi hemiſphærica.* (L.) Antheræ *flavæ.* *In reliquis cum* Trit. *repente exacte convenit.*

T. XII. f. 4. I. Hanc Varietatem legi locis incultis *am Homberg.* Radix *multiplex*, *denſa*, *vix repens.* Culmi *aggregati*, *erecti*, *ſtricti*, orgyales, *craſſitie inferne digiti minoris.* Folia *latiſſima*, *glauca*, *ſcaberrima*, *nuda.* Spica *fere pedalis*, *pollicis inferne craſſitie*, *ſtricta*, *ſemper erecta*, *nec abſoluta floreſcentia nutans.* Spiculæ *majores*, *approximatæ*, *diſtichæ*, 7-9-*floræ*, *ariſtatæ*: *ſuperiores ſolitariæ*, *inferiores ad ſpicæ medium uſque geminæ*, *infimæ ſæpe ternæ.* *In reliquis notis a priore non diverſum. In hortum transplantatum*, *inſequenti anno in priorem tranſiit*, *ob Radicem valde repentem vix eradicandum.*

LOLIUM. G. *P.* 95.

Cal. 1-phyllus, fixus, multiflorus. *S. N.* 100.

97. LOLIUM, *perenne*, ſpica mutica: ſpiculis compreſſis multifloris *Linn. Spec.* 122. [*Hall.* 1416.]

β. Gramen loliaceum, ſpica lata ex plurimis ſpicis duplici verſu diſpoſitis conſtante. *Scheuchz. Agroſt.* 29. *Hall.* var. γ. l. c.

H. in paſcuis, pratis, ad vias paſſim: β. ad verſuras *in der Aue* infrequens. Floret æſtate.

T. XII. f. 1. Anglorum verum eſt *Ray-Graſs.* Gramen hoc pro ceſpite denſo æqualique aptiſſimum, repetito & junius demeſſum, Bobus optimum præbet pabulum. Radix *multiplex*, *denſa*, *fibroſa*, *perennis.* Culmi *obliqui*, *florentes erecti*, 1 *ſ.* 2. *pedales*, *foliati*, *trinodes*, *læves.* Folia radicalia *anguſtiſſima*, *plana*, *lævia*; culmea *anguſta*, *plana*, *ſupra ſcabra.* Ligula *truncata*, *multifida.* Vaginæ *læves.* Spica 6-9-*pollicaris*, *plana*, *diſticha.* Receptaculum *flexuoſum læve*: *hinc alternatim convexum*, *inde excavatum*, *dentibus interceptum.* (V.) Spiculæ *alternæ*, *compreſſo-planæ*, *diſtichæ*, 7-9-11-*floræ*, *læves*: *vel lanceolatæ*, *calyce longiores*; *vel rhomboideæ*, *longitudine calycis.* Calyx *monophyllus*: (a.) (*terminalis ſpiculæ diphyllus*, *ſubæqualis*,) (a*) Gluma *nervoſa*, *mutica*, *lævis*, (a.) *Receptaculo excavato*; *alterius Valvulæ vicem gerenti*, *oppoſita.* (a. *fig. infer.*) Cor V. exterior 5-*nervia*, *mutica*, *calyce minor.* (c.) Nectaria *duo*, *ovata*, *obtuſa.* (l. L.) Semen *diſcedens.* (c. f.)

T. XII. f. 1. +. Var. β. Spicæ Receptaculo *differt ramoſo*: Ramis *ſpicatis*; Spiculis *magis approximatis*, 11-13-*floris*, *ad baſin ſinguli rami geminis.*

d by Google

98. LOLIUM, *temulentum*, ſpica ariſtata, ſpiculis compreſſis multifloris. *Linn. S. N.* 100. *Spec.* 122. [*Hall.* 1420.]

H. in agris, inter Hordeum nimis frequens. Floret Junio, Julio.

Gramen inter omnia unicum noxium. Semen temulentos vertiginoſosque reddit Homines, magis adhuc in pane calido, potiſſimum in potu cereviſia. Etiam equis, canibus, ſuibus, aliisque animalibus noxium, ſæpe letale.

T. XII. f. 2. Radix *annua*, *fibris ſubtomentoſis*. Culmi 2 *ſ.* 3 *pedales*, *erecti*, *firmi*, *foliati*, *trinodes*, *ſcabri*. Folia *lata*, *plana: pagina ſuperiore ſcabra*, *inferiore glabra*. Ligula *brevis*, *ſubcrenulata*. Vaginæ *ſtriatæ*, *ſcabræ*. Spica *ſemi-ſ. pedalis*, *plana*, *diſticha*. Receptaculum *præcedentis*, *craſſius*, *firmiusque*, *ſcabrum*. Spiculæ *alternæ*, *lineari-oblongæ*, *compreſſæ*, *ſcabræ*, *ariſtatæ*; *in eodem plano cum culmo*, *dentibus adfixæ*, 5-7-9-*floræ*. Calyx *monophyllus*, (a.) (*terminalis ſpiculæ diphyllus*,) (a*) *nervoſus*, *muticus*, *longitudine ſpiculæ*, *Receptaculo oppoſitus*; (V. a.) *in ſpiculis inferioribus*, *ſæpe* ſecunda Calycis Valvula, *multo minor*, *oblonga*, *obtuſa*, *convexa*, *ſubbifida* (a. +.) *Receptaculi cavitati impreſſa*, *obſervatur*. (V. a. +.) Cor. V. exterior *calyce duplo brevior*, *nervoſa*, *albido-marginata*: *ſub apice membranaceo* Ariſtam *exſerens rectam*, *duplo longiorem*. (c. x.) Nectaria 2, *ovata*. (l. L.) Styli *baſi nudi*. (n. o.) Semen *corolla incluſum*, *valvulæ interiori adnatum*, *non diſcedens*. (c. ſ.)

CYNOSURUS. *G. P.* 87.

Cal. 2-valvis, multiflorus; *Receptaculum* proprium unilaterale, foliaceum. *S. N.* 95.

99. CYNOSURUS, *criſtatus*, bracteis pinnatifidis. *Linn. Spec.* 105. [*Hall.* 1545.]

H. in pratis paſſim. Floret Junio.

T. VII. f. 4. Radix *perennis*. Culmi 1-ſ. 2-*pedales*, *erecti*, *ſtricti*, *foliati*, *quadrinodes*, *læves*. Folia *anguſta*, *plana*, *utrinque lævia*, *vix marginibus ſcabra*. Ligula *brevis*, *tenuis*, *truncata*, *fiſſa*, *margine prominula*. Vaginæ *ſtriatæ*, *læves*. Spica *compoſita*: *florens ſemiteres*, *ſecunda*, *obtuſa*,

deſlorata interrupta, mutica. Rachis *flexuoſa*, (y.) *torta, lævis.* Pedunculi *breves, ſolitarii, alterni, duplici ſerie unilaterales; ſpiculis tribus, rarius quinque, Bracteisque ſemper tribus inſtructi.* Bracteæ *pennatæ, convexo-planæ, ſubſeſſiles: ex axi ſubflexuoſo, & pinnulis 7 ſ. 9, compoſitæ;* (b.) *Singula per lentem ſpiculam refert diſticham: valvulis ſubulatis, alternis, compreſſis, ariſtatis, ſcabris.* (B ⊙.) Spiculæ *bi-rarius triſloræ, bracteis minores,* (c. a.) Calyx *ſubinæqualis, carinatus, mucronatus:* (a.) Valvula exteriore *baſi ab altera remota, ſurſum arcuata, magis ſcabra.* (A.) Floſculi *ſubariſtati.* (c. C.) Nectaria *ovata, acuta.* (L.) Antheræ *rubræ, ſeu violaceæ.* Styli *baſi nudi.* (O.) *Ovibus præbet optimum pabulum.*

C. *T R I G Y N I A.*

HOLOSTEUM. *G. P.* 104.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* 1-locularis, ſubcylindracea, apice dehiſcens. *S. N.* 103.

100. HOLOSTEUM; *umbellatum*, floribus umbellatis. *Linn. Spec.* 130. [*Alſine. Hall.* 879.]

H. in agris, arvis, & campis ſterilibus paſſim. Floret Majo & ſequ.

Stamina *ſemper tria, ſemel tamen quinque numeravi.* Petala *apice tri-rarius bidentata.* Capſula *apice ſexvalvi dehiſcit, valvulis revolutis.* Receptaculum *columnare.* Semina *ſcabra filis adfigens.*

MONTIA. *G. P.* 101.

Cal. 2-phyllus. *Cor.* 1-petala, irregularis. *Capſ.* unilocularis, trivalvis. *S. N.* 103.

101. MONTIA, *fontana, Linn. Spec.* 129. [*Hall.* 391.]

H. in paludoſis ſilvaticis *im Hirſchberg bey Gundersdorf*, ſecus rivulos ad *Breitſcheid* & *Langenaubach*. Floret Majo. ✝

CLASSIS IV.
TETRANDRIA.
A. *MONOGYNIA.*

* *Flores monopetali, monoſpermi, ſuperi.* Aggregati.

DIPSACUS. *G. P.* 114.

Cal. commun. polyphyllus; *proprius* ſuperus *Recept.* paleaceum. *S. N.* 111.

102. DIPSACUS: *fullonum*, foliis ſeſſilibus ſerratis. *Linn. Spec.* 140. [*Hall.* 198.]

β. Dipſacus ſativus, ariſtis fructus hamatis. SAUV. *monſp.* 156.
H. α. ad vias, in ſterilibus ſiccis paſſim; β. copioſe apud nos ſeritur, pro uſu Textorum tibialium; unde ſæpe ſpontanea occurrit *am Homberg.* Floret Julio, Auguſto.
β. Paleis *differt multo robuſtioribus hamatis, quæ in α, debiliores, rectæ ſunt.*

103. DIPSACUS, *piloſus*, foliis petiolatis apendiculatis. *Linn. Spec.* 141. [*Hall.* 199.]

H. in ſterilibus *am Dollberg*; in muris pomœrii; ad ſepes *bey denen Steghaus-Garten*, rarius. Floret Julio, Auguſto. Receptaculum *ſubovatum* Paleæ *lanceolatæ. In hoc uti in præcedente,* Stigma *ſæpiſſime bifidum, lobo infimo breviore.*

SCABIOSA. *G. P.* 115.

Cal. communis polyphyllus; *proprius* duplex, ſuperus. *Recept.* paleaceum ſ. nudum. *S. N.* 112.

104. SCABIOSA, *ſucciſa*, corollulis quadrifidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. S. N.* 112. *Spec.* 142. [*Succiſa-Hall.* 201.]

H. in pratis ſubhumidis frequens; *hinter dem Homberg, im Guldners Grund*, copioſe. Floret Auguſto.
Pharm. SUCCISÆ ſ. MORSUS DIABOLI Radix.

Folia *ſæpe ſubſerrata.* Corollæ *lacinia ſuperior non raro emarginata.* Calyx ſeminis proprius exterior 4-*dentatus;* interior *ſeſſilis quinquefidus, laciniis æqualibus.* Receptaculum *ovatum, paleaceum:* Paleis *lanceolatis.*

105. SCABIOSA, *arvenſis*, corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis inciſis, caule hiſpido. *Linn. S. N.* 112. *Spec.* 143. [*Scabioſa Hall.* 206.]

H. ad verſuras, in pratis ſiccis, ſecus vias frequens. Corollis rubris & cæruleis ludit. Floret Junio, Julio.

Pharm. SCABIOSÆ Herba & Flores.

Receptaculum *villoſum: villis* 16-20 *baſi coalitis, radiantibus, ſinguli ſeminis baſin veſtientibus.* Cal. ſem. proprius exterior 4-*dentatus, breviſſimus;* interior *ſubpedicellatus,* 10-*fidus, laciniis* 5, *alternis ſetaceis,* 5, *lateralibus.*

** *Flores monopetali, monocarpi, inferi.*

PLANTAGO. *G. P.* 142.

Cal. 4-fidus. *Cor.* 4-fida: limbo reflexo. *Stamina* longiſſima. *Capſ.* 2-locularis, circumſciſſa. *S. N.* 122.

106. PLANTAGO, *major*, foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. *Linn. Spec.* 163. [*Hall.* 660.]

H. ad vias, in pratis ſiccis, ad verſuras *auf dem Schlüſſel; am Roſenwäldgen* copioſe. Floret Junio, Julio.

Pharm. PLANTAGINIS Herba. Radix. Semina.

Spica *teres, gracilis, ſæpe pedalis.* Stamina *floſculo vix duplo longiora.* Capſula *hexaſperma.*

107. PLANTAGO, *media*, foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti. *Linn. Spec.* 163. [*Hall.* 659.]

H. in pratis, ad vias publicas paſſim. Floret Majo, Junio. Spica *brevior, denſior, craſſiorque.* Capſula *hexaſperma.*

108. PLANTAGO, *lanceolata*, foliis lanceolatis, ſpica ſubovata nuda, ſcapo angulato. *Linn. Spec.* 164. [*Hall.* 656.]

H. ad vias, in pratis macilentis nimis frequens. Floret Majo. Spica *ovato-oblonga.* Calyx *inæqualiter* 4-*fidus.* Capſula *diſperma.* Varietatem hujus ſingularem legi, in agris re-

quietis *am Homberg*: Foliis *ultrapedalibus*, *ſubdentatis*, *5-nerviis*; Scapis *bipedalibus*, *profunde ſulcatis*; Spicis *palmaribus craſſis*, *flexuoſis*, *baſi in duas ſeu tres ſpicas laterales*, *diviſis*.

*** *Flores monopetali, monocarpi, ſuperi.*

SANGVISORBA. G. *P.* 146.

Cal. 2-phyllus. *Germen* inter calycem corollamque. *S. N.* 124.

109\. SANGVISORBA, *officinalis*, ſpicis ovatis. *Linn. Spec.* 169. [*Pimpinella-Hall.* 705.]

H. in pratis depreſſis paſſim. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. SANGVISORBÆ ſ. PIMPINELLÆ ITALICÆ Radix.

**** *Flores monopetali, dicocci, ſuperi.* Stellatæ.

GALIUM. G. *P.* 125.

Cor. 1-petala, plana. *Sem.* 2, ſubrotunda. *S. N.* 117.

a. *Fructu glabro.*

110\. GALIUM, *paluſtre*, foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffuſis. *Linn. Spec.* 153. [*Hall.* 719.]

H. ad rivulos pratorum, in foſſis, *im Judenweyher* copioſe; *an der Muhlbach* frequens. Floret Junio.
Folia caulina *ſemper inæqualia, obtuſiſſima: inferiora ſæpe quina vel ſena; ſuperiora quaterna, floralia bina. Plantæ exſiccatione nigreſcit.*

111\. GALIUM, *montanum*, foliis ſubquaternis linearibus lævibus, caule debili ſcabro, ſeminibus glabris. *Linn. Spec.* 155. [*Hall.* 714.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Beilſtein.* Floret Junio. ♃

112\. GALIUM, *uliginoſum*, foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Linn. Spec.* 153. [*Hall.* 713. & 715?]

H. ad rivulos, locis umbroſis *im Wieſengrund hinter dem Homberg*, & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

113. Galium, *ſpurium*, foliis ſenis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis ſimplicibus, fructibus glabris. *Linn. Spec.* 154. [*Hall.* 724.]

H. in agris inter ſegetes *hinter dem Schloſs*, frequens; in arenoſis *unter der neuen Brücke*, rarius. Floret Junio.

Differt a G. Aparine: Caulibus *vix pedalibus diffuſis*; Geniculis *æqualibus, nudis*; Foliis *inferne ſenis, ſuperne quaternis*; Fructu *glabro, demum rugoſo, fuſco.*

114. Galium, *verum*, foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis brevibus. *Linn. Spec.* 155. [*Hall.* 710.]

H. in arvis, paſcuis, pratis ſiccis, paſſim. Floret Junio.
Pharm. Galii lutei Herba, & Flores.

115. Galium, *Mollugo*, foliis octonis ovato-linearibus ſubſerratis patentiſſimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Linn. Spec.* 155. [*Hall.* 711.]

H. Varietas latifolia, ubique in dumetis & ad ſepes; V. anguſtifolia, in ſylvaticis montoſis *am Homberg.* Floret Junio.

116. Galium, *ſylvaticum*, foliis octonis lævibus ſubtus ſcabris; floralibus binis, pedunculis capillaribus, caule lævi. *Linn. Spec.* 155. [*Hall.* 712.]

H. in ſylvis frequens, *im Mühlberg* infra pagum *Sinn* copioſe. Floret Junio, Julio.

Caulis *teres, ſubtetragonus, lævis, geniculis incraſſatis.* Folia *ſæpe ſena tantum, marginibus, non carina ſcabra.* Flores *exigui, ante explicationem plures ſimul nutantes.* Corollæ *albæ, laciniis latiſſimis, acutis.* Stylus *breviſſimus.* Semen *nigrum, rugoſum, plerumque unicum ad maturitatem pervenit.*

b. *Fructu hiſpido.*

117. Galium, *Aparine*, foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructibus hiſpidis. *Linn. S. N.* 118. *Spec.* 157. [*Hall.* 723.]

H. ad ſepes, in cultis, inter ſegetes nimis frequens. Floret Majo, Junio.

ASPERULA. *G. P.* 121.

Cor. 1-petala, infundibuliformis. *Sem.* 2, globoſa. *S. N.* 116.

118. ASPERULA, *odorata*, foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis. *Linn. Spec.* 150. [*Hall.* 728.]

H. in ſylvis, & nemoribus frequens. Floret Majo.

Pharm. MATRISYLVÆ, ſ. HEPATICÆ STELLATÆ Herba.

SHERARDIA. *G. P.* 120.

Cor. 1-petala, infundibuliformis. *Sem.* 2, tridentata. *S. N.* 116.

119. SHERARDIA, *arvenſis*, foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Linn. Spec.* 149. [*Hall.* 734.]

H. in agris paſſim, in arvis *auf dem Schieſsplatz* copioſe. Floret Junio, Julio.

Calyx *ſex-* (*nec* 4) *dentatus, uti fructus.* Semina *unilocularia.*

***** *Flores tetrapetali, ſuperi.*

CORNUS. *G. P.* 149.

Involucrum 4-phyllum ſæpius. *Petala* ſupera 4. *Drupa* nucleo biloculari. *S. N.* 124.

CORNUS, *mas*, arborea, umbellis involucrum æquantibus. *Linn. S. N.* 125. [*Hall.* 815.]

H. in ſepibus ad *pagum Breitſcheid.*

120. CORNUS, *ſanguinea*, arborea, cymis nudis, ramis rectis. *Linn. S. N.* 125. *Spec.* 171. [*Hall.* 816.]

H. in ſepibus, dumetis, & ſylvis vulgaris, Floret Majo.

****** *Flores incompleti, inferi.*

ALCHEMILLA. *G. P.* 165.

Cal. 8-fidus. *Cor.* 0. *Sem.* 1. *S. N.* 129.

121. ALCHEMILLA, *vulgaris*, foliis lobatis. *Linn. Spec.* 178. [*Hall.* 1566.]

H. in pratis & pomariis, ubique vulgaris. Floret Junio, Julio.

Pharm. ALCHEMILLÆ Herba. Radix.

122. Alchemilla, *Aphanes*, hirſuta, foliis trilobatis, lobis tripartitis & bipartitis. *Hall.* 1569. *Aphanes arvenſis.* *Linn. Spec.* 179.

H. in agris & arvis arenoſis, *auf dem Dollberg*, & alibi frequens. Floret Junio. Julio.

Floris *ſtructura omnibus partibus* Alchemillæ *ſimillima:* Calyx *certe octo-fidus: (quadrifidus* Syst. Nat. III. 236.) *Laciniæ alternæ quatuor licet minutiſſimæ, ſemper tamen imprimis expliцato flore, præſentes; Setæ 6, in laciniis majoribus, duplo pauciores, in minoribus.* Stylus *unicus.* Semen *unicum, nunquam duo, centies repetita fructus anatome numeravi.*

B. *DYGYNIA.*

CUSCUTA. *G. P.* 170.

Cal. 4-ſ. 5-fidus. *Cor.* 1-petala, 4-ſ. 5-fida. *Capſ.* 2-locularis. *S. N.* 129.

123. Cuscuta, *europæa*, floribus ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 180. [*Hall.* 654.]

α. Cuſcuta major. *Bauh. Pin.* 219. (funiformis.)
β. Epithymum ſ. Cuſcuta minor. *Bauh. Pin.* 219 (filiformis.)
H. α, in ſepibus *unter der neuen Brücke* & alibi frequens.
β, locis gramineis, inter Feſtucam decumbentem, *hinter dem Homberg*, copioſe. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. α, Cuscutæ, β, Epithymi, Herba.

Caulis *filiformis,* (β. *capillaris,*) *tetragonus, tortus, dextrorſum volubilis, ſubramoſus, paraſiticus;* Radiculas *papillares; ſubſecuriformes, ex internodiis emittens, quibus plantis adfigitur, & nutrimentum viresque ex iis haurit; demum ad terram perit evaneſcitque.* Folia *nulla.* Squamula *unica ovatoacuta ſub ſingulo glomere florum, ubi ſæpe ramum educit.* Calyx & Corolla 4. ſ. 5-*fida.* Stamina 4. ſ. 5. Nectaria *in primariis floribus fere nulla, in ſerotoribus ſemibifida, laciniis iterum bifidis, incurvis.* Capſulas *ſæpe tri- etiam tetraſpermas vidi.*

C. *TETRAGYNIA.*

ILEX. *G. P.* 172.

Cal. 4-dentatus. *Cor.* rotata. *Stylus* 0. *Bacca* 4-ſperma. *S. N.* 130.

124. ILEX, *Aquifolium*, foliis ovatis acutis ſpinoſis. *Linn. Spec.* 181. [*Aquifolium-Hall.* 667.]

H. in ſylvis, *im Elſemrother Wald*, rarius. Flores nondum ſufficienter examinare licuit. Floret Majo.

SAGINA. *G. P.* 176.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* 1-locularis, 4-valvis, polyſperma. *S. N.* 131.

125. SAGINA, *procumbens*, ramis procumbentibus. *Linn. S. N.* 131. *Spec.* 185. [*Alſine-Hall.* 861.]

H. in agris & arvis paſſim, ſecus rivulos pratorum *hinter dem Homberg* copioſe. Floret tota fere æſtate.

POTAMOGETON. *G. P.* 174.

Cal. 0. *Cor.* 4-petala. *Stylus* 0. *Sem.* 4. *S. N.* 130.

126. POTAMOGETON, *natans*, foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Linn. Spec.* 182. [*Hall.* 843.]

H. in ſtagnis verſus *Burgk* rarius; in piſcinis ad *Driedorff*, alibique frequens. Floret Junio.

127. POTAMOGETON, *criſpum*, foliis lanceolatis alternis undulatis ſerratis. *Linn. Spec.* 183. [*Hall.* 848.]

H. in foſſis, ſtagnis, & rivulis, paſſim. Floret Majo.

128. POTAMOGETON, *compreſſum*, foliis linearibus obtuſis, caule compreſſo. *Linn. Spec.* 183. [*Hall.* 851.]

H. in foſſis, *im Waſſergraben auf der Herrenwieſe*, verſus *Burgk*, copioſe. Floret Junio.

129. POTAMOGETON, *puſillum*, foliis linearibus oppoſitis alternisque diſtinctis: baſi patentibus, caule tereti. *Linn.* 184? [*Hall.* 851.]

H. in ſtagnis, *unter der neuen Brücke, auch bey der untern Walckmühle*, rarius. Floret Junio.

Caulis *craſſitie fili*, *teres*. Folia *vix pollicaria*: *inferiora oppoſita*, *ſuperiora alterna.* Stipulæ *oblongæ*, *obtuſiſſimæ*, *apice ſubſerrulatæ*. Pedunculi *pollicares*, *teretes*, *caule fere craſſiores*. Spicæ *pauci-*(3-4)*floræ*. Flores *exigui*. Semina *gibba*, *obtuſa*.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

A. *MONOGYNIA.*

* *Flores monopetali, inferi, tetraſpermi.* Aſperifoliæ.

ECHIUM. *G. P.* 191.

Cor. irregularis, fauce nuda. *S. N.* 148.

130. ECHIUM, *vulgare*, caule tuberculato-hiſpido, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus. *Linn. Spec.* 200. [*Hall.* 603.]

H. ad vias; in ruderatis, muris vetuſtis, paſſim. Floret Junio, Julio.

PULMONARIA. *G. P.* 184.

Cor. infundibuliformis, fauce pervia, nuda. *Cal.* prismatico-5-gonus. *S. N.* 146.

131. PULMONARIA, *officinalis*, foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris. *Linn. Spec.* 194. [*Hall.* 597.]

H. foliis maculatis, ad ſepes & in dumetis, *am Homberg*; *am Steghaus*, foliis non maculatis, *auf dem Weſterwald*. Floret Aprili, Majo.

LITHOSPERMUM. *G. P.* 181.

Cor. infundibuliformis, fauce perforata, nuda. *Cal.* 5-partitus. *S. N.* 145.

132. LITHOSPERMUM, *officinale*, feminibus lævibus, corollis calycem vix ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Linn. Spec.* 189. [*Hall.* 595.]

H. in hortis variis; a nonnullis ſeritur pro ſuccedaneo Theæ, hinc quaſi indigena facta, *auf dem Hinterſand*, rarius. Floret Junio, Julio.

Pharm. MILII SOLIS, Semina.

133. LITHOSPERMUM, *arvenſe*, ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. *Linn. Spec.* 190. [*Heliotropium-Hall.* 594.]

H. in agris inter ſegetes *hinter dem Schloſs*; in ruderatis & cultis *auf dem Hinterſand*, frequens. Floret Majo, Junio.

SYMPHYTUM. *G. P.* 185.

Corollæ limbus tubulato-ventricoſus: fauce clauſa radiis ſubulatis. *S. N.* 147.

134. Symphytum, *officinale*, foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Linn. Spec.* 195. [*Hall.* 600.]

H. ad foſſas, & ripas *Dillæ*, frequens. Varietas corollis purpureis apud nos vulgatiſſima eſt. Floret Majo, Junio.
Pharm. Consolidæ Majoris ſ. Symphyti. Radix, Folia.

BORAGO. *G. P.* 188.

Corolla rotata: fauce radiis clauſa. *S. N.* 147.

135. Borago, *officinalis*, foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Linn. Spec.* 197. [*Hall.* 607.]

H. in cultis, & rejectamentis hortorum non infrequens. Exotica Planta indigena facta. Floret Junio.
Pharm. Boraginis Herba, Flores.

LYCOPSIS. *G. P.* 190.

Corollæ tubus incurvatus. *S. N.* 148.

136. Lycopsis, *arvenſis*, foliis lanceolatis hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis. *Linn. Spec.* 199. [*Hall.* 605.]

H. in agris inter ſegetes; in cultis & arvis *auf dem Schieſsplatz*, frequens. Floret æſtate.

CYNOGLOSSUM. *G. P.* 183.

Cor. infundibuliformis, fauce clauſa fornicibus *Semina* depreſſa, interiore tantum latere ſtylo affixa. *S. N.* 146.

137. Cynoglossum, *officinale*, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 192. [*Hall.* 587.]

H. in ruderatis, *auf dem Hinterſand*; ad muros urbis, *bey dem Thurm*; ad viam publicam *oberhalb Burgk*, copioſe. Floret Majo, & ſequ.
Pharm. Cynoglossi Radix, Herba.

MYOSOTIS. *G. P.* 180.

Cor. hypocrateriformis, 5-fida, emarginata: fauce clauſa fornicibus. *S. N.* 144.

138. MYOSOTIS, *ſcorpioides*, ſeminibus nudis, foliorum apicibus calloſis. *Linn. Spec.* 188.

α. Myoſotis, *arvenſis*, foliis hirſutis. *Linn.* Hort. *Cliff.* 46. (Scorpiurus *Hall.* 590.)

β. Myoſotis, *paluſtris*, foliis glabris. *Linn.* Hort. *Cliff.* 46. (Scorpiurus *Hall.* 591.)

H. α. in arvis, agris, ruderatis, ad vias; var. β. ad rivulos, in pratis humidis; Corollis cœruleis, albis, & carneis ludit. Floret æſtate.

Var. α. Radix *fibroſa*, *annua*. Caulis *ramoſus*. Folia *hirſuta*. Calyx *profundius 5-fidus*, *maturo ſemine clauſus*. *Pecora plantam intactam relinquunt.*

Var. β. Radix *repens*, *perennis*. Caulis *ſubramoſus*. Folia *glabra*. Calyx *maturo ſemine patulus*. *Ovibus noxia*, *ſæpe lethalis.*

** *Flores monopetali, inferi, angioſpermi.*

ANAGALLIS. *G. P.* 206.

Cor. rotata. *Capſ.* circumſciſſa. *S. N.* 153.

139. ANAGALLIS, *arvenſis*, foliis indiviſis, caule procumbente. *Linn. Spec.* 211.

α. Anagallis phœniceo flore. *Bauh. Pin.* 252. (*Hall.* 625.)

β. Anagallis cœruleo flore. *Bauh. Pin.* 252. (*Hall.* 626.)

H. in agris, arvis, & cultis ubique. Var. β. in agris *am Homberg*, vulgaris. Floret æſtate.

Pharm. ANAGALLIDIS (flore phœniceo) Herba.

Var. β. in hortum introducta, faciem, & corollæ pulcherrimum colorem, per plures annos non mutavit. Folia anguſtiora, longiora, ſæpe terna, quaterna. In α & β, Corolla crenulata.

α. Ad Inſaniam, Maniamque valere, dicitur; & in ipſa Hydrophobia a nuperis laudatur. Utinam verum, non dubium eſſet ſpecificum!

LYSIMACHIA. *G. P.* 205.

Cor. rotata. *Capſ.* globoſa, mucronata, 10-valvis. *S. N.* 152.

140. LYSIMACHIA, *vulgaris*, paniculata: racemis terminalibus. *Linn. Spec.* 209. [*Hall.* 630.]

H. ad ripas *Dillæ* frequens. Floret Julio, Auguſto.
Filamenta *baſi coalita, altitudine inæqualia.* Folia *ſæpe terna, quaterna.*

141. LYSIMACHIA, *nemorum*, foliis ovatis acutis, floribus ſolitariis, caule procumbente. *Linn. Spec.* 211. [*Hall.* 628.]

H. in ſylvis, *im Hirſchberg* frequens. Floret Junio, Julio.

142. LYSIMACHIA, *Nummularia*, foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente. *Linn. Spec.* 211. [*Hall.* 629.]

H. locis humidis depreſſis umbroſis, ad ſcrobes paſſim. Floret Junio, Julio.
Pharm. NUMMULARIÆ Herba.

PRIMULA. *G. P.* 197.

Involucrum umbellulæ. *Corollæ* tubus cylindricus: ore patulo. *S. N.* 150.

143. PRIMULA, *veris*, foliis dentatis rugoſis. *Linn. Spec.* 204.

α. Primula *officinalis*, limbo corollarum concavo. *Linn. Spec.* 204. (*Hall.* 610.)
β. Primula *elatior*, limbo corollarum plano. *Linn. Spec.* 204. (*Hall.* 609.)
H. α. in pratis & pomariis, copioſe; in ſylvaticis montoſis: ſcapo altiore, multifloro; var. β. Corollis pallidioribus, inodoris, in pratis ſiccis *bey Langenaubach* frequens. Floret Aprili, Majo
Pharm. α. PARALYSEOS, ſ. PRIMULÆ VERIS Radix, Flores.

MENYANTHES. *G. P.* 202.

Cor. hirſuta. *Stigma* 2-fidum. *Capſ.* 1-locularis. *S. N.* 152.

144. MENYANTHES, *trifoliata*, foliis ternatis. *Linn. Spec.* 208. [*Hall.* 633.]

H. in pratis uliginoſis, infra pagum *Sinn*, copioſe. Floret Majo, Junio.
Pharm. TRIFOLII FIBRINI, ſ. AQUATICI Radix, Herba.

CONVOLVULUS. *G. P.* 215.

Cor. campanulata, plicata. *Stigm.* 2. *Capſ.* 2-locularis: loculis diſpermis. *S. N.* 155.

145. CONVOLVULUS, *arvenſis*, foliis ſagittatis utrinque acutis, pedunculis ſubunifloris. *Linn. S. N.* 155. *Spec.* 218. [*Hall.* 664.]

H. in agris, arvis & cultis ubique frequens. Floret Junio & ſeq.

Pedunculus *tetragonus, infra florem teres, ſæpe biſlorus. Fructus nutans.*

146. CONVOLVULUS, *ſepium*, foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. *Linn. Spec.* 218. [*Hall.* 663.]

H. in ſepibus frequens. Floret Julio, Auguſto.

Capſulæ *diſſepimentum utrinque laterale, dimidiatum.*

DATURA. *G. P.* 246.

Cor. infundibuliformis, plicata. *Cal.* tubuloſus, angulatus, deciduus. *Capſ.* 4-valvis. *S. N.* 170.

147. DATURA, *Stramonium*, pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Linn. Spec.* 255. [*Stramonium-Hall.* 586.]

H. in cultis oleraceis paſſim. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. DATURÆ ſ. STRAMONII. Herba. Semina.

HYOSCYAMUS. *G. P.* 247.

Cor. infundibuliformis, obtuſa. *Stam.* inclinata. *Capſ.* operculata, 2-locularis. *S. N.* 170.

148. HYOSCYAMUS, *niger*, foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 257. [*Hall.* 580.]

H. ſecus vias, in ruderatis, *auf dem Hinterſand*, copioſe. Floret Junio, Julio.

Pharm. HYOSCYAMI Herba. Semina.

VERBASCUM. *G. P.* 245.

Cor. rotata, ſubinæqualis. *Capſ.* 2-locularis, 2-valvis. *S. N.* 169.

149\. VERBASCUM, *Thapſus*, foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici. *Linn. S. N.* 169. *Spec.* 252. [*Hall.* 581.]

H. in ſterilibus glareoſis *am Dollberg*, *Rehberg*; & alibi frequens. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. VERBASCI Radix, Herba, Flores.
Filamenta *duo inferiora reliquis longiora*, *nuda*, *tria ſuperiora albido villoſa*.
Corollarum Infuſum gratum & præſtantiſſimum reſolvens; in morbis pectoris, Phthiſi, Tuſſi ſicca & humida; ſub nomine BOUILLON BLANC, optimo cum ſucceſſu, ſe utuntur Galli.

150\. VERBASCUM, *Lychnitis*, foliis cuneiformi-oblongis. *Linn. Spec.* 253. [*Hall.* 583.]

H. in ſterilibus ſiccis, vulgaris; Corollis albidis minoribus, *auf der Hohle*. Floret Julio & ſequ.

151\. VERBASCUM, *nigrum*, foliis cordato-oblongis petiolatis. *Linn. S. N.* 169. *Spec.* 253. [*Hall.* 584.]

H. in ruderatis, ſecus vias ubique. Floret Julio & ſeq.
Filamenta *uti in præcedente æqualia*, *omnia villoſa*, *in hac purpurea*.

VINCA. *G. P.* 295.

Contorta. *Folliculi* 2, erecti. *Semina* nuda. *S. N.* 189.

152\. VINCA, *minor*, caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Linn. Spec.* 304. [*Pervinca. Hall.* 572.]

H. ad ſepes, *am Heiligenſloſs*; *am Dollberg*, vulgaris. Floret Aprili, Majo.
Pharm. VINCÆ PERVINCÆ Herba.
Caules *repentes*. Rami *adſcendentes*, *ſimplices*, *uniflori*; Antheræ *apice barbatæ*. Folliculi *diſpermi*, *ſemper in noſtrate*.

SOLANUM. *G. P.* 251.

Cor. rotata. *Antheræ* ſubcoalitæ, apice poro gemino dehiſcentes. *Bacca* 2 - locularis. *S. N.* 172.

153. SOLANUM, *Dulcamara*, caule inermi frutefcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis. *Linn. Spec.* 264. [*Hall.* 575.]

H. ad foſſas, & ripas *Dillæ*; *an der Mühlbach*, vulgaris. Floret Junio, Julio.

Pharm. DULCAMARÆ Radix cum ſtipitibus.

Radix & caulium pars inferior inter ſanguinem purificantia efficaciſſima. SARSAPARILLÆ americanæ, qua facile carere poſſemus, præſtantiſſimum ſuccedaneum europæum.

154. SOLANUM, *nigrum*, caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis diſtichis nutantibus. *Linn. S. N.* 173. *Spec.* 266. [*Hall.* 576.]

H. fecus vias, in cultis, ubique vulgaris. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. SOLANI NIGRI Herba.

ATROPA. *G. P.* 249.

Cor. campanulata. *Stamina* diſtantia. *Bacca* globoſa, 2 - locularis. *S. N.* 171.

155. ATROPA, *Belladonna*, caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Linn. Spec.* 260. [*Belladonna. Hall.* 579.]

H. in ſylvis *in der Hörre*; *im Hirſchberg*; *im Thiergarten*, copioſe. Floret Junio, Julio.

Pharm. BELLADONNÆ Herba.

*** *Flores monopetali, ſuperi.*

PHYTEUMA. *G. P.* 220.

Cor. rotata, 5 - partita: laciniis linearibus. *Stigma* 2 - ſ. 3 - fidum. *Capſ.* 2 - ſ. 3 - locularis, infera, perforata. *S. N.* 162.

156. PHYTEUMA, *ſpicata*, ſpica oblonga, capſulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. *Linn. Spec.* 242. [*Rapunculus - Hall.* 684.]

H. in pratis ſylvaticis, *am Hirſchberg; auf der Rehe;* in pomariis, *in der untern Pitze.* Corollis albis, purpureiſque variat. Floret Majo.

Valvulæ 5, *conniventes, Receptaculum tegentes, apice in* Filamenta *deſinentes, uti in* Campanula. Stigma *ſæpius 2- quam 3-fidum.*

CAMPANULA. *G. P.* 218.

Cor. campanulata, fundo clauſa, valvis ſtaminiferis. *Stigma* 3-fidum. *Capſ.* infera, poris lateralibus dehiſcens. *S. N.* 159.

a. *Foliis lævioribus anguſtioribus.*

157. CAMPANULA, *rotundifolia*, foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Linn. Spec.* 232.

α. Caule onifloro. *Hall.* 700.
β. Caule multifloro. *Hall.* 702.
H. α. in collibus ſiccis *am Stutzelberg;* β. in muris & arvis; paſſim. Floret æſtate.

158. CAMPANULA, *Rapunculus*, foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Linn. Spec.* 232. [*Hall.* 699.]

H. in arvis & pratis ſylvaticis, *am Homberg*; & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

Radices *cum primariis foliis, a noſtratibus primo vere in acetaria*, Rapunzeln *dictæ, recipiuntur.*

159. CAMPANULA, *perſicifolia*, ſoliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus ſubſerratis ſeſſilibus remotis. *Linn. Spec.* 232. [*Hall.* 697.]

H. in ſylvarum aſperis *am Homberg*; *Dollberg; im Beilſtein* frequens. Floret Julio.

b. *Foliis ſcabris latioribus.*

160. CAMPANULA, *latifolia*, foliis ovato-lanceolatis, caule ſimpliciſſimo tereti, floribus ſolitariis pedunculatis, ſtuctibus cerouis. *Linn. Spec.* 233. [*Hall.* 691.]

H. in ſylvaticis montoſis, ad ſepes, *bey Langenaubach;* & *Erbach.* Floret Julio.

161. Campanula, *rapunculoides*, foliis cordato-lanceolatis, caule ramoſo, floribus ſecundis ſparſis, calycibus ciliatis reflexis. *Linn. Spec.* 234. [*Hall.* 692.]

H. ad verſuras, *am Homberg*; *Dollberg*, rarius; ad viam publicam *am Beilſtein* copioſe. Floret Julio & ſeq.

162. Campanula, *Trachelium*, caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Linn. Spec.* 235. [*Hall.* 690.]

H. in ſylvis, *am Homberg*, rarius; *am Rehberg*; in nemoroſis circa *Erbach*, frequens. Floret Julio, Auguſto.

163. Campanula, *glomerata*, caule angulato, ſimplici, floribus ſeſſilibus, capitulo terminali. *Linn. Spec.* 235. [*Hall.* 685.]

H. ad ſepes *im Roſenwaldgen*, rarius. . Floret Junio, Julio.

LONICERA. *G. P.* 233.

Cor. 1-petala, irregularis. *Bacca* polyſperma, 2-locularis, infera. *S. N.* 165.

164. Lonicera, *Periclymenum*, capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis. *Linn. Spec.* 247. [*Caprifolium-Hall.* 673]

H. in dumetis ad pagos *Schönbach* & *Frohnhauſen*. Floret Junio.

165. Lonicera, *Xyloſteum*, pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis integerrimis pubeſcentibus. *Linn. Spec.* 248. [*Caprifolium. Hall.* 677.]

H. in ſepibus, & dumetis, *in der Callenbach*, & alibi frequens. Floret Majo.

**** *Flores pentapetali, inferi.*

RHAMNUS. *G. P.* 265.

Cal. tubuloſus: ſquamis ſtamina munientibus. *Cor.* nulla. *Bacca* rotunda. *S. N.* 178.

166. Rhamnus, *catharticus*, ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Linn. Spec.* 279. [*Hall.* 824.]

H. in ſepibus *hinter dem Schloſs*: Mas cum Femina. Floret Majo.

Maris

Maris Flores Germine *imperfecto*: Feminæ *ſquamis duplo minoribus* Antheriſque *polline deſtitutis, inſtructi ſunt.* Stigma 4-*fidum*. Bacca 4-*locularis*, 4-*ſperma*.
Pharm. SPINÆ CERVINÆ Baccæ.

167. RHAMNUS, *Frangula*, inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Linn. Spec.* 280. [*Hall.* 821.]
H. in ſylvis *am Homberg*; *im Beilſtein*. Floret Majo, Junio.
Bacca 2-*locularis*. Semina 2, *rarius* 3.
Pharm. FRANGULÆ Cortex.

EVONYMUS. *G. P.* 271.

Cor. 5-petala. *Capſ.* 5 gona, 5-locularis, 5-valvis, colorata. *Sem.* calyptrata. *S. N.* 181.

168. EVONYMUS, *europæus*: (*tenuifolius*), floribus plerisque quadrifidis. *Linn. Spec.* 286. [*Hall.* 829.]
H. ad ſepes *am Dollberg*, alibique vulgaris. Floret Majo.
Flores *pentapetali in noſtrate rariſſimi*.

***** *Flores pentapetali, ſuperi.*

RIBES. G. *P.* 281.

Cor. 5-petala. *Stamina* calyci inſerta. *Stylus* bifidus. *Bacca* polyſperma, infera. *S.N.* 184.

a. Ribeſia *inermia*.

169. RIBES, *rubrum*, inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis. *Linn. Spec.* 290. [*Hall.* 818].
H. in ſepibus interhortenſibus vulgaris. Floret Aprili, Majo.
Stylus *bipartitus*, *reflexus*. Petala *bifida*.
Pharm. RIBIUM RUBRORUM Baccæ.

170. RIBES, *nigrum*, inerme, racemis piloſis, floribus oblongis. *Linn. Spec.* 291. [*Hall.* 819.]
H. in ſepibus interbortenſibus, *über der neuen Brücke*. Floret Majo.
Petala *obtuſa*. Stylus *ſimplex*, *vix ſulco ſemidiviſus*. Stigma *bifidum*.
Hoc & præcedens, alias non ſpontanea, nonnunquam vero occurrunt, forte ab aviculis diſſeminata, in truncis arborum emortuis *im Beilſtein*.

171. RIBES, *alpinum*, inerme, racemis erectis: bracteis flore longioribus. *Linn. Spec.* 291. [*Hall.* 817].

H. Frutex in noſtra regione conſtanter dioicus. *Mas* in dumetis & ſepibus paſſim; *Femina* circa pagum *Beilſtein* tantum, cum mare, rarius. Floret Martio, April.

Mas Glandulæ *petiolares hyalinæ*. Racemi *multiflori*. Bracteæ *longitudine florum*. Flores *approximati*, *planiuſculi*. Calyx *patens*. Petala *flaveſcentia*. Antheræ *polliniferæ*. Germen *nullum*, *vix rudimentum calyce concretum*. Stylus *erectus*, *brevis*. Stigmata *emarcida*. Fructus *nullus*.

Feminæ Glandulæ *petiolares purpureæ*. Racemi 3-4-5-*flori*. Bracteæ *floribus longiores*. Flores *remoti*, *oblongi*. Calyx *reflexus*. Petala *rubra*. Antheræ *polline deſtitutæ*. Germen *corolla fere majus*. Stylus *ſemibifidus*, *ſtaminibus longior*. Stigmata *ſubgloboſa*, *reflexa*. Baccæ *erectæ*, *pentaſpermæ*, *rubræ*, *inſipidæ*.

b. Groſſulariæ *aculeatæ*.

172. RIBES, *Groſſularia*, ramis aculeatis, petiolorum ciliis piloſis, baccis hirſutis *Linn. Spec.* 291?

H. in pomariis & ſepibus interhortenſibus *auf der Schafdille* rarius. Floret April.

Rami *cortice lævi*, *aculeati*: *aculeis dectdui*. Petiolorum *pili villoſi*, *fere pennati*, *non dehiſcenti* Gemmæ *capitati*. Flos *unicus*, *rariſſime geminus*, *nutans*. Bractea *tripartita*. R. uvæ criſpæ *duplo major*. Bacca *magna*, *pubeſcens*, *rubra*. An R. *reclinati* varietas?

173. RIBES, *Uva criſpa*, ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla. *Linn. Spec.* 292. [*Hall.* 820.]

H. ad ſepes paſſim; in ſylvis *am Beilſtein*, & *Homberg* frequens. Floret April.

HEDERA. *G. P.* 283.

Petala 5, oblonga. *Bacca* 5-ſperma, calyce cincta. *S. N.* 184.

174. HEDERA, *Helix*, foliis ovatis lobatisque *Linn. Spec.* 292. [*Hall.* 826].

H. Junior ſterilis, Foliis ætate varians, in ſylvis *am Homberg*, *im Beilſtein*; & alibi frequens; Arbor fructificans, ad murum Urbis *vor dem Schloſspförtgen*. Floret Septembri. Fructus ſubſequenti April maturescunt.

Pharm. HEDERÆ ARBOREÆ Folia, Baccæ, Gummi.

B. *D I G Y N I A.*

* *Flores monopetali , inferi.*

ASCLEPIAS. *G. P.* 306.

Contorta. *Nectaria* 5, ovata, concava, corniculum exſerentia. *S. N.* 193.

175. ASCLEPIAS, *Vincetoxicum*, foliis ovatis baſi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Linn. Spec.* 314. [*Hall.* 571.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg; in der Callenbach; auf der Steinſette* copioſe. Floret Junio, Julio.

Pharm. VINCETOXICI ſ. HIRUNDINARIÆ Radix.

GENTIANA. *G. P.* 322.

Cor. 1-petala. *Capſ.* 2-valvis, 1-locularis: *Receptaculis* 2, longitudinalibus. *S. N.* 199.

176. GENTIANA, *verna*, corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus. *Linn. Spec.* 331. [*Hall.* 644.]

H. in pratis verſus *Burgk* & *Hirſchberg*. Floret Majo. +

177. GENTIANA, *Centaurium*, corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, piſtillo ſimplici. *Linn. S. N.* 200. *Spec.* 332. [*Hall.* 648.]

β. Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule breviſſimo ramoſiſſimo. GERARD. *Prov.* 311.

H. α, in montoſis ſylvaticis *am Homberg; Dollberg; hinter dem Beilſtein*, alibique vulgaris; β. *auf dem Sauwiesgen* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Antheræ ſparſo polline, ſpiraliter tortæ.

Pharm. α, CENTAURII MINORIS Herba cum Floribus.

178. GENTIANA, *Amarella*, corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Linn. Spec.* 334. [*Hall.* 650.]

H. in pratis montoſis *am Beilſtein*, *vix digitalis*; in juniperetis *auf dem Rehberg & Homberg*, *fere bipedalis*, *ramoſiſſima*. Floret Septembri.

Calyx *inæqualis*. Corollæ *faux ſquamis quinque triangularibus, conniventibus, longiſſime ciliatis, clauſa.*

179. GENTIANA, *cruciata*, corollis quadrifidis imberbibus, floribus verticillatis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 334. [*Hall.* 643.]

H. in ſterilibus montoſis *am Beilſtein* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Denticuli *Corollæ laciniis interjecti bifidi, interne decurrentes.* Stigmata *revoluta.*

** *Flores incompleti.*

CHENOPODIUM. G. P. 309.

Cal. 5-phyllus, 5-gonus. *Cor.* 0. *Sem.* 1, lenticulare, ſuperum. *S. N.* 194.

a. *Foliis angulofis.*

180. CHENOPODIUM, *Bonus Henricus*, foliis triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis axillaribus. *Linn. S. N.* 194. *Spec.* 318. [*Hall.* 1578.]

H. ad vias, juxta parietes, ad pagos frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. BONI HENRICI Herba.

181. CHENOPODIUM, *rubrum*, foliis cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis ſubfolioſis, caule brevioribus. *Linn. S. N.* 195. *Spec.* 318. [*Hall.* 1583.]

H. in ruderatis, & cultis paſſim. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. ATRIPLICIS SYLVESTRIS Herba.

182. CHENOPODIUM, *album*, foliis rhomboideo-triangularibus eroſis poſtice integris: ſummis oblongis, racemis erectis. *Linn. Spec.* 319. [*Hall.* 1579.]

H. in hortis & cultis *auf dem Hinterſand*, alibique frequens. Floret Julio.

183. CHENOPODIUM, *viride*, foliis rhomboideis dentato-ſinuatis, racemis ramoſis ſubfolioſis. *Linn. Spec.* 319. [*Hall.* 1580.]

H. in cultis *in der Pitze; auf dem Schieſsplatz* copioſe. Floret Julio, Auguſto.

184. CHENOPODIUM, *hybridum*, foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramoſis nudis. *Linn. Spec.* 319. [*Hall.* 1581.]

H. in ſterilibus & cultis paſſim. Floret Julio, Auguſto.

185. CHENOPODIUM, *glaucum*, foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis ſimplicibus glomeratis. *Linn. Spec.* 320. [*Hall.* 1584.]

H. in agris *am Dollberg* & *Homberg*; *auf dem Hinterſand* rarius. Floret Auguſto.

186. CHENOPODIUM, *urbicum*, foliis triangularibus ſubdentatis, racemis confertis ſtrictiſſimis cauli approximatis longiſſimis. *Linn. Spec.* 318.

H. in cultis oleraceis *in der untern Puze*; *auf dem Schlüſſel* rarius. Floret Julio, Auguſto. +

b. *Foliis integris.*

187. CHENOPODIUM, *Vulvaria*, foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Linn. Spec.* 321. [*Hall.* 1577.]

H. unico in loco *im breiten Fahrweg, vor dem untern Thor*. Floret Julio.

Pharm. VULVARIÆ Herba.

188. CHENOPODIUM, *polyſpermum*, foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Linn. Spec.* 321. [*Hall.* 1576.]

H. in cultis & hortis *vor dem untern Thor*; *auf dem Schiesſplatz*; *an der Muhlbach* frequens. Floret Junio, Julio.

Racemi *florentes ramoſi, ſpicati; fructiferentes cymoſi, dichotomi.*

HERNIARIA. *G. P.* 308.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 0. *Stamina* 5 ſterilia. *Capſ.* 1-ſperma. *S. N.* 194.

189. HERNIARIA, *glabra*, glabra herbacea. *Linn. Spec.* 317. [*Hall.* 1552.]

H. in arvis ſterilibus apricis *am Dollberg*; *auf dem Schieſsplatz* parcius, *auf der Sandwieſe* copioſe. Floret Junio & ſequ.

Pharm. HERNIARIÆ ſ. MILLEGRANÆ Herba.

Calyx *ſæpe 4 partitus.* Staminibus *quatuor* Filamenta *Antheris deſtituta reliquis tenuiora, albidioraque.* Styli *duo, breves:* Stigmata *ſubgloboſa.* Capſula *membranacea, digitis com-*

preſſa. Semen atropurpureum, nitidum, apice profunde emarginatum, baſi demittens.

ULMUS *P. G.* 316.

Cal. 5 - fidus. *Cor.* o. *Bacca* exſucca, compreſſo-membranacea. *S. N.* 198.

190. ULMUS, *campeſtris*, foliis duplicato-ſerratis: baſi inæqualibus. *Linn. Spec.* 327. [*Hall.* 1586.]
H. circa pagum *Erbach* frequens. Floret Aprili.
Pharm. ULMI Cortex medius.

*** *Flores pentapetali, ſuperi, diſpermi.*
Umbellatæ.
a. *Involucro univerſali, partialique.*

SANICULA. *G. P.* 326.

Umbellæ confertae, ſubcapitatæ. *Fructus* ſcaber. *Flores* diſci abortientes. *S. N.* 202.

191. SANICULA, *europæa*, foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 339. [*Hall.* 737.]
H. in ſylvis umbroſis, *am Rehberg*; *im Hirſchberg*; *in der Hærre* copioſe. Floret Majo, Junio.
Pharm. SANICULÆ Herba.

HERACLEUM. *G. P.* 345.

Fructus ellipticus, emarginatus, compreſſus, ſtriatus, marginatus. *Cor.* difformis, inflexo-emarginata. *Involucrum* caducum. *S. N.* 210.

192. HERACLEUM, *ſphondylium*, foliolis pinnatifidis lævibus, floribus uniformibus. *Linn. S. N.* 210. *Spec.* 358. [*Sphondylium-Hall.* 809.]
H. in pratis humidis, ubique frequens. Floret Junio & ſequ.
Pharm. BRANCÆ URSI Herba. (*Male* pro Acantho.)
Foliorum *lobi in planta ſertus florente* (*Auguſto*) *multo minores, magisque diviſi.* Umbella *radiata*: Corollis *ante explicationem purpureis ſeu viridibus, demum albis; inæqualibus, duplo majoribus in radio; ſubæqualibus in diſco, centralibus ſæpe abortientibus.*

OENANTHE. *G. P.* 352.

Floſculi difformes: in diſco ſeſſiles, ſteriles. Fructus calyce coronatus. *S. N.* 212.

193. OENANTHE, *fiſtuloſa*, ſtolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fiſtuloſis. *Linn. Spec.* 365. [*Hall.* 755.]

H. in pratis paludoſis circa pagum *Sinn.* Floret Junio.

CAUCALIS. *G. P.* 331.

Cor. radiatæ; diſci maſculæ. *Petala* inflexo-emarginata. *Fructus* ſetis hiſpidus. *Involucra* integra. *S. N.* 205.

194. CAUCALIS, *daucoides*, umbellis trifidis aphyllis, umbellulis triſpermis triphyllis. *Linn. S. N.* 205. [*Hall.* 739.]

CAUCALIS *leptophylla. Linn. Spec.* 347.

H. inter ſegetes *am Dollberg* copioſe, alibique frequens. Floret Julio Auguſto.

Radix *fuſiformis, annua.* Caulis *pedalis, erectus, ſulcuto-angulatus, ramoſus, lævis. geniculis albido-ſetoſis.* Folia *ſupradecompoſita:* Petiolis *uti Folia ſubtus ſetis albidis, raris adſperſis, baſi membranaceis;* Pinnulis *pinnatifidis, anguſtis, obtuſiuſculis, apice bi- ſ. trifidis.* Umbella univerſalis *radiis tribus, firmis, tetragonis;* partialis *radiis* 5-7-9: *quorum ſemper exteriores robuſtiores, fructiferi; centrales tenuiores, ſteriles.* Involucrum *rarius foliolum unicum, lanceolatum, plerumque nullum; ejus loco, ſetæ albidæ congeſtæ.* Involucellum *dimidiatum, triphyllum, patens: foliolis lanceolatis, longitudine floſculorum.* Flores tres extimi *majores,* Hermaphroditi, *fertiles;* centrales 2-4-6, Maſculi, *ſteriles.* Calycis *laciniæ lanceolatæ, extimis duabus reliquis majoribus.* Petala, *obcordata, emarginata, ſubpurpuraſcentia, inæqualia, extimo triplo majore.* Stamina *longitudine petalorum.* Germen *ſcabrum.* Maris *nullum, Calyce lævi. Singulæ Umbellulæ* Fructus *tres, diſtantes, oblongi, magni, Calyce coronati.* Semen *ſulcatum, ſetis inæqualibus, ſurſum hamatis hiſpidum; nucleum oblongum condens.*

DAUCUS. *G. P.* 333.

Cor. ſubradiatæ, omnes hermaphroditæ. *Fructus* pilis hiſpidus. *S. N.* 206.

195. DAUCUS, *Carota*, ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis. *Linn. Spec.* 348. [*Hall.* 746.]

H. in ſterilibus *am Galgenberg* copioſe, alibique frequens. Floret Junio, Julio.

Pharm. DAUCI SYLVESTRIS Semina.

TORDYLIUM. *G. P.* 330.

Cor. radiatæ, omnes hermaphroditæ. *Fructus* ſuborbiculatus, margine crenatus. *Involucra* longa, indiviſa. *S. N.* 204.

196. TORDYLIUM, *Anthriſcus*, umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Linn. Spec.* 346. [*Caucalis-Hall.* 741.]

H. ſecus vias paſſim; ad ſepes *am Dollberg* copioſe. Floret Junio & ſequ.

Setæ in caule deorſum, in radiis umbellæ ſurſum adpreſſæ. Involucr. univ. *polyphyllum, Umbella brevius.* Involucr. part. *polyphyllum, longitudine Umbellulæ.* Floſculi *rubentes.* Semina *ovato-oblonga, triſulca, ſetis rigidis, hamatis, hiſpida.*

PEUCEDANUM. *G. P.* 339.

Fructus ovatus, utrinque ſtriatus, ala cinctus. *Involucra* breviſſima. *S. N.* 208.

197. PEUCEDANUM, *Silaus*, foliolis pinnatifidis: laciniis oppoſitis, involucro univerſali diphyllo. *Linn. Spec.* 354. [*Hall.* 797.]

H. in pratis humidiuſculis *auf dem Weſterwald* inter *Ober- und Nieder-Roſsbach* frequens. Floret Julio.

Radix *perennis.* Caulis *bipedalis, brachiatus, ſulcato-angulatus.* Folia *ſupradecompoſita, pinnulis petiolatis, ſubpinnatifidis: foliolis oppoſitis, lanceolatis, margine coarctato carinatis, obtuſiuſculis, mucrone cartilagineo; extimis* 2 ſ. 3, *baſi coadunatis.* Umbellæ *inæquales, radiis* 10. Umbellulæ *æquales, planæ.* Involucrum *rariſſime* 1-ſ.-2-*phyllum, plerumque nullum.* Involucella *decaphylla: foliolis lineari-lanceolatis, margine membranaceis, longitudine Umbellulæ.* Corollæ *luteæ, extus*

Digitized by Google

pallidiores: Petala *lanceolata*, *acuta*, *apice inflexo*, *adnato*, *nervo longitudinali*. Filamenta *corollæ duplo fere longiora*. Germen 6-*ſulcatum*. Styli *breviſſimi*, *petalis decidentibus longiores*. Stigmata *capitata*. Semina *ovato-oblonga*, *trinervia*, *depreſſiuſcula*, *odorata*.

CONIUM. *G. P.* 336.

Involucella dimidiata, ſubtriphylla. *Fructus* ſubgloboſus, 5-ſtriatus, utrinque crenatus. *S. N.* 206.

198. CONIUM, *maculatum*, ſeminibus ſtriatis. *Linn. Spec.* 349. [*Cicuta. Hall.* 766.]

H. in ruderatis *hinter dem Schloſs*; ad verſuras *am Homberg*; in cultis *auf dem Hinterſand*, alibique frequens. Floret Julio.

Pharm. CICUTÆ (tutius CONII) Herba.

Radix *biennis*, *fuſiformis*, *albida*. Caulis *tri-ſ. quadripedalis*, *erectus*, *ramoſus*, *teres*, *æqualis*, *fiſtuloſus*, *glaber*, *leviſſime ſtriatus*, *ultra medium uſque maculis purpuraſcentibus adſperſus*.

Folia radicalia *magna*, *ſupradecompoſita*, *nitida*; *ſupra obſcure-viridia*, *ſubtus pallidiora*. Petioli *uti caulis maculati*, *glabri*, *fiſtuloſi*, *ſucculenti*, *teretes*, *ſupra vix depreſſiuſculi*. Fol. caulina *multo minora*. Vaginis *membranaceis*, *nervoſis*, *margine membranula tenui*, *albida*, *acuta apice prominula*, *auctis*; Pinnulis *teneris*, *ſubpinnatifidis*, *inciſo-dentatis*, *extimis confluentibus*.

Umbella *planiuſcula*: *radiis* 10-12, *erecto-patulis*. Umbellulæ *conſimiles*, *radiis* 15, 16. Involucrum 3-5-*phyllum*. *foliolis ovato-lanceolatis*, *acutis*, *baſi coalitis*, *inæqualibus*, *reflexis*, *ultra medium uſque albido marginatis*, *ſæpe unidentatis*. Involucella *monophylla*, *dimidiata*, *reflexo-patula*, *ſemitri-rarius quadrifida*: *Laciniis inæqualibus*, *ovatis*, *acutis*.

Floſculi *æquales*, *omnes fertiles*. Calyx *nullus*. Cor Petala *alba*, *inflexo cordata*, *inæqualia*, *nervo intermedio ſupra eminentiore*. Stamina *longitudine corollæ*. Germen *ſubrotundum*, *ſtriatum*. Styli *reflexi*, *breviſſimi*. Stigmata *vix incraſſata*.

Fructus *ſubgloboſus*, *ſtriatus*: *Striis undulato-flexuoſis*. Semina *duo*, *hemiſphærica*, *nervis tribus*, *eminentibus*, *crenatis*.

Umbellæ *in Caule & Ramis terminali proximæ*, *ſæpe oppoſitæ*. *Totius Plantæ odor ſi digitis conquaſſetur*, *nauſeoſus*, *ingratus*, *Urinæ murinæ non abſimilis*.

Licet planta hæc pervulgaris ſit, tamen ejus Deſcriptionem accuratiorem dare volui; ut ad præparationem EXTRACTI

CONII (CICUTÆ Clar. *Stœrckii*) vera ac genuina Planta, his notis ab aliis facillime diſtinguenda, non falſa, ut ſæpe fieri ſolet, adhibeatur. Hujus *Extracti* rite præparati præſtautiam, in plurimis morbis difficillimis, imprimis in *Cancro exulcerato* expertus ſum. Inter alios, Ruſticus quidam incola Herborn-Seelbacenſis *Joannes Jacobus Græſe*, qui peſſimo cancro exulcerato, per plures annos in parte oris ſiniſtra laboraverat, Anno 1769 ad me venit. Exulceratio cancroſa in labio ſuperiore, inferiore, & gena, adeo ſe extendebat, ut dentes inciſores canini & molares, maxillaque gingiva eroſa denudata, viſui borribili adſpectu paterent; ichore fœtidiſſimo manante. Solo hujus Plantæ Extracto puro craſſius inſpiſſato, abſque foliorum pulvere admixto, paucisque intermixtis evacuantibus rhabarbarinis, ſpatio quinque menſium, borribilem iſtum Cancrum feliciſſime exſtirpavi; ita quidem, ut os priſtinam formam exacte recipeset, barbaque novæ partes tegerentur. Et quod mirandum erat: una hoc remedio, Ulcus antiquum ſinuoſum manans, in colli ſiniſtra parte, quo bic vir per viginti annos affectus fuerat, ſe conſolidavit, & penitus evanuit. Adhuc dum ſcribo (1774) in vivis eſt, & incorrupta fruitur valetudine.

Remedium certe innocuum tutiſſimumque. Continuata & ſenſim augenda doſi, audaci non timida manu porrigendum. Doſin a granis quinque, uſque ad drachmas duas & ultra, bis de die, auxi. Etiam ægroti ſenſibiliores, a nimie hujus Extracti aucta doſi, nihil aliud ab initio ſentiebant, quam leniſſimas tenſiones ſpaſticas fugaces in artubus; aliqne ſæpe ſcintillulas igneas, per aëra ante oculos ſeſe moventes obſervarunt, abſque ullo alio damno ſubſequente.

BUNIUM *G. P.* 335.

Cor. uniformis. *Umbella* conferta. *Fructus* ovati. *S. N.* 206.

199. BUNIUM, *Bulbocaſtanum. Linn. Spec.* 349. [*Bulbocaſtanum- Hall.* 783.]

H. inter ſegetes *bey dem Kalkofen*; in agris *hinter dem Homberg* copioſe; *am Galgenberg* frequens. Floret Julio.

BUPLEURUM. *G. P.* 328.

Involucra umbellulæ majora, pentaphylla. *Petala* involuta. *Fructus* ſubrotundus, compreſſus, ſtriatus. *S. N.* 203.

200. BUPLEURUM, *rotundifolium*, involucris univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. *Linn. Spec.* 340. [*Hall.* 767.]

H. in cultis *auf dem Hinterſand* rarius; in hortis variis *vor dem untern Thor* frequens. Floret Junio, Julio.
Pharm. PERFOLIATÆ Herba, Semina.

SIUM. *G. P.* 348.

Fructus ſubovatus, ſtriatus. *Involucrum* polyphyllum. *Petala* cordata. *S. N.* 211.

201. SIUM, *latifolium*, foliis pinnatis, umbella terminali. *Linn. Spec.* 361. [*Hall.* 777.]

H. in foſſis & rivulis pratorum *im Pulversgrund*, *am Bellſtein* rarius. Floret Julio.

202. SIUM, *anguſtifolium*, foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucro univerſali pinnatifido. *Linn. S. N.* 211. *Spec.* 1672.

H. in rivulis pratorum *im Fiſchweyhergrund.* Floret Auguſto. Foliolorum *paria inferiora, a ſequentibus remotiſſima, pinnis utrinque auriculatis, fere haſtatis.* Folia *caulina, pinnis anguſtioribus, ſubauriculatis, ſerratis: ſerraturis latiuſculis, acuminatiſſimis.* Umbellæ *oppoſitifoliæ, pedunculatæ.* Involucr. *univerſale* 5-7-*phyllum, inæquale: foliolis pleriſque pinnatifidis, unico ſemper reliquis longiore.* Iuvolucella *ſimillima, etiam pinnatifida.*

203. SIUM, *nodiflorum*, foliis pinnatis, umbellis axillaribus ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 361. [*Hall.* 778.]

H. cum præcedente rarius *im Guldnersgrund.* Floret Julio, Auguſto. +

SELINUM. *G. P.* 337.

Fructus ovali-oblongus, compreſſo-planus, in medio ſtriatus. *Involucrum* reflexum. *Petala* cordata, æqualia. *S. N.* 207.

204. SELINUM, *Carvifolia*, caule ſulcato acutangulo, iuvolucro univerſali caduco, piſtillis fructus reflexis. *Linn. Spec.* 350. [*Hall.* 802.]

H. in pratis humidiuſculis, *im Fiſchweyhergrund* rarius; circa pagum *Sinn* copioſe. Floret Julio.

Radix *perennis*, *fuſiformis*, *ſuperne ramoſa*, *odorata*. Caulis 2- ſ. 3-*pedalis*, *ſubramoſus*, *erectus*, *ſtrictus*, 10-*ſulcatus*; *angulis membranaceis*, *ad ramiſicationes*, *præſertim ſub Umbella*, *undulato-flexuoſis*. Folia *erecta*, *anguſtata*, *triplicato-pinnata*: Petiolis *ſubtetragonis*, *ſupra ſulco exaratis*, *baſi membranateis*, *nervoſis*; Foliolis *oppoſitis*, *bi ſ. trilobis*: *lobis lanceolato-acuminatis*, *mucrone albido cartilagineo*. Umbella *plana*, *æqualis*, *maturo fructu convexa*: Radiis *numeroſis*, *ſulco ſuperne exaratis*. Involucrum *in virgineis Umbellis* (*loco natali*) *polyphyllum*, *in florentibus monophyllum*. Foliolis *lanceolato-ſubulatis*, *unico excepto*, *mox deciduis*. Involucella *polyphylla*, *patentia*: *foliolis ſubulatis*. Flores *ante explicationem purpuraſcentes*, *dein albi*, *extimi paulo majores*. Calyx *nullus*. Petala *ſubæqualia*, *inflexo-cordata*, *erectiuſcula*. Stamina *Corolla duplo longiora*. Styli *erecti*, *breves*, *demum longiores*, *reflexi*, *perſiſtentes*. Fructus *ovalis*, *compreſſus*: *apice purpureo*, *Styliſque reflexis coronatus*. Semina *matura lateribus a ſe invicem diſcedentia hiant*, *nervis dorſalibus tribus*, *eminentibus*, *notata*.

ANGELICA. *G. P.* 347.

Fructus ſubrotundus, angulatus, ſolidus, ſtylis reflexis. *Corollæ* æquales: petalis incurvis. *S. N.* 211.

205. ANGELICA, *Archangelica*, foliorum impari lobato. *Linn. Spec.* 360. [*Hall.* 807.]

H. ad ſepes interhortenſes *am Pitzbrückgen* frequens; quaſi indigena valde luxurians. Floret Julio.

Pharm. ANGELICÆ SATIVÆ Radix.

206. ANGELICA, *ſylveſtris*, foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Linn. Spec.* 361. [*Hall.* 806.]

H. in foſſis, & pratis humidiuſculis frequens. Floret Julio.

Pharm. ANGELICÆ SYLVESTRIS Radix.

b. *Involucris partialibus*; Univerſali nullo.

AETHUSA. *G. P.* 355.

Involucella dimidiata, 3-phylla, pendula. *Fructus* ſtriatus. *S. N.* 213.

207. AETHUSA, *Cynapium*. *Linn. Spec.* 367. [*Hall.* 765.]

H. in cultis inter olera frequens. Floret æſtate. Involucella *ſæpe* 5-*phylla*.

SCANDIX. *G. P.* 357.

Cor. radiata. *Fructus* ſubulatus. *Petala* emarginata. *Floſculi* diſci ſæpe maſculi. *S. N.* 213.

208. SCANDIX, *odorata*, ſeminibus ſulcatis angulatis. *Linn. Spec.* 368. [*Myrrhis. Hall.* 753.]
H. in pomariis *am Homberg unter der Lithau*, alibique frequens. Floret Majo, Junio.

209. SCANDIX, *Pecten veneris*, ſeminibus roſtro longiſſimo. *Linn. S. N.* 213. *Spec.* 368. [*Myrrhis. Hall.* 754.]
H. inter ſegetes *auf dem Dollberg* frequens. Floret Junio.
Involucella *apice bifida*. Semen *nucleum condens*, *uti in præcedente*. *Roſtrum ſcabrum*.

210. SCANDIX, *Cerefolium*, ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. *Linn. Spec.* 368. [*Cerefolium. Hall.* 747.]
H. in cultis, ruderatis, & ad ſepes frequens. Floret Majo & ſequ.
Pharm. CEREFOLII Herba.

211. SCANDIX, *Anthriſcus*, ſeminibus ovatis hiſpidis, corollis uniformibus, caule lævi. *Linn. Spec.* 368. [*Caucalis. Hall.* 743.]
H. in arvis inter ſegetes, *am Galgenberg*; olim lecta, nunc rariſſima planta. Floret Julio.
Invol. univerſale *ſæpe monophyllum*. Involucella 5-*phylla*: *foliolis lanceolatis*, *mucronatis*, *ciliatis*. Fructus *ſingulæ umbellulæ* 5, *rarius* 6, *ovati*, *hiſpidi*, *bicornes*.

CHÆROPHYLLUM. *G. P.* 358.

Involucrum reflexum, concavum. *Petala* inflexo-cordata. *Fructus* oblongus, lævis. *S. N.* 214.

212. CHÆROPHYLLUM, *ſylveſtre*, caule lævi ſtriato, geniculis tumidiuſculis. *Linn. Spec.* 369. [*Cerefolium. Hall.* 748.]
H. in pratis, pomariis, ad ſepes, ubique vulgaris. Floret Majo, Junio.
Pharm. CICUTARIÆ Herba.

213. CHAEROPHYLLUM, *bulboſum*, caule geniculis tumido, baſi hirto. *Linn. S. N.* 214. *Spec.* 370. [*Myrrhis. Hall.* 752.]
H. in ſylvis, *in der Hörre* frequens. Floret Julio.

214. CHAEROPHYLLUM, *temulum*, caule ſcabro: geniculis tumidis. *Linn. Spec.* 370. [*Myrrhis. Hall.* 750.]
H. ad ſepes paſſim. Floret Junio, Julio.
Floſculi *diſci abortientes, centrali excepto, qui ſæpe fertilis.*

215. CHAEROPHYLLUM, *hirſutum*, caule æquali, foliolis inciſis acutis, fructibus biariſtatis. *Linn. S. N.* 214. *Spec.* 371. [*Myrrhis. Hall.* 751.]
H. in ſylvaticis montoſis circa *Langenaubach* infrequens. Floret Junio, Julio.

PHELLANDRIUM. *G. P.* 353.

Floſculi diſci minores. *Fructus* ovatus, lævis, coronatus perianthio & piſtillo. *S. N.* 213.

216. PHELLANDRIUM, *aquaticum*, foliorum ramificationibus divaricatis. *Linn. Spec.* 366. [*Hall.* 757.]
H. in foſſis Urbis *am Judenweyher.* Floret Junio, Julio.
Calycis *laciniæ* 2 *exteriores, reliquis duplo longiores.*
c. Involucro nullo; nec univerſali, nec partialibus.

CARUM. *G. P.* 365.

Fructus ovato-oblongus, ſtriatus. *Involucrum* 1-phyllum. *Petala* carinata, inflexo-emarginata *S. N.* 216.

217. CARUM, *Carvi. Linn. Spec.* 378. [*Hall.* 789.]
H. in pratis paſſim; *auf der Sandwieſe* copioſe. Floret Majo, Junio.
Pharm. CARVI Semina.

PASTINACA. *G. P.* 362.

Fructus ellipticus, compreſſo-planus. *Petala* involuta, integra. *S. N.* 216.

218. PASTINACA, *ſativa*, foliis ſimpliciter pinnatis. *Linn. Spec.* 376. [*Hall.* 808.]
H. in cultis *auf dem Hinterſand,* & alibi frequens. Floret Julio.
Pharm. PASTINACÆ Radix, Semina.

ANETHUM. *G. P.* 364.

Fructus ſubovatus, compreſſus, ſtriatus. *Petala* involuta, integra. *S. N.* 216.

219. ANETHUM, *graveolens*, fructibus compreſſis. *Linn. Spec.* 377.
H. in cultis, inter olera frequens. Floret Julio.
Pharm. ANETHI Herba, Semina.

220. ANETHUM, *Fœniculum*, fructibus ovatis. *Linn. Spec.* 377. [*Fœniculum. Hall.* 760.]
H. in cultis oleraceis *bey dem dicken Thurm; vor dem Sand-Thor* parcius. Floret Julio.
Pharm. FŒNICULI Radix, Herba, Semina.

ÆGOPODIUM. *G. P.* 368.

Fructus ovato-oblongus, ſtriatus. *S. N.* 217.

221. AEGOPODIUM, *Podagraria*, foliis caulinis ſummis ternatis. *Linn. Spec.* 379. [*Podagraria. Hall.* 759.]
H. ad ſepes paſſim. Floret Julio.

APIUM. *G. P.* 367.

Fructus ovatus, ſtriatus. *Involucr.* 1-phyllum. *Petala* æqualia. *S. N.* 217.

222. APIUM, *Petroſelinum*, foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Linn. Spec.* 379.
H. in cultis *am Steghaus; auf dem Hinterſand*; alibique infrequens. Floret Julio.
Pharm. PETROSELINI Radix, Herba, Semina.

223. APIUM, *graveolens*, foliis caulinis cuneiformibus. *Linn. Spec.* 379. [*Hall.* 784.]
H. in foſſis, *an der Mühlbach, unter der Walkmühle* rarius. Floret Julio.
Pharm. APII Radix, Semina.

PIMPINELLA. *G. P.* 366.

Fructus ovato oblongus. *Petala* inflexa. *Stigmata* ſubgloboſa. *S. N.* 217.

224. PIMPINELLA, *ſaxifraga*, foliis pinnatis, foliolis radicalibus ſubrotundis; ſummis linearibus. *Linn. Spec.* 378.

Minor, α. Pimpinella ſaxifraga minor. *Bauh. Pin.* 160. (*Tragoſelinum Hall.* 786.)
Major, β. Pimpinella ſaxifraga major, umbella candida. *Bauh. Pin.* 159. (*Hall.* 785.)
H. α. in pratis & paſcuis ſiccis *auf der Sandwieſe*; β. Foliis *triplo majoribus*, in pratis *bey Sinn* copioſe. Floret Julio.
Pharm. Pimpinellæ albæ Radix.

225. Pimpinella, *hircina*, foliis duplicato-pinnatis, pinnulis profundiſſime lobatis. [*Tragoſelinum. Hall.* 787.]
Pimpinella *ſaxifraga*, *hircina var. ε. Linn. Spec.* 378.
H. in collibus ſiccis paſſim. Floret Junio & ſeq.

C. *TRIGYNIA.*

* *Flores ſuperi.*

VIBURNUM. *G. P.* 370.

Cal. 5-partitus, ſuperus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 1-ſperma. *S. N.* 218.

226. Viburnum, *Lantana*, foliis cordatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis. *Linn. Spec.* 384. [*Hall.* 669.]
H. in dumetis & ad ſepes *am Galgenberg*, verſus *Burgk* frequens. Floret Junio.

227. Viburnum, *Opulus*, foliis lobatis, petiolis glandulofis. *Linn. Spec.* 384. [*Opulus. Hall.* 668.]
H. ad ſepes & ripas *Dillæ*, *auf der Wetsgarber Wieſe*; & alibi vulgaris. Floret Junio.

SAMBUCUS. *G. P.* 372.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 3-ſperma. *S. N.* 219.

228. Sambucus, *Ebulus*, cymis tripartitis, ſtipulis foliaceis, caule herbaceo. *Linn. S. N.* 219. *Spec.* 385. [*Hall.* 671.]
H. in nemoroſis ad pagum *Erbach* & *Sinn*. Floret Junio.
Pharm. Ebuli Radix, Baccæ, Semina.
Corolla *ſubpurpurea: Laciniæ concavæ, ovatæ, acutæ, apicibus incurvis.* Antheræ *oblongæ*. Semina *receptaculo columnari affixa.*

229. Sam-

229. SAMBUCUS, *nigra*, cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Linn. Spec.* 385. [*Hall.* 670.]
H. ad ſepes paſſim. Floret Junio.
Pharm. SAMBUCI Flores, Baccæ.
Corolla *alba*: *Laciniæ convexæ*, *obtuſiſſimæ*.

230. SAMBUCUS, *racemoſa*, racemis compoſitis ovatis, caule arboreo. *Linn. Spec.* 386. [*Hall.* 672.]
H. in nemoroſis *bey den Steinkammern* circa *Erbach* frequens. Floret Martio, Aprili.
Corolla *exigua*, *viridis*. *Laciniæ concavæ*. Baccæ *rubræ*.

** *Flores inferi.*

STAPHYLEA. *G. P.* 374.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* inflatæ, connatæ. *Sem.* 2, globoſa cum cicatrice. *S. N.* 219.

231. STAPHYLEA, *pinnata*, foliis pinnatis. *Linn. Spec.* 386. [*Hall.* 831.]
H. in ſylvaticis montoſis *auf der Schindgrube*; ad ſepes *am Homberg* rarius. Floret Majo, Junio.
Styli *duo*, *ſæpius tres*. Capſula *trilocularis*. Semina *conſtanter duo in majoribus loculamentis*, *tertio abortiente*.

ALSINE. *G. P.* 380.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, æqualia. *Capſ.* 1-locularis, 3-valvis. *S. N.* 221.

232. ALSINE, *media*, petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Linn. Spec.* 389. [*Hall.* 880.]
H. in cultis & agris copioſiſſime. Floret tota fere æſtate.

D. TETRAGYNIA.

PARNASSIA. *G. P.* 384.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Nectaria* 5, cordata, ciliata apicibus globoſis. *Capſ.* 4-valvis. *S. N.* 221.

233. PARNASSIA, *paluſtris*. *Linn. Spec.* 391. [*Hall.* 832.]
H. in pratis humidis, ad pagos *Enderoth*, *Emmerichenhayn*, & *Erbach* frequens. Floret Auguſto.

E. PENTAGYNIA.

LINUM. G. P. 389.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* 5-valvis, 10-locularis. *Sem.* ſolitaria. *S. N.* 223.

234. LINUM, *uſitatiſſimum*, calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario. *Linn. Spec.* 397. [*Hall.* 836.]
H. in arvis *auf dem Schteſsplatz; am Homberg; Dollberg;* infrequens. Floret Julio.
Pharm. LINI Semina.

235. LINUM, *catharticum*, foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Linn. Spec.* 401. [*Hall.* 839.]
H. in pratis ſiccis paſſim. Floret Junio, Julio.
Pharm. LINI CATHARTICI Herba.
Filamenta *baſi connata, germen veſtientia; interjectis denticulis alternis, exiguis, acutis.* (*Geranii.*)

236. LINUM, *Radiola*, foliis oppoſitis, caule dichotomo; floribus tetrandris tetragynis. *Linn. Spec.* 402. [*Hall.* 840.]
H. in arenoſis humidis, circa *Langenaubach; ipſe nondum legi.* Floret æſtate. +

DROSERA. G. P. 391.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Capſ.* 1-locularis: apice 5-valvis. *Sem.* plurima. *S. N.* 225.

237. DROSERA, *rotundifolia*, ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Linn. Spec.* 402. [*Rorella. Hall.* 834.]
H. in pratis udis, circa *Mademühlen; Hohenroth.* Floret Julio.
Pharm. RORELLÆ ſ. RORIS SOLIS Herba.

238. DROSERA, *longifolia*, ſcapis radicatis, foliis oblongis. *Linn. Spec.* 403. [*Rorella Hall.* 833.]
H. cum præcedente rarius, cujus forte varietas eſt. Floret Julio.

F. *POLYGYNIA.*

MYOSURUS. *G. P.* 394.

Cal. 5-phyllus, baſi adnatus. *Nectaria* 5, ſubulata, petaliformia. *Sem.* numeroſa. *S. N.* 227.

239. MYOSURUS, *minimus.* *Linn. Spec.* 407. [*Hall.* 1159.]

H. in agris arenoſis *am Dollberg*; in cultis *in der untern Pitze* frequens. Floret Majo.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

A. *MONOGYNIA.*

* *Flores calyculati, calyce corollaque inſtructi.*

BERBERIS. *G. P.* 442.

Cal. 6-phyllus. *Petala* 6: ad ungues glandulis 2. *Stylus* 0. *Bacca* 2-ſperma. *S. N.* 252.

240. BERBERIS, *vulgaris*, pedunculis racemoſis. *Linn. Spec.* 471. [*Hall.* 828.]

H. ad ſepes *hinter dem Schloſs* rarius; ad pagos *Fleisbach* & *Greiffenſtein* frequens. Floret Junio.

Pharm. BERBERIDIS Fructus.

** *Flores ſpathacei ſ. glumacei.*

LEUCOJUM. *G. P.* 402.

Cor. campaniformis, 6-partita, apicibus incraſſata. *Stigma* ſimplex. *S. N.* 234.

241. LEUCOJUM, *vernum*, ſpatha uniflora, ſtylo clavato. *Linn. Spec.* 414. [*Galanthus. Hall.* 1253.]

H. in pratis *an der Dille*, *unter dem Steghauſs*; in nemoroſis ad *Erbach*; *im Thiergarten* copioſe. Floret Martio.

NARCISSUS. *G. P.* 403.

Petala 6: *Nectario* infundibuliformi, 1-phyllo. *Stam.* intra nectarium. *S. N.* 234.

242. Narcissus, *poëticus*, ſpatha uniflora, nectario rotato breviſſimo ſcarioſo crenulato. *Linn. Spec.* 414. [*Hall.* 1250.]

H. in pomariis & pratis *am Steghauſe* rarius. Floret Majo.

243. Narcissus, *Pſeudo-Narciſſus*, ſpatha uniflora, nectario campanulato erecto criſpo æquante petala ovata. *Linn. Spec.* 414. [*Hall.* 1252.]

H. in pomariis & pratis *am Steghauſe* copioſe. Floret Martio.

ALLIUM. *G. P.* 409.

Cor. 6-partita, patens. *Spatha* multiflora. *Umbella* congeſta. *Capſ.* ſupera. *S. N.* 237.

244. Allium, *carinatum*, caule planifolio bulbifero, ſtaminibus ſubulatis. *Linn. Spec.* 426. [*Hall.* 1224.]

H. in ſylvaticis montoſis *am geiſtlichen Berg.* Floret Julio.

245. Allium, *vineale*, caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus tricuſpidatis. *Linn. Spec.* 428. [*Hall.* 1221.]

H. in ſylvaticis montoſis *bey dem Eulenhauſe.* Floret Julio.

246. Allium, *oleraceum*, caule teretifolio bulbifero, foliis ſcabris ſemiteretibus ſubtus ſulcatis, ſtaminibus ſimplicibus. *Linn. Spec.* 429. [*Hall.* 1223.]

H. in pomariis & pratis ſiccis paſſim. Floret Julio.

*** *Flores nudi.*

CONVALLARIA. *G. P.* 425.

Cor. 6-fida. *Bacca* maculoſa. 3-locularis. *S. N.* 246.

247. Convallaria, *majalis*, ſcapo nudo. *Linn. Spec.* 451. [*Polygonatum Hall.* 1241.]

H. in montoſis *auf der Steinſette; in der Callenbach*; in pratis ſylvaticis *bey Langenaubach*; alibique frequens. Floret Majo. *Pharm.* Lilii convallii Flores.

248. Convallaria, *verticillata*, foliis verticillatis. *Linn. Spec.* 451. [*Hall.* 1244.]

H. in ſylvaticis montoſis *im Hirſchberg, auf dem Weſterwald circa Willingen.* Floret Junio.

249. CONVALLARIA, *Polygonatum*, foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris. *Linn. Spec.* 451. [*Hall.* 1242.]
H. in ſylvis; *im Hirſchberg* frequens. Floret Majo.
Pharm. SIGILLI SALOMONIS Radix.

250. CONVALLARIA, *multiflora*, foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Linn. Spec.* 452. [*Hall.* 1243.]
H. in ſylvis, *in der Hörre*; *im Hirſchberg* & *Thiergarten* frequens; in dumetis *am Homberg* parcius. Floret Majo.

251. CONVALLARIA, *bifolia*, foliis cordatis, floribus tetrandris. *Linn. S. N.* 247. *Spec.* 452. [*Unifolium. Hall.* 1240.]
H. in pratis ſylvaticis aſperis, *im Hirſchberg*, *in der Hörre*, vulgaris. Floret Majo, Junio.
Pedicelli *gemini*. Corolla 4-*partita*. Stamina *quatuor*. Stigma *bifidum*. Bacca *bilocularis*, *diſperma*.

ANTHERICUM. *G. P.* 422.

Cor. 6-petala, patens. *Capſ.* ovata. *S. N.* 244.

252. ANTHERICUM, *Liliago*, foliis planis, ſcapo ſimpliciſſimo, corollis planis, piſtillo declinato. *Linn. Spec.* 445. [*Phalangium Hall.* 1207.]
H. in montoſis ſylvaticis *im Beilſtein* frequens. Floret Junio.

ORNITHOGALUM. *G. P.* 418.

Cor. 6-petala, erecta, perſiſtens, ſupra medium patens. *Filamenta* alterna baſi dilatata. *S. N.* 242.

253. ORNITHOGALUM, *luteum*, ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. *Linn. Spec.* 439. [*Phalangium Hall.* 1213.]
H. in pratis & pomariis *unter der neuen Brücke*, alibique copioſe. Floret Martio, Aprili.

254. ORNITHOGALUM, *minimum*, ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis. *Linn. Spec.* 440. [*Hall.* 1214.]

H. in agris *in der Aue; am Dollberg* parcius. Floret Aprili. Scapo *ſubtereti*, *Umbella breviore*, Involucri *Foliis pluribus, longioribus*; Pedunculis *teretibus*, *ſubramoſis*, *pubeſcentibus*; Corollæ petalis 6-8 9, *aurea flaveſcente nitentibus, patentiſſimis, acutioribus*; *tribus exterioribus obtuſioribus, ſubtus pubeſcentibus*; Piſtillo *ſubvilloſo, plerumque abortiente*; Bulbulis *congeſtis, axillaribus, bracteatis, quibus planta propagatur, a præcedente diſtinguitur.*

255. ORNITHOGALUM, *pyrenaicum*, racemo longiſſimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus æqualibus: fructiferis ſcapo approximatis. *Linn. Spec.* 440. [*Hall.* 1210.]

H. in pomariis *am Steghaus* rarius; dubia civis ex hortis aufuga. Floret Majo.

SCILLA. *G. P.* 419.

Cor. 6-petala, patens, decidua. *Filamenta* filiformia. *S. N.* 243.

256. SCILLA, *amoena*, floribus lateralibus alternis ſubnutantibus, ſcapo angulato. *Linn. S. N.* 243. *Spec.* 443. [*Phalangium. Hall.* 1211?]

H. in pomariis *am Steghauſe* rarius; planta exoticæ originis. Floret Majo.

ASPARAGUS. *G. P.* 424.

Cor. 6-partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. *Bacca* 3-locularis: 2-ſperma. *S. N.* 245.

257. ASPARAGUS, *officinalis*, caule herbaceo tereti erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus. *Linn. S. N.* 245. *Spec.* 448. [*Hall.* 1239.]

H. in pomariis *am Steghauſe*; ad muros pontis novi; alibique rarius. Floret Junio, Julio.

Pharm. ASPARAGI Radix, Semina.

Noſtra Planta culta & ſpontanea, ſemper eſt dioica. Maris Corolla *duplo major*; Stamina *perfecta*, Piſtillum *imperfectum, exiguum, abortiens*. Feminæ Corolla *apicibus omnibus erectis*; Stamina *caſtrata* ſ. Antheris *deſtituta*. Piſtillum *longitudine tubi corollæ*; Stigma *craſſiuſculum, trifidum.* Bacca *hexaſperma.*

LILIUM. *G. P.* 410.

Cor. 6-petala, campanulata: linea longitudinali nectarifera. *Capſ.* valvulis pilo cancellato connexis. *S. N.* 240.

258. Lilium, *Martagon*, foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn. Spec.* 435. [*Hall.* 1233.]

H. in dumetis *am beſten Georgenberg im Winkel in der Hecke*, in pomariis *am Sieghauſe* rarius. Floret Junio.

TULIPA. *G. P.* 415.

Cor. 6-petala, campanulata. *Stylus* o. *S. N.* 241.

259. Tulipa, *ſylveſtris*, flore ſubnutante, foliis lanceolatis. *Linn. Spec.* 438. [*Hall.* 1236.]

H. in pratis & pomariis *unter der neuen Brücke*, alibique copioſiſſime. Floret Majo.

Petala *omnia* apice, *tria interiora etiam* baſi *villoſa*.

**** *Flores incompleti.*

ACORUS. *G. P.* 434.

T. XIII. f. 12. *Spadix* cylindricus, tectus floſculis. *Cor.* 6-petalæ, (c. C. M.) nudæ. *Stylus* o. *Capſ.* (p). 3-locularis. (r). *S. N.* 249.

260. Acorus, *Calamus. Linn. Spec.* 462 [*Hall.* 1307.]

H. in foſſis *bey der obern Papiermühle*; *am ſteinern Waag* rarius. Floret Junio.

Pharm. Calami aromatici Radix.

JUNCUS. *G. P.* 437.

Cal. 6-phyllus. *Cor.* o. *Capſ.* 1-locularis. *S. N.* 250.

a. *Culmis nudis. Capſulis polyſpermis.*

261. Juncus, *conglomeratus*, culmo nudo ſtricto, capitulo laterali. *Linn. Spec.* 464. [*Hall.* 1312.]

H. in pratis uliginoſis, *hinter dem Homberg*; *in der Callenbach*; & alibi frequens. Floret Junio.

T. XIII. f. 1. Radix *horizontalis, denſa, oblique deſcendens; ſquamis veſtita ovatis, radicalibus fibris filiformibus, longiſſimis.* Culmi 1 - ſ. 2-*pedales, erecti, ſtricti, teretes, glabri, nudi; farcti medulla ſpongioſa;* Vaginis *ad baſin veſtiti ſtriatis, obtuſis, aphyllis, ariſtatis: ſuprema triplo longiore.* Folia *radicalia pauca, culmo ſimillima.* Capitulum *ſubrotundum, ſolitarium, rarius geminum, floribus glomeratis compoſitum, ex fiſſura culmi, marginibus dilatatis membranaceis, infra apicem rectum erumpens.* Pedunculi *breves, numeroſi, conferti, ſubdiviſi, uti in reliquis, ad baſin vaginula veſtiti, ſquamulaque lanceolato-acuminata bracteati.* Calicinæ ſquamæ *duæ exiguæ.* (a.) Cor. Petala *ſex, ovato-acuminata.* (c. C) Stamina *in hoc, ſæpius repetita floris anatome, conſtanter* tria, *nunquam ſex, reperire potui.* (C. M.) Capſula *longitudine petalorum, trigona, angulis acutis apice prominulis, ſtylo brevi terminata.* (p. P.) Semina *obverſe conica, acutiuſcula, albida.* (ſ. S.)

262. JUNCUS, *effuſus*, culmo nudo ſtricto: panicula laterali. *Linn. Spec.* 464. [*Hall.* 1311. var. β.1]

H. in foſſis paſſim; *in der Alczbach; an der Muhlbach, bey der untern Walkmuhle* frequens. Floret Julio.

T. XIII f. 2. Radix, Culmi, Folia radicalia & Pedunculi *præcedentis; at majora omnia.* Culmus *tripedalis, craſſior, tactu mollior, facile rumpendus, medulla denſa ad lampades aptiſſima farctus.* Panicula *lateralis, plus minusve ſparſa:* Pedunculis *confertis, inæqualibus, ramoſis, ſurſum deorſomque vergentibus;* Bracteis *oblongis ariſtatis.* Flores *ſubfuſci.* Petala *æqualia.* (A C) Capſula *obovata, ſubtrigona, obtuſiſſima, longitudine petalorum.* (p. P.) Semina *fulva.* (ſ. S.)

263 JUNCUS, *inflexus*, culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali. *Linn. Spec.* 464. [*Hall.* 1311. α.]

H. iisdem in locis cum præcedente, et alibi frequens. Floret Julio

T. XIII. f. 3. Squamis *Culmi baſin veſtientibus purpureis, nitidis;* Culmo *filiformi, longiore, tenuiore, firmiore, ſtriato, tenaciſſimo, minus recto, ſupra paniculam longius producto, apice emarcido, acutiore, incurvo, maturo fructu, inflexo;* Panicula *majori,* Pedunculis & Pedicellis *longioribus, ſtrictioribus, omnibus ſurſum nec deorſum vergentibus.* Floribus *ante explicationem exacte ſubulatis, cum* Calycibus & Bracteis *ſpadiceo-purpureis nitidis;* Petalis *longioribus, ſubulatis, interio-*

ribus tribus reliquis paulo brevioribus; (c.) & Capſula *Petalis breviore, acutiore,* (p. P.) *a præcedente facile dignoſci poteſt.*

264. Juncus, *filiformis*, culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali. *Linn. Spec.* 465. [*Hall.* 1313.]

T. XIII f. 4 Radix *obliqua, teres, ſquamata; fibris capillaribus.* Folia radicalia *pauca, filiformia, brevia, erecta.* Culmi *plures, ſesquipedales, infirmi, filiformes, compreſſi, ſtriati, ad baſin ſquamati; ad paniculam uſque erecti, ſupra paniculam duplo longiores, arcuatim deorſum flexi, apice acuto emarcido.* Panicula *ſimpliciſſima, pauciflora, ex fiſſura culmi, infra medium erumpens.* Pedunculi 5 ſ. 7, *ſimplices, uniflori, rarius biflori; foliolo lanceolato, ariſtato, ad baſin bracteati.* Calycis *foliola albida, ovata, acuminata, majora quam in præcedentibus.* (a.) Petala *ſubulata flavo viridia: tria interiora paulo breviora.* (c.) *Germen obtuſum, purpureum.* Capſulas *nondum vidi.*

b. *Culmis folioſis.*

265. Juncus, *articulatus*, foliis nodoſo-articulatis, petalis obtuſis. *Linn. Spec.* 465.

α. *aquaticus.* Juncus foliis compreſſis, articulatis, panicula ſemel ramoſa. *Hall.* 1322.

β. ——— Gramen junceum, folio articuloſo, cum utriculis. *Scheuchz. Agr.* 333.

γ. *ſylvaticus.* Juncus foliis teretibus articulatis, panicula repetito-ramoſa. *Hall* 1323.

H α. in pratis uliginoſis paſſim; β. in pratis humentibus *am ſteinern Waag* rarius, γ. in pratis ſylvaticis udis *am Beilſtein; im Galdners- & Fiſchweyher-Grund.* Floret Julio & ſeq.

T. XIII. f. 6. α. Radix *horizontalis, lignoſa, teres, fibroſa.* Folia radicalia *ultrapedalia, compreſſo-teretia, glabra, fiſtuloſa, interne iſthmis intercepta,* (1) *exſiccatione nodoſo-articulata.* (2) Culmus 2-ſ. 3-*pedalis, erectus, teres, glaber, foliatus; geniculis* 4 ſ. 5, *vaginis occultatis, interceptus.* Folia culmea *bifaria, alterna, patentia, recta, radicalibus ſimillima:* Vaginis *longis, ſubcompreſſis, glabris, culmum ultra medium veſtientibus; inferioribus aphyllis, obtuſis, ariſtatis.* Panicula *terminalis.* Pedunculi *pauci, alterni, erecti, inæquales, dichotomo-ramoſi: quorum inferior* Folio florali *ſubulato, erecto, longitudine fere Paniculæ inſtructus; reliqui ſquamis lanceolato-acuminatis, bracteati.* Flores *ſubcapitati, congeſti, exigui, axillares, terminalesque.* Calycina *duo fo-*

liola ovato-acuminata, membranacea. Petala *ſubulata, acuta, ſubfuſca, dein ſubpurpurea.* Capſula *trigona, acuminata, purpuraſcens, petalis longior.* (p. P.)

Var. *β.* vivipara: Culmo *breviori*; Floribus *vel omnibus, vel paucis, in faſciculos foliorum viridi-purpureos excreſcentibus; rarius auctumno occurrit, in pratis inundatis.*

Var. *γ.* differt: Foliis *teretibus, Culmis altioribus*; Panicula *ramoſiore, ſupradecompoſita*; Capitulis *multifloris, majoribus.* Floribus *purpureis, nitidis.* Petalis *acutiſſimis, interioribus tribus paulo brevioribus; in reliquis vix differt.*

266. JUNCUS, *bulboſus*, foliis linearibus canaliculatis, capſulis obtuſis. *Linn. Spec.* 466. [*Hall.* 1318. & *ſorte var. minor.* 1320]

H. in paſcuis humentibus, ad vias paſſim; Var. junior *bey der obern Walkmühle;* major, *unter der neuen Brücke,* & alibi frequens. Floret Julio.

T. XIII. f. 7. Radix *denſa fibroſiſſima, horizontalis.* Culmus *ſpithameus ſeu pedalis, erectus, ſubfoliatus, glaber, compreſſus: uno latere convexo, altero planiore;* Geniculis *duobus interceptus: quorum inferius (rarius duo,) radici propius, vaginis tectum, alterum infra paniculam, nudum.* Folia *bifaria, linearia, canaliculata, glabra, ſubtus ſtriata, ſubvaginantia, culmo breviora:* Vaginis *ad culmi baſin congeſtis, compreſſis, carinatis, membrana tenuiſſimo, albida, apice prominula, utrinque auctis.*

Folia floralia *duo culmeis ſimillima, erecta: quorum inferius longitudine Corymbi, ſuperius brevius.* Panicula *erecta, inæqualis, maturo fructu corymboſa.* Pedunculi 3, f. 4, *ſubdiviſi; primario ſemper reliquis longiore:* Bracteis *lanceolato-ſetaceis.* Flores *ſolitarii, exigui, colorati; terminales ſæpius terni: intermedio axillari, ſeſſili.* Calycinæ ſquamæ *ovatæ, albidæ.* (A.) Cor. Petala *oblonga, obtuſiſſima, ſub floreſcentia erectiuſcula; interiora tria tenuiora, purpuraſcentia.* (c C.) *Stigmata ſupra Corollam longe prominentia.* (O.) Capſulæ *ſubglobofæ, fere ovales, fuſcæ, nitidæ, petalis longiores, ſtylo vix manifeſto terminatæ.* (p. P.) Semina *fulva, pellucida.* (f. S.)

267. JUNCUS, *bufonius*, culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 466. [*Hall.* 1319.]

β. Gramen nemoroſum calyculis paleaceis, ſpecies altera procerior. *Scheuchz. Agr.* 328.

H. α. locis inundatis, ad vias ubi aquæ pluviales ſtagnarunt, cum præcedente *bey der Walkmuhle* copioſiſſime; β. in ſylvaticis udis *im Stubers-* & *Fiſchweyher*-*Grund* frequens. Floret Junio & ſeq.

T. XIII f. 8. α. Radix *annua, fibroſa.* Culmi *ſpithamæi* ſ. *dodrantales, erecti, teretiuſculi, glabri, dichotomi.* Folia culmea *pauca, ſubvaginantia, linearia, carinata.* Bracteæ *lanceolato-ſetaceæ, inferiores foliiformes.* Flores *ſolitarii, ſeſſiles; unico ſemper in omnibus culmi diviſionibus axillari, reliquis verſus ramorum apicem diſpoſitis, unilateralibus, remotis.* Calycinæ ſquamæ *ovato-acuminatæ, albidæ.* (a.) Petala *lanceolato-ſubulata,* (c.) *acutiſſima;* (2) *tria interiora breviora.* (1. c.) Capſula *oblonga, ſubtrigona, obtuſiſſima, fuſca, nitida, petalis brevior,* (c p) *trivalvis.* (q.) Receptaculum *ſubulatum, tripartibile: Singulæ laciniæ* (y) Semina *utrinque adfiguntur numeroſa, fuſca.* (ſ. S)

Var β. differt. Culmo *bipedali, erectiuſculo, ſubdiffuſo, infirmiore, ad dichotomiam magis nodoſo,* Foliis *numeroſioribus, majoribus;* Floribus *ſæpe in faſciculos foliorum excreſcentibus;* Petalis *longioribus, ariſtatis.*

c. *Capſulis triſpermis.*

268. JUNCUS, *piloſus,* foliis planis piloſis, corymbo ramoſo. *Linn. Spec.* 468. *Var.* β. [*Hall.* 1325. & *forte* 1324?]

H. in ſylvis frequens; *am Homberg, Geiſtlichenberg,* alibique parcius. Floret Majo, Junio.

T. XIII. f. 10. Radix *denſa, fibroſa.* Culmi *pedales, erecti, teretes, ſubtrinodes, foliati.* Folia *vaginantia, lineari-lanceolata, nervoſa, lata, plana: duo* floralia *inæqualia, erecta, corymbo breviora; omnia marginibus, & imprimis* Ligulæ *loco, valde piloſa, apice calloſa.* Corymbus *umbelliformis:* Pedunculis 7-9, ſ. 11, *ſimplicibus, uni-ſeu bifloris, rarius bifidis, trifloris, baſi vaginatis, bracteatisque; primariis erectis, ſecundariis reflexis.* Flores *ſolitarii.* Calycinæ ſquamæ *duæ ovatæ, obtuſiſſimæ.* (a.) Cor. Petala *ovato-acuminata, æqualia, ſpadiceo-purpurea, margine albido, dein flaveſcente.* (c.) Capſula *ſubgloboſa, ſtylo terminata,* (p.) *unilocularis, trivalvis.* (r.) Semina *tria.* (ſ.)

269. JUNCUS, *niveus,* foliis planis ſubpiloſis, corymbis folio brevioribus, floribus faſciculatis. *Linn. Spec.* 468. [*Hall.* 1328.]

H. in ſylvaticis montoſis aſperis *im Beilſtein*; *am Homberg*; *am Callenbachsberg*, & alibi copioſe. Floret Junio.

T. XIII. f. 9. Radix *lignoſa*, *teres*, *obliqua*, *fibris cirrhoſis*, *fuſcis*. Folia radicalia *numeroſa*, *emarcida*, *culmo breviora*. Culmus 1-ſ. 2-*pedalis*, *erectus*, *teres*, *ſtriatus*, *foliatus*, 4-ſ. 5-*nodis*. Folia culmea *vaginantia*, *latiuſcula*, *nervoſa*, *longiſſime acuminata*, *marginibus & imprimis* Ligulæ *loco*, *valde piloſa*. Folia *duo* floralia, *minus piloſa*, *anguſtiora*, *corymbos arcuatim ſuperantia*, *ſæpe tantum adæquantia*. Pedunculi *numeroſi*, *alterni*, *longi*, *inæquales*, *apice in* Pedicellos *fere capillares diviſi & ſubdiviſi* Corymbi *ſubconvexi*, *erecti*, *demum nutantes*. Flores *faſciculati*, *ſolitarii & conferti*, *albidi*, *pulchre purpureo-maculati*, *nitidi*. Calycis Foliola *duo ovata*, *acuta*, *ſubciliata*. Corolla *calyce triplo major*: Petala *exteriora tria breviora*, *ovato-acuta*; *tria interiora* $\frac{1}{3}$ *longiora*, *latiora*, *tenuioraque*, *lanceolata*. (c. C.) Capſula *ovato-globoſa*, *acutiuſcula*, *triſperma*. (p. q. S.)

270. JUNCUS, *campeſtris*, foliis planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque. *Linn. Spec.* 468. [*Hall.* 1330.]

β. Juncoides montanum nemoroſum villoſum latifolium elatius, capitulis florum candidis & ſplendentibus. *Mich. Gen.* 42?

H. α. in paſcuis ſiccis ubique vulgaris. Floret Martio, Aprili: β. in montoſis ſylvaticis *hinter dem Homberg*. Floret Majo.

T. XIII. f. 5. Radix *lignoſa*, *nodoſa*, *fibroſa*, *vaginis emarcidis veſtita*, *oblique deſcendens*. Folia radicalia *lata*, *plana*, *undique piloſa*, *apice calloſa*. Culmus *ſpithamæus* ſ. *dodrantalis*, *erectus*, *teres*, *ſtriatus*, *ſubtrinodis*, *foliatus*. Vaginæ *ſtriatæ*, *nudæ*. Folia culmea *radicalibus breviora*, *conſimilia*, *marginibus inprimis* Ligulæ *loco*, *valde piloſa*. Folia *duo* floralia *alterna*, *piloſa*, *pedunculis breviora*. Spicæ 3. 4. ſ. 5, *ovatæ atro-ſpadiceæ*, *nitidæ*; *pauciores ſubſeſſiles*, *plures pedunculatæ*, *erectæ*, *demum pendulæ*, *ſubſecundæ*. Bracteæ *ovatæ*, *acuminatæ*, *membranaceæ*, *albidæ*. Flores *in ſingula Spica* 9-11-13, *conferti*. Calycinæ *ſquamæ duæ ovatæ*, *albidæ*. Petala *ſubæqualia*, *lanceolato-acuminata*, *atro-ſpadicea*, *margine flaveſcente*. (c.) Capſula *triſperma*. (p. q.)

Var. β. Folia *anguſtiora*, *longiora*, *minus piloſa*. Culmus *ultra-pedalis*. Pedunculi 7-9, *longiores*. Spicæ *oblongiores*, *tenuiores*, *albido-ferrugineæ*, *omnes pedunculatæ*. Flores *triplo minores*, *diſtinctiores*, *minus conferti*. Petala *acuminatiſſima*. *In reliquis convenit*.

B. *TRIGYNIA.*

COLCHICUM. *G. P.* 457.

Spatha. Cor. 6-partita: tubo radicato. *Capſulæ* tres, connexæ, inflatæ. *S. N.* 256.

271. COLCHICUM, *autumnale*, foliis planis lanceolatis erectis. *Linn. Spec.* 485. [*Hall.* 1255.]

H. in pratis humidiuſculis paſſim. Floret Auguſto & ſeq.

Pharm. COLCHICI Radix.

Tubus longiſſimus, trigonus, ex baſi bulbi ortus; inferne veſtitus: ſquamis vaginantibus, rudimenta trium foliorum futuri anni includentibus. Germen *extra radicem (nec intra) columnæ tereti affixum,* Styli *tenerrimi, flexuoſi.* Stigmata *incurva.*

TRIGLOCHIN. *G. P.* 453.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 3, calyciformia. *Stylus* o. *Capſ.* baſi dehiſcens. *S. N.* 256.

272. TRIGLOCHIN; *paluſtre*, capſulis trilocularibus ſublinearibus. *Linn. Spec.* 482. [*Hall.* 1308.]

H. in pratis diutius inundatis *am ſteinern Waag* abunde. Floret Junio, Julio.

T. XII. f. 5. Radix *biennis, bulboſa, vaginis emarcidis tunicata: baſi emittens fibras filiformes, ſimplices, flaveſcentes.* Folia *culmi baſin veſtientia, linearia, carinato-canaliculata, lævia, culmo breviora.* Vaginæ *ſubcompreſſæ, membrana tenuiſſima, albida, apice prominula, utrinque auctæ.* Culmus *dehinc nudus, dodrantalis, demum ultrapedalis, erectus, ſtrictus, ſubtrigonus, lævis.* Racemus *terminalis, ſubſpicatus.* Flores *exigui, erecti, alterni, breviſſime, demum longius pedunculati.* Bracteæ *nullæ.* Calycis *tria Foliola ovata, obtuſa: nervo medio craſſiore, viridi, ſupra medium deliqueſcente; marginibus albidis.* Corollæ petala *tria cum calyce alternantia, conſimilia, paulo minora, tenuiora, albida ſubpurpurea:* (c. C.) *Singulo Foliolo Calycino, & ſingulo petalo,* Stamen *unicum,* Filamento *breviſſimo affixum.* (M. c.) Germen *obovatum, ſupra corollam prominens.* Stigmata *tria, acuta, perſiſtentia; ſub floreſcentia ob plumulas numeroſas, reflexas; vix diſtinguenda.* (O.) Capſula *obverſe conica,* (p.) *trigona, apice tribus denticulis, (antea ſtigmatibus) coronata;* (p.) *baſi anguſtata tribus valvulis dehiſcens ſubu-*

latis; Receptaculo *lineari-trigono.* (V.) *Singula valvula latere interiore longitudinaliter dehiſcit,* (p. ſ.) Semen *demittens acuminatum.* (S.)

Gramine hoc pecora præ aliis delectantur.

RUMEX. *G. P.* 451.

Calyx 3-phyllus. *Petala* 3, conniventia. *Semen* unicum, triquetrum. *S. N.* 254.

a. *Hermaphroditi: valvulis granulo notatis.*

273. RUMEX, *Patientia*, floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordatis. *Linn. Spec.* 476.

H. ſpontanea quaſi in cultis *am Dollberg; am heiligen Floſs;* in pratis *am Sieghaus* infrequens. Floret Julio.

Pharm. PATIENTIÆ Herba.

274. RUMEX, *ſanguineus*, floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Linn. Spec.* 476.

H. iisdem in locis cum præcedente rarius. Floret Julio.

Pharm. LAPATHI SANGUINEI Radix, Semina.

275. RUMEX, *conglomeratus. Murray. Prodr. Stirp. Gœtt.* 52.

Lapathum petiolis lateſcentibus, foliis longe lanceolatis, floribus verticillatis verrucoſis. *Hall* 1590.

H. in foſſis *bey der Walkmühle, in der Altzbach;* alibique copioſe. Floret Julio.

Caulis 1-ſ. 2-*pedalis, erectus, ſulcatus.* Rami *diſtantes, erecto-patentes, ſubdiffuſi.* Folia *ovato-lanceolata, planiuſcula.* Verticilli *numeroſi, remoti: floribus exiguis, copioſiſſimis, glomeratis, reflexis.* Pedicelli *breves; infra articulationem craſſiores, purpurei.* Valvulæ *oblongæ, integerrimæ, omnes graniferæ. granulo purpureo ſ. fulvo inſtructæ.*

276. RUMEX, *criſpus*, floribus hermaphtoditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Linn. Spec.* 476. [*Hall.* 1589.]

H. in agris, ad vias, ubique pervulgaris. Floret Junio & ſeq.

277. RUMEX, *acutus*, floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Linn. Spec.* 478. [*Hall.* 1591.]

H. in foſſis, ad ripas *Dillæ am ſteinern Waag* rarius. Floret Julio.

Pharm. LAPATHI ACUTI Radix.

278. RUMEX, *obtuſifolius*, floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis. *Linn. Spec.* 478. [*Hall.* 1592.]

H. ad foſſas, ſecus vias ubique vulgaris. Floret Julio, Auguſto.

Valvulæ corollæ *integerrimæ*, Antheſi *peracta tantum dentatæ, triplo majores.*

b. *Hermaphroditi: valvulis granulo deſtitutis* ſ. *nudis.*

279. RUMEX, *aquaticus*, floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Linn. S. N.* 255. *Spec.* 479. [*Hall.* 1588.]

H. ad ripas *Dillæ am ſteinern Waag* rarius. Floret Junio, Julio. +

RUMEX, *ſcutatus*. *Linn. Spec.* 480. [*Hall.* 1594.]

Planta gallo-provincialis, quæ alias in hortis hoſpitatur; ſponte quaſi valde luxuriat; ad ſepes in graminoſis *am heiligen Floſs*. Floret Junio.

c. *Floribus diclinis.*

280. RUMEX, *Acetoſa*, floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. *Linn. Spec.* 481. [*Hall.* 1597.]

H. in pratis & pomariis paſſim. Floret Junio.

Pharm. ACETOSÆ Radix, Herba.

Maris Calyx *patens*, Feminæ *reflexus.*

281. RUMEX, *Acetoſella*, floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis. *Linn. Spec.* 481. [*Hall.* 1596.]

H. in collibus ſiccis apricis paſſim; *am Homberg & Dollberg* copioſe. Foliis non baſtatis ludit. Floret Majo & ſeq.

C. *POLYGYNIA.*

ALISMA. *G. P.* 460.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 3. *Semina* plura. *S. N.* 257.

282. ALISMA, *Plantago aquatica*, foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis. *Linn. Spec.* 486. [*Damaſonium Hall.* 1184.]

H. in foſſis ſtagnis & rivulis paſſim. Floret Julio, Auguſto.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

ÆSCULUS. *G. P.* 462.

Cal. 1-phyllus, 5-dentatus, ventricoſus. *Cor.* 5-petala, inæqualiter colorata, calyci inſerta. *Capſ.* 3-locularis. *S. N.* 259.

283. ÆSCULUS, *Hippo Caſtanum*, floribus heptandris. *Linn. Spec.* 488. [*Hippocaſtanum. Hall.* 1029. ***]

H. arbor procera intra urbem *am Löwen*; junior ad portam horti mei *am Steghäuſer Weg*. Floret Junio.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

A. *MONOGYNIA.*

* *Flores completi.*

EPILOBIUM. *G. P.* 471.

Cal. 4-fidus. *Petala* 4. *Capſ.* oblonga, infera. *Sem.* papposa. *S. N.* 264.

a. *Staminibus declinatis.*

284. EPILOBIUM, *anguſtifolium*, foliis ſparſis lineari-lanceolatis, floribus inæqualibus. *Linn. Spec.* 493. [*Hall.* 1000.]

H. in montoſis ſylvaticis *am Homberg*; ad verſuras *auf der Weisgärber- und Sandwieſe*; alibique frequens. Floret Julio.

b. *Stami-*

b. *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

285. EPILOBIUM, *hirſutum*, foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis decurrenti - amplexicaulibus. *Linn. Spec.* 494. [*Hall.* 995.]

β. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, parvo flore. *Bauh. Pin.* 245.
H. α, & β, ad ripas *Dillæ* & *ag der Mühlbach* abunde. Floret Julio, Auguſto.

286. EPILOBIUM, *montanum*, foliis oppoſitis ovatis dentatis. *Linn. Spec.* 494. [*Hall.* 996.]

H. in montoſis ad radices rupium *am Homberg* & *Dollberg* frequens. Floret Julio.

287. EPILOBIUM, *tetragonum*, foliis lanceolatis denticulatis: imis oppoſitis, caule tetragono. *Linn. Spec.* 494. [*Hall.* 997.]

H. ad foſſas paſſim, *an der Mühlbach* frequens. Floret Julio.

288. EPILOBIUM, *paluſtre*, foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Linn. Spec.* 495. [*Hall.* 998.]

H. in pratis humentibus juxta rivulos *im Güldnersgrund.* Floret Auguſto.
In hoc & præcedente Stigma *craſſiuſculum clavatum, apice ſubquadrifidum.*

OENOTHERA. *G. P.* 469.

Cal. 4-fidus. *Petala* 4. *Capſ.* cylindrica, infera. *Sem.* nuda. *S. N.* 263.

289. OENOTHERA, *biennis*, foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoſo. *Linn. S. N.* 263. *Spec.* 492. [*Hall.* 994.]

H. ad verſuras & margines agrorum *an der Weisgärber Wieſe* & alibi rarius. Floret Julio, Auguſto.

VACCINIUM. *G. P.* 483.

Cal. ſuperus. *Cor.* 1-petala. *Filamenta* receptaculo inſerta. *Bacca* 4-locularis, polyſperma. *S. N.* 267.

a. Foliis annotinis ſ. deciduis.

290. VACCINIUM, *Myrtillus*, pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis deciduis, caule angulato. *Linn. Spec.* 498. [*Hall.* 1020.]

H. unico in loco inter Juniperos *am Stützelberg* verſus *Ballersbach; im Ebersbacher- und Freyengrund* copioſiſſime. Floret Majo.

Calyx *integerrimus, orbiculatus.* Corolla *urceolata, apice* 4-ſ. 5-*fida.* Stam. 8. ſ. 10. Bacca 4-ſ. 5-*locularis.*

Pharm. MYRTILLI Baccæ.

b. Foliis ſemper virentibus.

291. VACCINIUM, *Vitis idæa*, racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Linn. Spec.* 500. [*Hall.* 1022.]

H. in ſylvaticis montoſis ad *Dietz*. Floret Majo. +

Pharm. VITIS IDÆÆ Rob. (Baccæ.)

292. VACCINIUM, *Oxycoccos*, foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis. *Linn. Spec.* 500. [*Hall.* 1023.]

H. in paludoſis inter Sphagnum paluſtre *im Ebersbacher- und Freyengrund.* Floret Majo, Junio.

Baccæ *rubræ; acidiſſimæ.*

ERICA *G. P.* 484.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 4-fida. *Filamenta* receptaculo inſerta. *Antheræ* bifidæ. *Capſ.* 4-locularis. *S. N.* 268.

293. ERICA, *vulgaris*, antheris bicornibus incluſis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppoſitis ſagittatis. *Linn. Spec.* 501. [*Hall.* 1012.]

β. Erica vulgaris glabra flore albo. *Tourneſ. inſt.* 602.

H. α. in ſteriliſſimis campis paſſim; β. verſus *Schönbach* & *Guſternhayn* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Singulus Pedunculus *unicum Foliolum ſagittatum pro* Bractea, *duo in medio oppoſita pro* Involucro, *& plura decuſſata ſibi invicem impoſita, pro* Calyculo *habet.*

Calycina foliola *lanceolata.* Corolla *ventricoſa ſemiquadrifida.* Antheræ *bifidæ, acutæ, interiore latere dehiſcentes; pone baſin ſquamis duabus lanceolato-acuminatis, piloſis, patente*

tibus, inſtructæ. Stylus *adſcendens*: Stigma *ſubquadratum, excavatum, in foveola ſigno cruciformi notatum; margine coronatum: quatuor ſphærulis (veris ſtigmatibus) ſtipitatis.* Capſula *cernua.*

** *Flores incompleti.*

DAPHNE. *G. P.* 485.

Cal. 0. *Cor.* 4-fida, corollacea, marceſcens, ſtamina includens. *Bacca* 1-ſperma. *S. N.* 271.

294. DAPHNE, *Mezereum*, floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Linn. Spec.* 509. [*Thymelæa. Hall.* 1024]

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg* parcius; ad *Erbach* alibique copioſe. Floret Martio & Aprili.

Pharm. LAUREOLÆ Cortex, COCCOGNIDII Semina.

B. *TRIGYNIA.*

POLYGONUM. *G. P.* 495.

Cal. 0. *Cor.* 5-partita, calycina. *Sem.* 1, angulatum. *S. N.* 275.

a. Biſtorta *ſpica unica.*

295. POLYGONUM, *Biſtorta*, caule ſimpliciſſimo monoſtachio, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Linn. Spec.* 516. [*Hall.* 1559.]

H. in pratis udis *in der Aue* & alibi copioſiſſime. Floret Majo, Junio.

Pharm. BISTORTÆ Radix.

b. Perſicariæ *piſtillo bifido, aut ſtamina minus* 8.

296. POLYGONUM, *amphibium*, floribus pentandris ſemidigynis, ſpica ovata. *Linn. S. N.* 275. *Spec.* 517. [*Hall.* 1565.].

α. *Aquatica* natans, foliis obtuſis glaberrimis, ſtaminibus corolla brevioribus.

β. *Terreſtris*, erecta, foliis acutiuſculis ſcabris, ſtaminibus corolla longioribus.

H. α. in foſſis & fluviis *in der Dille auf der Herrn-Wieſe*, alibique copioſe. Floret Junio, Julio.

β. in cultis *in der Pitze* & *vor dem Homberg*, peſſimum vitium rariſſime florens.

Stamina *in β. terreſtri, non ſemper corolla longiora.* Semen *ovatum, compreſſum.*

297. POLYGONUM, *Hydropiper*, floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis. *Linn. Spec.* 517. [*Hall.* 1554.]

H. ad foſſas ubique vulgaris, *an der Mühlbach* cum ſequente copioſe. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. PERSICARIÆ Herba.

Planta *primario gelu tacta rubeſcit.* Vaginæ *ſtipulares arctæ, truncatæ, nervoſæ, nervis parallelis in ſetas deſinentibus, ciliatæ.* Spicæ *graciles, longæ, nutantes, floſculis remotiuſculis, geminis, ſeu ternis, ex ſingula ſquama truncata vaginante.* Stamina *Corolla* ⅓ *breviora.* Semen *ſubtrigonum.*

298. POLYGONUM, *Perſicaria*, floribus hexandris digynis, ſpicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis. *Linn. Spec.* 518. [*Hall.* 1557.]

H. cum præcedente copioſe. Floret Julio, Auguſto.

Vaginæ *ſtipulares oblique truncatæ, laxæ, nervoſæ, nervis interruptis, inæqualibus, non prominentibus, ora pubeſcente vix ciliatæ.* Pedunculi *ſubdiviſi*, Bracteis *ovato-ſubulatis.* Spicæ *craſſiuſculæ*: Floribus *confertis, quaternis ex ſingula ſquama ovato-acuta, amplexante.* Stamina *longitudine Corollæ.* Semen *compreſſum, obtuſum.*

c. Polygonum *foliis indiviſis, floribus octandris.*

299. POLYGONUM, *aviculare*, floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Linn. Spec.* 519. [*Hall.* 1560.]

H. in viis, plateis, cultis, arvis & agris ubique. Floret æſtate.

Pharm. CENTUMNODIÆ ſ. POLYGONI Herba.

d. Helxine, *foliis ſubcordatis.*

300. POLYGONUM, *Fagopyrum*, foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis æqualibus. *Linn. Spec.* 522. [*Hall.* 1563.]

H. in cultis *auf dem Hinterſand*; inter ſegetes *am Galgenberg* frequens. Floret Julio.

Glandulæ 8 *cingunt Germinis baſin.* Filamenta 8, *longitudine Corollæ*: 4 *inter glandulas & germen*: 4 *inter glandulas & corollam.* Semen *nudum, vix baſi tectum.*

301. POLYGONUM, *Convolvulus*, foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtuſatis. *Linn. S. N.* 276. *Spec.* 522. [*Hall.* 1561.]

H. in agris arvis & cultis paſſim. Floret Julio, Auguſto. Corollæ *laciniæ tres exteriores carinatæ, obtuſiſſimæ, duæ interiores planiores, anguſtioreſque.* Stamina *corolla* ½ *breviora.* Antheræ *violaceæ.* Caulis *angulato-ſtriatus.*

302. POLYGONUM, *dumetorum*, foliis cordatis, caule volubili lævi, floribus carinato-alatis. *Linn. Spec.* 522. [*Hall.* 1562.]

H. in ſepibus & dumetis *vor dem Gebaude; bey der Walkmühle; auf der Sandwieſe* frequens. Floret Julio, Auguſto. Corollæ *tres laciniæ exteriores dorſo membrana undulata auctæ, duæ interiores nudæ.* Antheræ *albidæ.* Caulis *leviſſime ſtriatus.* *In hoc & præcedente* Stylus *unicus brevis.* Stigmata 3, *globoſa, approximata.*

C. *TETRAGYNIA.*

ADOXA. *G. P.* 501.

Cal. 2-fidus, inferus. *Cor.* 4. ſ. 5-fida, ſupera. *Bacca* 4. ſ. 5-locularis, calyce coalita. *S. N.* 278.

303. ADOXA. *Moſchatellina. Linn. Spec.* 527. [*Moſchatellina. Hall.* 1005.]

H. in umbroſis ad ſepes *bey der obern Walkmühle; auf dem Roſsler*; in nemoroſis *bey Erback* frequens. Floret Aprili, Majo.

Capitulum *quinque floribus compoſitum*: Flore *terminali quadrifido, octandro, tetragyno, Calyce bifido, lateralibus* 4, 5-*fidis, decandris, pentagynis, Calyce ſæpe trifido.* Bacca *globoſa, acutiuſcula, ſupra medium calyce cincta.* Semina *arillata, ſeu membrana carnoſa a pulpa Baccæ diſtincta, veſtita. Rariſſime* Fructus *reperiuntur, quoniam proprio pondere dependent, & foliis aliiſque plantis abſconduntur.*

PARIS. *G. P.* 500.

Cal. 4-phyllus. *Petala* 4, anguſtiora. *Bacca* 4-locularis. *S. N.* 278.

304. PARIS, *quadrifolia*. *Linn. Spec.* 527. [*Hall.* 1006.]
H. in ſylvis & nemoribus paſſim. Floret Majo.
Pharm. PARIDIS Radix, Herba, Baccæ.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

A. *MONOGYNIA.*

Flores polypetali æquales.

MONOTROPA. *G. P.* 536.

Cal. 0. *Petala* 10; horum 5 exteriora baſi excavato - mellifera. *Capſ.* 5 - valvis. *S. N.* 296.

305. MONOTROPA, *Hypopithys*, floribus lateralibus octandris: terminali decandro. *Linn. Spec.* 555. [*Hypopithys. Hall.* 1002.]
H. in ſylvis, radicum paraſitica imprimis Quercuum, *im Hirſchberg* frequens; *in Theriotropheo* parcius. Floret Julio, Auguſto.

PYROLA. *G. P.* 554.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 5-locularis, angulis dehiſcens. *S. N.* 301.

306. PYROLA, *rotundifolia*, ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. *Linn. Spec.* 567. [*Hall.* 1010.]
H. in ſylvis rarius, *im Hirſchberg* infrequens. Floret Junio. +
Pharm. PYROLÆ Herba.

307. PYROLA, *minor*, floribus racemoſis diſperſis, ſtaminibus piſtillisque rectis. *Linn. Spec.* 567. [*Hall.* 1009.]
H. in ſylvis *in der Hörre*; *im Hirſchberg* copioſe; *im Thiergarten & Beilſtein* rarius. Floret Junio, Julio.

308. PYROLA, *ſecunda*, racemo unilaterali. *Linn. Spec.* 567. [*Hall.* 1008.]
H. in ſylvis, *in der Hörre* verſus *Dreisbach* copioſe. Floret Julio.

309 PYROLA, *uniflora*, ſcapo unifloro. *Linn. Spec.* 568. [*Hall.* 1011.]
H. in ſylvis, *im Hirſchberg* rarius. Floret Junio, Julio. ♃

B. DIGYNIA.

SCLERANTHUS. *G. P.* 562.

Cal. 1-phyllus. *Cor.* o. *Sem.* 2, calyce incluſa. *S. N.* 306.

310. SCLERANTHUS, *annuus*, calycibus fructus patulis. *Linn. Spec.* 580. [*Hall.* 1551.]
H. in agris & arvis arenoſis *am Dollberg*; *hinter dem Schloſs*; *auf dem Homberg* frequens. Floret Julio, Auguſto.
Radice *annua*; Caulibus *longioribus*, *minus ramoſis*; Foliis *remotioribus*; Calycis *laciniis acutioribus*, *viridibus*, *vix albido-marginatis*; Staminibus 5 ſ. 7, *breviſſimis* & Calyce *fructus patulo*, *a ſequente diſtinguitur*.

311. SCLERANTHUS, *perennis*, calycibus fructus clauſis. *Linn. Spec.* 580. [*Hall.* 1550.]
H. in campis & arvis ſterilibus paſſim. Floret Majo & ſeq.
Calycis *laciniæ obtuſæ*, *albido-marginatæ*, *patentes fructu maturo conniventes*. *In hoc & in præcedente*, Semen *conſtanter unicum*, *oſſea capſula incluſum*, *nec duo*, *invenire potui*.

CHRYSOSPLENIUM. *G. P.* 558.

Cal. 4-ſ. 5-fidus, coloratus. *Cor.* o. *Capſ.* 2-roſtris, unilocularis, polyſperma. *S. N.* 303.

312. CHRYSOSPLENIUM, *alternifolium*, foliis alternis. *Linn. Spec.* 569. [*Hall.* 1548.]
H. in nemoroſis humidis ad *Breidſcheid*; *in den Steinkammern bey Erbach* copioſe; circa *Amdorf*, verſus Theriotropheum rarius. Floret Aprili, Majo.
Flores *etiam primarii in noſtrate planta plerumque quadrifidi*, *octandri*.

G 4

313. CHRYSOSPLENIUM, *oppoſitifolium*, foliis oppoſitis. *Linn. Spec.* 569. [*Hall.* 1549.]

H. in ſylvaticis udis *im Hirſchberg*, *in des Herrn Ort* ad *Gundersdorf* frequens. Floret Majo.

Caule *tenuiori, æquali-tetragono, lævi: lateralibus duobus oppoſitis latioribus planioribus, duobus anguſtioribus canaliculatis;* Foliis *omnibus oppoſitis, minoribus, ſubrotundis, obiter minusque profunde crenatis;* radicalibus *in florente planta fere nullis.* Petiolis *lævibus;* Floribus *paucioribus, diſtinctioribus, in noſtrate omnibus quadrifidis, octandris, foliisque multo minoribus bracteatis; a præcedente hæc* Species *notabiliter ſe diſtinguit.*

SAXIFRAGA. 559.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 2-roſtris, unilocularis, polyſperma. *S. N.* 303.

314. SAXIFRAGA, *granulata*, foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. *Linn. Spec.* 576. [*Hall.* 976.]

H. in pratis ſiccis *am Rehberg*; in collibus apricis *am Güldnersgrund; Stützelberg*; & alibi frequens. Floret Majo, Junio.

Pharm. SAXIFRAGÆ ALBÆ Semina. (Radicis granula.)

315. SAXIFRAGA, *tridactylites*, foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo. *Linn. Spec.* 578. [*Hall.* 986.]

H. in rupeſtribus *am Stützelberg* & *Rehberg*; ad muros *pomarii* & *cœmeterii* frequens. Floret Aprili, Majo.

GYPSOPHILA. *G. P.* 563.

Cal. 1-phyllus, campanulatus, angulatus. *Petala* 5, ovata, ſeſſilia. *Capſ.* globoſa, unilocularis. *S. N.* 306.

316. GYPSOPHILA, *muralis*, foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Linn. Spec.* 583. [*Saponaria. Hall.* 903.]

H. in agris *in der Aue*; in arvis *hinter dem Schloſs* parcius; in campis ſterilibus *auf dem Stützelberg* copioſe. Floret Auguſto.

SAPONARIA. *G. P.* 564.

Cal. 1-phyllus, nudus. *Petala* 5, unguiculata. *Capſula* oblonga, 1-locularis. *S. N.* 307.

317. SAPONARIA, *officinalis*, calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. Spec.* 584. [*Hall.* 908.]
H. ad ſepes & vias paſſim. Floret Junio, Julio.
Pharm. SAPONARIÆ Radix, Herba.

318. SAPONARIA, *Vaccaria*, calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 585. [*Hall.* 907.]
H. in arvis *auf dem Homberg* rarius. Floret Junio, Julio.

DIANTHUS. *G. P.* 565.

Cal. cylindricus, 1-phyllus: baſi ſquamis 4. *Petala* 5, unguiculata. *Capſ.* cylindrica, 1-locularis. *S. N.* 307.

319. DIANTHUS, *carthuſianorum*, floribus ſubaggregatis: ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubum ſubæquantibus, foliis trinerviis. *Linn. S. N.* 307. *Spec.* 586. [*Tunica. Hall.* 899.
H. in campis ſterilibus apricis *auf dem Stützelberg* frequens. Floret Julio.

320. DIANTHUS, *Armeria*, floribus aggregatis faſciculatis: ſquamis calycinis lanceolatis villoſis tubum æquantibus. *Linn. Spec.* 586. [*Hall.* 900.]
H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg & Fiſchweyhergrund*, alibique infrequens. Floret Julio, Auguſto.

321. DIANTHUS, *prolifer*, floribus aggregatis capitatis: ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus. *Linn. Spec.* 587. [*Hall.* 901.]
H. in campis ſterilibus & collibus apricis, *hinter dem Schloſs; am Dollberg* alibique frequens. Floret Julio, Auguſto.
b. *Flores ſolitarii, plures in eodem caule.*

322. DIANTHUS, *diminutus*, floribus ſolitariis: ſquamis calycinis octonis florem ſuperantibus. *Linn. Spec.* 587? [*Hall.* 901. *var.* γ. *præc.*]

H. io ſteriliſſimis campis *auf dem Callenbachsberg.* Floret Junio, Julio.

Caule *ramoſiori, minus erecto, floribus ſæpe ſolitariis, nec in capitulum congeſtis, a præcedente vix differt.*

323. DIANTHUS, *deltoides*, floribus ſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Linn. Spec.* 588.

H. in paſcuis ſiccis, *hinter dem Schloſs, am Homberg, Rehberg*, & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

C. *TRIGYNIA.*

ARENARIA. *G. P.* 569.

Cal. 5-phyllus, patens. *Petala* 5, integra. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma. *S. N.* 312.

324. ARENARIA, *trinervia*, foliis ovatis acutis petiolatis nervoſis. *Linn. Spec.* 605. [*Alſine. Hall* 878.]

H. in ſylvaticis umbroſis; ad ſepes in pomariis paſſim. Floret Junio & ſeq.

325. ARENARIA, *ſerpillifolia*, foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce brevioribus. *Linn. Spec.* 606. [*Hall.* 875.]

H. ad muros urbis & cœmeterii; in glareoſis aridis paſſim. Floret Majo & ſeq.

In hac & in præcedente Petala *calyce dimidio breviora;* Capſula *cernua pedunculo horizontali, uti in* Stellariis, *apice* 6- *(nec* 5-*) fartam dehiſcens.*

326. ARENARIA, *rubra*, foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus. *Linn. Spec.* 606. [*Hall.* 872.]

H. in arvis *am Rehberg*, in agris *im Güldnersgrund* rarius. Floret Junio.

327. ARENARIA, *tenuifolia*, foliis ſubulatis, caule paniculato, capſulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis. *Linn. S. N.* 313. *Spec.* 607. [*Hall.* 866.]

H. in ſcopulis *am Stutzelberg;* in rupibus verſus theriotropheum abunde; in muris pontis novi rarius. Floret Junio.

Radix *annua.* Caulis *ſpithamæus, erectus, dichotomus, demum paniculatus.* Folia *ſubulata, baſi connata, ſupra plana,*

ſubtus convexa, apice acuto purpureo, internodiis breviora. Pedunculi *uniflori, erecti.* Calycina *foliola lanceolata, mucrone intus purpurea, vix albido-marginata, lævia; ut* Bracteæ *in ſicca trinervia.* Petala *ovata, obtuſa, lactea, ungue brevi, Calyce dimidio fere breviora.* Stamina *in primariis floribus* 10, *in ſerioribus* 7-9, *longitudine petalorum.* Antheræ *didymæ, carneæ, polline hyalino.* Styli 3, *longitudine ſtaminum.* Capſula *erecta, ovato-trigona, calyce paulo longior, apice valvulis tribus obtuſiuſculis dehiſcens.* Semina *punctata, fuſca.*

STELLARIA *G. P.* 568.

Cal. 5-phyllus, patens. *Petala* 5, bipartita. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma. *S. N.* 311.

328. STELLARIA, *nemorum*, foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramoſis. *Linn. Spec.* 603. [*Myoſotis. Hall.* 886.]

H. in nemoroſis ad pagum *Erbach*; in umbroſis *im Zwinger*; alibique frequens. Floret Majo.

Caule *ſesquipedali, tereti, ſubhirto.* Foliis *pubeſcentibus, ſubtus pallidioribus: inferioribus cordatis petiolatis, intermediis lato-lanceolatis ſubpetiolatis, ſuperioribus ovatis ſeſſilibus.* Floribus *erecto-patulis ſubcampaniformibus*; Calyce *lævi*; Stylis *tribus.* Pedunculis *fructu maturo cernuo, horizontalibus*; Capſulis *ovato-cylindraceis, ſexvalvibus; loco natali ſemper umbroſo: temporeque florendi præcociori,* (Majo) a Ceraſtio *aquatico, cui ſimillima, facillime dignoſcenda.*

329. STELLARIA, *Holoſtea*, foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis bifidis. *Linn. Spec.* 603. [*Alſine. Hall.* 884.]

H. in ſylvaticis umbroſis & ad ſepes paſſim. Floret Majo, Junio.

330. STELLARIA, *graminea*, foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Linn. Spec.* 604. [*Hall.* 882.]

α. Caryophyllus arvenſis glaber flore minore. *Bauh. Pin.* 210.
β. Alſine, folio gramineo anguſtiore, paluſtris. *Dillen, append.* 69.

H. α. in pratis juxta rivulos paſſim; β. in ſalicetis *an der Dille.* Floret Junio, Julio.

α. Caulis *paniculatus.* Flos *patentiſſimus.* Petala *ultra medium bipartita.* β, Caulis *altior, minus ramoſus.* Flores *dupla*

majores, erecto patentes. Petala *ſemibifida.* Capſula *in utraque calyce minor, apice ſex valvi dehiſcens.*

331. STELLARIA, *dilleniana*, foliis lanceolatis integerrimis, caule procumbente.

Alſine aquatica, folio gratiolæ, ſtellato flore. *Dillen. Cat. app.* 39. (*Alſine. Hall* 881.)

Var. γ. præcedentis. LINN. *Flor. Suec. Edit. II. no.* 393.

H. in foſſis & rivulis pratorum abunde; *an der Muhlbaek* frequens. Floret Majo.

Foliis *lanceolatis, baſi ciliatis;* Pedunculis *ternis axillaribus, ex caulis medio apiceque tantum prodeuntibus, baſi duobus foliolis lanceolatis in ala folii ſeſſilibus, bracteatis; lateralibus 2 trifidis, trifloris;* Pedicellis *peracta floreſcentia divaricatiſſimis, apice incraſſatis.* Petalis *calyce brevioribus, ad unguem uſque bipartitis, laciniis diſtantibus.* Staminibus *5 unguibus petalorum, 5 totidem glandulis germen cingentibus, inſertis; a priori differt. Nonne hæc planta his notis a præcedente ſatis diſcrepans, tanquam propria* Species *proponi meretur?*

CUCUBALUS. *G. P.* 566.

Cal. inflatus. *Petala* 5, unguiculata, absque corona ad faucem. *Capſ.* 3-locularis *S. N.* 308.

332. CUCUBALUS, *Behen*, calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, corollis ſubnudis. *Linn. Spec.* 591. [*Viſcago-Hall.* 913.]

H. in pratis montoſis, & ad verſuras paſſim. Floret Junio, Julio.

SILENE. *G. P.* 567.

Cal. ventricoſus. *Petala* 5, unguiculata: coronata ad faucem. *Capſula* trilocularis. *S. N.* 309.

333. SILENE, *nutans*, petalis bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, panicula nutante. *Linn. Spec.* 596. [*Viſcago. Hall.* 915.]

H. in pratis ſylvaticis *am Rehberg* alibique frequens. Floret Majo, Junio.

Capſula *ſexfariam apice dehiſcit in hac & præcedente.*

D. *PENTAGYNIA.*

SEDUM, *G. P.* 579.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Squamæ* nectariferæ 5, ad baſin germinis. *Capſ.* 5. *S. N.* 316.

334. SEDUM, *Telephium*, foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Linn. Spec.* 616. [*Hall.* 954.]

α. Telephium (*album*) vulgare. *Bauh. Pin.* 287.
β. Telephium (*purpureum*) purpureum majus. *Bauh. Pin.* 287.
H. α. in agris *in der Aue*, alibique; β. in ſiccis aſperis *am Dollberg*; ad ſepes *am Steghäuſer Weg.* Floret Auguſto.
Pharm. α. TELEPHII Radix, FABARIÆ Folia.

335. SEDUM, *reflexum*, foliis ſubulatis ſparſis baſi ſolutis: inferioribus recurvatis. *Linn. Spec.* 618. [*Hall.* 967.]

H. in collibus ſiccis apricis paſſim; *am Dollberg* copioſe. Floret Julio, Auguſto.
Corolla Petalis 6-7-8-9. *cum totidem* Germinibus, *duploque* Staminum *ſæpiſſime ludit.*

336. SEDUM, *album*, foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, cyma ramoſa. *Linn. Spec.* 619. [*Hall.* 959.]

H. in rupibus *am Homberg*, in muris urbis & pontis novi frequens. Floret Julio.

337. SEDUM, *acre*, foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. *Linn. Spec.* 619. [*Hall.* 966.]

H. in campis & collibus ſiccis ſterilibus paſſim. Floret Junio.
Pharm. SEDI MINORIS Herba.

338. SEDUM, *ſexangulare*, foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis ſexfariam imbricatis. *Linn. Spec.* 620. [*Hall.* 965.]

H. ſimilibus locis, cum præcedente *am Dollberg* rarius. Floret Julio.

339. SEDUM, *villoſum*, caule erecto, foliis planiuſculis pedunculisque ſubpiloſis. *Linn. Spec.* 620. [*Hall.* 962.]

H. in paludoſis *im Hirſchberg*, *in des Herrn Ort* ad *Gundersdorf* copioſe; ad pagum *Brettſcheid* rarius. Floret Julio.

SPERGULA. *G. P.* 586.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, integra. *Capſ.* ovata, unilocularis, 5-valvis. *S. N.* 321.

340. SPERGULA, *arvenſis*, foliis verticillatis, floribus decandris. *Linn Spec.* 630. [*Alſine. Hall.* 873.]
H. in arvis & agris inter Linum *in der Aue*, alibique frequens. Floret Julio & ſeq.

341. SPERGULA, *pentandra*, foliis verticillatis, floribus pentandris. *Linn. Spec.* 630.
H. in ſterilibus glareoſis *auf der Sandwieſe*; jam dudum lecta nunc rariſſima planta. Floret Majo.

342. SPERGULA, *nodoſa*, foliis oppoſitis ſubulatis lævibus, caulibus ſimplicibus. *Linn. Spec.* 630. [*Hall.* 871.]
H. in pratis udis *im Pulversgrund*. Floret Julio.

CERASTIUM. *G. P.* 385.

Cal. 5-phyllus. *Petala* bifida. *Capſula* 1-locularis, apice dehiſcens. *S. N.* 320.

a. *Capſulis oblongis.*

343. CERASTIUM, *vulgatum*, foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, caulibus diffuſis. *Linn. Spec.* 627. [*Myoſotis. Hall.* 893.]
H. in pomariis & pratis ſiccis paſſim. Floret Majo & ſeq.

344. CERASTIUM, *viſcoſum*, erectum villoſo-viſcoſum. *Linn. Spec.* 627. [*Hall.* 895.]
H. in paſcuis ſterilibus, *hinter dem Schloſs*, alibique. Floret Majo.

345. CERASTIUM, *ſemidecandrum*, floribus pentandris, petalis emarginatis. *Linn. Spec.* 627. [*Hall.* 894.]
H. in paſcuis macilentis *am Homberg* rarius, ad pagum *Erbach* frequens. Floret Majo.

346. CERASTIUM, *arvenſe*, foliis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce majoribus. *Linn. Spec.* 628. [*Hall.* 889.]
H. in paſcuis, verſuris, & ad vias paſſim. Floret Majo, Junio.

b. *Capſulis ſubrotundis.*

347. CERASTIUM, *aquaticum*, foliis cordatis ſeſſilibus, floribus ſolitariis, fructibus pendulis. *Linn. Spec.* 629. [*Hall.* 885.]

H. ad foſſas, locis humentibus *unter der neuen Brücke; an der Muhlbach* copioſe. Floret Julio, Auguſto.

Caule *tripedali, ſubtetragono, glabro, ſubramoſo: geniculis carinaque foliorum ruſeſcentibus.* Foliis *cordatis, glabris, amplexicaulibus, margine undulatis; ſuperioribus pubeſcentibus.* Floribus *patentiſſimis*; Pedunculis Calycibus*que viſcoſis pubeſcentibus.* Petalorum *laciniis latioribus, diſtantibus*; Stylis *quinque*; Pedunculis *fructu maturo recto, nutantibus.* Capſulis *calyce connivente tectis, ovatis, 5-valvibus.* Valvis *bifidis, reflexis*; *Tempore florendi ſeriori*; (Auguſto) *loco natali ſemper humente, a* Stellaria *nemorum diſtinguitur.*

AGROSTEMA. *G. P.* 583.

Cal. 1-phyllus, coriaceus. *Petala* 5, unguiculata: *Limbo* obtuſo, indiviſo. *Capſ.* unilocularis. *S. N.* 319.

348. AGROSTEMA, *Githago*, hirſuta, calycibus corollam æquanribus, petalis integris nudis. *Linn. Spec.* 624. [*Lychnis Hall.* 926.]

H. in agris inter ſegetes frequens. Floret Junio.

LYCHNIS. G. *P.* 584.

Cal. 1-phyllus, oblongus, lævis. *Petala* 5, unguiculata: *Limbo* ſubbifido. *Capſ.* 5-locularis. *S. N.* 319.

349. LYCHNIS, *Flos cuculi*, petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo. *Linn. Spec.* 625. [*Hall.* 921.]

H. in pomariis & pratis humidis paſſim. Floret Majo, Junio. Capſula *unilocularis.*

350. LYCHNIS, *dioica*, floribus dioicis. *Linn. Spec.* 626. [*Hall.* 923.]

H. in dumetis & ſepibus paſſim Floret Junio & ſeq.

Capſula *unilocularis*, *apice 10-fariam dehiſcens, valvulis revolutis.* Petalis 4-*fidis ludit.* Hermaphroditam *nondum vidi.*

OXALIS. *G. P.* 582.

Cal. 5-phyllus. *Petala* unguibus connexa. *Capſ.* angulis dehiſcens, 5-gona. *S. N.* 318.

a. *Scapo radicali.*

351. OXALIS, *Acetoſella*, ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſa articulata. *Linn. Spec.* 620. [*Hall.* 928.]
H. in ſylvis & nemoribus abunde; *in dem Haynwinkelgen* parcius. Floret Aprili, Majo.
Pharm. ACETOSELLÆ Herba.

b. *Foliis caulinis alternis.*

352. OXALIS, *corniculata*, pedunculis umbelliferis, caule ramoſo diffuſo. *Linn. Spec.* 623. [*Hall.* 929.]
H. in cultis & hortis ad *Dillenburg*. Floret Junio.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

A. MONOGYNIA.

ASARUM. *G. P.* 589.

Cal. 3-f. 4-fidus, germini inſidens. *Cor.* o. *Capſ.* coriacea, coronata. *S. N.* 325.

353. ASARUM, *europæum*, foliis reniformibus obtuſis binis. *Linn. Spec.* 633. [*Hall.* 1547.]
H. in ſylvis & nemoroſis frequens, *am Homberg* parcius. Floret Aprili.
Pharm. ASARI Radix, Herba.

LYTHRUM. *G. P.* 604.

Cal. 12-fidus. *Petala* 6, calyci inſerta. *Capſula* 2-locularis, polyſperma. *S. N.* 328.

354. LYTHRUM, *Salicaria*, foliis oppoſitis cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris. *Linn. Spec.* 640. [*Salicaria. Hall.* 854.]
H. ad ripas *Dillæ* frequens. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. SALICARIÆ Herba.

B. DI-

B. *DIGYNIA.*

AGRIMONIA. *G. P.* 607.

Cal. 5-dentatus, altero obvallatus. *Petala* 5. *Sem.* 2, in fundo calycis. *S. N.* 329.

355. AGRIMONIA, *Eupatoria*, foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis. *Linn. Spec.* 643. [*Hall.* 991.]

H. in paſcuis ſiccis, ad verſuras vulgaris. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. AGRIMONIÆ Herba.

C. *TRIGYNIA.*

RESEDA. *G. P.* 608.

Cal. 1-phyllus, partitus. *Petala* laciniata. *Capſ.* ore dehiſcens, 1-locularis *S. N.* 329.

356. RESEDA, *Luteola*, foliis lanceolatis integris baſi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Linn. S. N.* 329. *Spec.* 643. [*Hall.* 1058.]

H. in ſterilibus *am Dollberg, auf dem Hinterſand*, alibiqué frequens. Floret Julio, Auguſto.

EUPHORBIA. *G. P.* 609.

Cor. 4-ſ. 5-petala, calyci inſidens. *Calyx* 1-phyllus, ventricoſus. *Capſ.* 3-cocca. *S. N.* 330.

a. *Umbella trifida.*

357. EUPHORBIA, *Peplus*, umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Linn. Spec.* 653. [*Tithymalus. Hall.* 1049.]

H. in cultis inter olera abunde. Floret Julio, Auguſto.

Petala *bicornia.* Fructus *tricarinatus: carina membranacea undulato-crenata, ſulco diviſa.* Semina *pulchre reticulata.*

358. EUPHORBIA, *exigua*, umbella trifida. dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Linn. Spec.* 654. [*Hall.* 1048.]

Tithymalus (*acuta*) ſ. Eſula exigua. *Bauh. Pin.* 291.
Tithymalus (*retuſa*) ſ. Eſula exigua foliis obtuſis. *Bauh. Pin.* 291.

H. α. in agris poſt meſſem *am Homberg*; β. *in der Altzbach* copioſiſſime. Floret Julio, Auguſto.

Caulis *vix niſi ad baſin ramoſus, umbella ſæpius brevior.* Folia *linearia: in α, acutiuſcula; in β, truncata, retuſa, cum mucrone.* Involucra & Involucella *ovato-lanceolata, baſi inæqualia, uno latere latiore.* Flores *omnes fertiles, exigui.* Petala 4, *bicornia.* Capſula *lævis.* Semina *ſubreticulata.*

b. *Umbella quinqueſida.*

359. EUPHORBIA, *dulcis*, umbella quinqueſida: biſida, involucellis ſubovatis, foliis lanceolatis obtuſis integerrimis. *Linn. Spec.* 656. [*Hall.* 1051.]

H. in ſylvaticis montoſis ad *Breitſcheid.* Floret Majo, Junio.

Radix *perennis, horizontalis, denſa, annulata, baſi fibroſiſſima.* Caules *plures, herbacei, pedales, erecti, ſubteretes, glabri; Coma ante floreſcentiam nutante.* Folia *alterna, ſeſſilia, patentia, lanceolata, obtuſa, tenera; ſupra lævia, ſubtus pallidiora, molliſſime albido-villoſa. Epidermide ſæpius circa coſtam ſecedente, ſubinflata.* Umbella *radiis* 5: Pedunculis *biſidis, rarius bis biſidis, nec ultra.* Involucrum *pentaphyllum: foliolis ovato-lanceolatis, folio veſtitu ſimillimis.* Involucella *duo, ovato-cordata, baſi truncata, acutiuſcula, utrinque lævia; marginibus uti Involucra & Folia ſuperiora, ſubtiliſſime ſerrulata.* Rami *fertiles ex ſuperioribus foliorum alis, aphylli, pedunculis ſimillimi: quorum tres ſuperiores ſæpe umbellæ adeo approximati, ut hæc octoſida octoniſque involucri foliolis inſtructa, primo intuitu videatur.* Flos *primarius ramorum & pedunculorum in ſemel biſidis fertilis, in bis biſidis ſemper ſterilis.* Calyx *turbinatus, quadeidentatus, pubeſcens.* Petala *quatuor, ſubrotunda, pelviformia, flava, ungue breviſſimo.* Capſula *glandulis purpureis conicis verrucoſa.* Semina *ovata, lævia. Succus plantæ lacteus inſipidus; non acris.*

360. EUPHORBIA, *helioſcopia*, umbella quinqueſida: triſida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ſerratis. *Linn. Spec.* 658. [*Hall.* 1050.]

H. in cultis inter olera paſſim. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. ESULÆ Herba.

c. Umbella multifida.

361. EUPHORBIA, *Eſula*, umbella multifida: bifida, involucellis ſubcordatis, petalis ſubbicornibus, ramis ſterilibus, foliis uniformibus. *Linn. Spec.* 660. [*Hall.* 1046.]

H. in ſylvaticis montoſis, inter lapidum acervos *im Beilſtein*; jam dudum lecta. Floret Majo.

362. EUPHORBIA, *Cypariſſias*, umbella multifida: dichotoma, involucellis ſubcordatis, ramis ſterilibus, foliis ſetaceis, caulinis lanceolatis. *Linn. Spec.* 661. [*Hall.* 1047.]

H. in paſcuis ſterilibus *im Thiergarten* abunde. Floret Majo.

D. DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM. *G. P.* 612.

Cal. 12 - partitus. *Petala* 12. *Capſulæ* 12, polyſpermæ. *S. N.* 335.

363. SEMPERVIVUM, *tectorum*, foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Linn. Spec.* 664. [*Sedum. Hall.* 949.]

H. in tectis frequens. Floret Julio.
Pharm. SEMPERVIVI MAJORIS Herba.
Petala, Stamina, Germina, Nectariaque 12-18.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

A. MONOGYNIA.

PHILADELPHUS. *G. P.* 614.

Cal. 4-ſ. 5-partitus, ſuperus. *Petala* 4-ſ. 5. *Capſ.* 4 - ſ. 5 - locularis, polyſperma. *S. N.* 339.

364. PHILADELPHUS, *coronarius*, foliis ſubdentatis. *Linn. Spec.* 671. [*Hall.* 1100.]

H. in dumetis *am Homberg*; ad ſepes frequens. Floret Junio.

PRUNUS. *G. P.* 610.

Cal. 5-fidus, inferus. *Petala* 5. *Drupæ* nux ſuturis prominulis. *S. N.* 341.

365. PRUNUS, *Padus*, floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglanduloſis. *Linn. Spec.* 677. [*Padus Hall.* 1086.]
H. in ſepibus ad *Beilſtein;* in dumetis verſus *Langenaubach.* Ploret Majo.

366. PRUNUS, *Cerafus*, umbellis ſubpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Linn. S. N.* 342. *Spec.* 679. *var.* α. [*Cerafus. Hall.* 1083.]
H. in ſylvaticis *am Homberg;* ad ſepes paſſim. Floret Majo.
Pharm. CERASORUM ACIDORUM Fructus.

367. PRUNUS, *avium*, umbellis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus conduplicatis. *Linn. S. N.* 342. *Spec.* 680. [*Hall.* 1082.]
H. in ſylvis, ad pagus *Hirſchberg* & *Fleisbach* frequens. Floret Majo.
Fructu *rubro*, & *nigro variat.*
Pharm. CERASORUM NIGRORUM Fructus. (Potius Nuclei.)

368. PRUNUS, *domeſtica*, pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Linn. Spec.* 680. [*Prunus. Hall.* 1079.]
α. Prunus. *Bauh. Pin.* 443.
β. Pruna majora dulcia & parva atro-cærulea. *Bauh. Pin* 443. *no.* 23.
H. α & β in ſepibus & dumetis *am Homberg*, alibique frequens. Floret Majo.
Pharm. β, PRUNI DAMASCENÆ Fructus.

369. PRUNUS, *inſititia*, pedunculis geminis, foliis ovatis ſubvilloſis convolutis, ramis ſpineſcentibus. *Linn. S. N.* 342. *Spec.* 680. [*Hall.* 1081.]
H. in ſepibus ad pagum *Breitſcheid.* Floret Majo

370. PRUNUS, *ſpinoſa*, pedunculis ſolitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis. *Linn. Spec.* 681. [*Hall.* 1080.]
H in dumetis & ſepibus paſſim. Floret Aprili.
Pharm. ACACIÆ Flores, Fructus.

B. *DIGYNIA.*

CRATÆGUS. *G. P.* 622.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 2-ſperma. *S. N.* 342.

371. CRATÆGUS, *Aria*, foliis ovatis inciſis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Linn. S. N.* 342. *Spec.* 681. [*Meſpilus. Hall.* 1089.]
H. in ſylvaticis montoſis *am Callenbachsberg.* Floret Majo? Flores nondum vidi.

372. CRATÆGUS, *torminalis*, foliis cordatis ſeptangulis: lobis infimis divaricatis. *Linn. Spec.* 681. [*Meſpilus. Hall.* 1088.]
H. in ſylvis *im Hirſchberg; in der Hörre.* Floret Majo. ♃

373. CRATÆGUS, *Oxyacantha*, foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis. *Linn. Spec.* 683. [*Meſpilus. Hall.* 1087.]
H. in ſepibus dumetis & ſylvis paſſim. Floret Majo.

C. *TRIGYNIA.*

SORBUS. *G. P.* 623.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 3-ſperma. *S. N.* 343.

374. SORBUS, *aucuparia*, foliis pinnatis utrinque glabris. *Linn. Spec.* 683. [*Meſpilus. Hall.* 1091.]
H. in ſylvis frequens. Floret Majo.
Pharm. SORBI AUCUPARIÆ Baccæ.

D. *PENTAGYNIA.*

MESPILUS. *G. P.* 625.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 5-ſperma. *S. N.* 343.

375. MESPILUS, *Cotoneaſter*, inermis, foliis ovatis integerrimis: ſubtus tomentoſis *Linn. S. N.* 343. *Spec.* 686. [*Meſpilus. Hall.* 1093.]
H. in rupibus, & quidem unico tantum in loco umbroſo, *am Homberg über der Lithau.* Floret Aprili, Majo.

Loco natali plerumque. Styli *tres in* Flore, & Semina *tria in* Fructu *pyriformi umbilico pervio, obſervavi.* Petala *calyce vix majora, conniventia.*

P Y R U S. *G. P.* 626.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Pomum* inferum, 5-loculare, polyſpermum. *S. N.* 344.

376. PYRUS, *communis*, foliis ſerratis, floribus corymboſis. *Linn. S. N.* 344. *Spec.* 686. [*Hall.* 1096.]
H. in ſylvis & ad pagos frequens. Floret Majo.

377. PYRUS, *Malus*, foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus, *Linn. Spec.* 686. [*Hall.* 1097.]
H. in ſylvis, ad vias & pagos paſſim. Floret Majo.

S P I R Æ A. *G. P.* 630.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Capſulæ* polyſpermæ. *S. N.* 347.

378. SPIRÆA, *Ulmaria*, foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymoſis. *Linn. Spec.* 702. [*Filipendula Hall.* 1135.]
H. ad ripas *Dillæ* paſſim; *an der Muhlbach* frequens. Floret Julio.
Pharm. ULMARIÆ Radix, Flores.

E. *P O L Y G Y N I A.*

R O S A. *G. P.* 631.

Petala 5. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, carnoſus, collo coarctatus. *Semina.* plurima, hiſpida, calycis interiori lateri affixa. *S. N.* 348.

379. ROSA, *Eglanteria*, germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule aculeis ſparſis rectis, petiolis ſcabris, foliolis acutis. *Linn. Spec.* 703?
Roſa ſpinis aduncis, foliis ſubtus rubiginoſis. *Hall.* 1103.
H. in ſepibus & ſylvis paſſim. Floret Majo, Junio.
Caulis, Rami & Petioli *aculeis validis apice recurvis armati.* Stipulæ Petioli Calycesque *ſetis capitatis viſcoſis adſperſi.* Foliola *quina ſ. ſeptena, impari majore, ovata, acuta, ſerrata:*

ſerraturis inciſis glanduliferis; ſupra lævia, ſubtus villoſo; rubiginoſa, viſcida, odorata: Pedunculi *ſolitarii & terni, ſetis ſcabri.* Petala *carnea, ungue flavo albidoque.* Fructus *globoſus, baſi ſetis hiſpiduſculus, demum nigreſcens:* Semina *lævia.*

380. ROSA, *umbellata*, germinibus ovatis glabris capitatis ſubumbellatis, caule aculeato. *Leyſer. Flor. Hall.* 435?

H. in ſylvis *in der Horre; im Beilſtein* frequens. Floret Junio.

Pedunculi *ſetis ſcabri terminales tres: intermedio unifloro, lateralibus trifidis, trifloris.* Fructus *ſeptem, magni, globoſi, glabri, dein nigricantes, altitudine æquales; in reliquis ab antecedente vix diverſa. Utraque R. villoſæ (noſtræ) valde adfinis.*

Aculei *recurvi, in ramulis ſub floribus numeroſiores tenuiores recti purpuraſcentes.* Stipulæ *uti folia ſupra glabræ, ſubtus marginibusque villoſo-virides, glandulis fuſco purpureis undique adſperſæ, odoratæ, odore pomorum.* Petioli *aculeati, glanduloſi viſcidi.* Foliola inferiora *ſeptena*, ſuperiora *quina tantum, ovata, ſerrata, ſerraturis ſubinciſis.* Flores *ſinguli rami terminales ſubumbellati* 3-5. 7. laterales. *Sæpius ſolitarii*, pedunculi *aculeis rectis hiſpidi, quorum intermedius, nudus, reliqui bracteati,* bracteis *duabus oppoſitis lanceolato-acuminatis*, glandula inciſis. Germen ſubgloboſum. Aculeatum. Calycis foliola pinnatifid. *more canina. At omnia foliola, glandulis, ſtipitatis. Adſperſa viſco.* Flos *parvus*, Corolla *qualem dixi.* Fructus *ſubgloboſus mature nigricans, aculeatus.* In aſperis duris theriotrophæi Junio menſe huuc fruticem, cum floribus & fructu exſucco præcedentis anni adhuc adhærente, reperi. Arbitror noſtram *umbellatam*, & *eglanteriam*, cum hac coaleſcere, & meras hujus eſſe varietates. Nom. ſpecificum S. N. 348. R. ſempervirentis ſatis ad hanc quadrat. Ob defectum Authorum, mihi impoſſibile eſt, in hoc frutice aliquid certi exactique determinare.

381. ROSA, *cinamomea*, germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule aculeis ſtipularibus, petiolis ſubinermibus. *Linn. Spec.* 703.

H. in ſepibus *am Sieghäuſer Weg, bey dem Steg*; in dumetis ad viam publicam *bey der untern Walkmühle.* Floret Junio.

Frutex *orgyalis:* Ramis *longis, purpureis, glaberrimis, vernice quaſi oblinitis.* Aculei *recti, albidi: duo tantum ad baſin ſinguli Ramuli & Stipulæ.* Stipulæ *oblongæ, dilatatæ, ſubcolo-*

ratæ, ſerrulatæ: ſerraturis purpureo-glanduloſis. Petioli *ſubvilloſi, inermes.* Foliola *ſeptena, oblonga, ſerrata, ſubtus albido-villoſa.* Pedunculi Germinaque *lævia.* Calycis *foliola integerrima, ſubvilloſa.* Flores *in noſtrate ſemper multiplicati, ſuaveolentes, ſteriles.*

382. ROSA, *canina*, germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis *Linn. Spec.* 704. [*Roſa. Hall.* 1101.]

H. in ſepibus & dumetis paſſim. Floret Junio.

Pharm. ROSÆ SYLVESTRIS Flores; CYNOSBATI Fructus, Semina; Fungi BEDEGUAR.

383. ROSA, *pendulina*, germinibus ovatis glabris, pedunculis cauleque hiſpidis; petiolis inermibus, fructibus pendulis. *Linn. S. N.* 348. *Spec.* 705.

H. in ſylvis *im Hirſchberg* rarius. Floret Junio.

384. ROSA, *ſpinoſiſſima*, germinibus globoſis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatiſſimis. *Linn. S. N.* 348. *Spec.* 705. [*Hall.* 1106.]

H. in montoſis *am Beilſtein.* Floret Junio. +

385. ROSA, *villoſa*, germinibus globoſis pedunculisque hiſpidis, caule aculeis ſparſis, petiolis aculeatis, foliis tomentoſis. *Linn. S. N.* 348. *Spec.* 704? [*Hall.* 1105.]

H. in dumetis *auf der Höhle, bey dem heiligen Kreutz.* Floret Junio

A ROSA *villoſa in hortis culta, noſtra vix differt, niſi:* Aculeis *quidem rectis, apicibus autem ſubrecurvis*, Foliolis *magis ovatis, utrinque tamen valde villoſis*; Pedunculis, Calycibus, Germinibus*que quidem aculeatis*, Fructu *maturo vero duplo minore ſubaculeato, aculeos (baſi excepta) deponente.*

RUBUS. *G. P.* 632.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* compoſita acinis monoſpermis. *S. N.* 349.

a. *Fruteſcentes.*

386. RUBUS, *idæus*, foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Linn. Spec.* 706. [*Hall.* 1108.]

β. Caule lævi inermi.

H. in ſepibus *hinter dem Schloſs*; in ſylvaticis montoſis paſſim, *ß. im Zwinger.* Floret Majo & ſeq.
Pharm. RUBI IDÆI Baccæ.

387. RUBUS, *cæſius*, foliis ternatis ſubnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Linn. Spec.* 706. [*Hall.* 1110.]

H. in ſepibus & dumetis paſſim. Floret Junio, Julio.
Pharm. RUBI BATI Folia. (*Sequentis gratiora.*)

388. RUBUS, *fruticoſus*, foliis quinato - digitatis ternatiſque, caule petioliſque aculeatis. *Linn. Spec.* 707. [*Hall.* 1109.]

H. in dumetis & ſepibus frequens. Floret Junio.

b. *Herbacei.*

389. RUBUS, *ſaxatilis*, foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *Linn. S. N.* 349. *Spec.* 708. [*Hall.* 1111.]

H. in ſylvaticis montoſis *im Hirſchberg*; ad pagum *Liebenſcheid.* Floret Majo, Junio.

TORMENTILLA. *G. P.* 635.

Cal. 8-fidus. *Petala* 4. *Semina* ſubrotunda, (8) nuda, receptaculo parvo exſucco affixa. *S. N.* 352.

390. TORMENTILLA, *erecta*, caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 716. [*Fragaria. Hall.* 1117.]

H. in paſcuis ſylvaticis montoſis, *am Rekberg*; *Homberg*, alibique parcius. Floret Junio, Julio.
Pharm. TORMENTILLÆ Radix, Herba.

FRAGARIA. *G. P.* 633.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Receptaculum* ſeminum ovatum, baccatum, deciduum. *S. N.* 349.

391. FRAGARIA, *veſca*, flagellis reptantibus. *Linn. S. N.* 349: *Spec.* 708. [*Hall.* 1112.]

β. Fragaria ſterilis, ſtigmatibus deſtituta. *Du Chesne Hiſt: des Fraiziers.* 107. HALL. var. α. l. c.

H. in ſylvis copioſiſſime. Floret Majo, Junio.
Pharm. α. FRAGARIÆ Radix, Herba, Baccæ.

Var. β. Scapo *ſeſquipedali*; *multifloro*; *Stolonibus plerumque nullis*; Floribus *triplo majoribus*; Antheris Stigmatibusque *ſphacelo quaſi correptis*, *fuſco-atris*, *fere nullis*; Fructibus *abortientibus*; annuatim provenit in dumetis am *Homberg*, alibique.

392. FRAGARIA, *ſterilis*, caule decumbente, ramis floriferis laxis. *Linn. S. N.* 350. *Spec.* 709. [*Hall.* 1113.]

H. in paſcuis ſterilibus paſſim. Floret Aprili, Majo.
Petala *obcordata*, *Calyci æqualia*. Bacca *exſucca*. (Potentillæ.)

POTENTILLA. *G. P.* 634.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Semina* ſubrotunda, nuda, receptaculo parvo exſucco affixa. *S. N.* 350.

a. *Foliis pinnatis.*

393. POTENTILLA, *Anſerina*, foliis pinnatis ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn. S. N.* 350. *Spec.* 710. [*Fragaria. Hall.* 1126.]

H. in paſcuis, ad vias paſſim. Floret Majo & ſeq.
Pharm. ANSERINÆ Herba.

b. *Foliis digitatis.*

394. POTENTILLA, *argentea*, foliis quinatis cuneiformibus inciſis ſubtus tomentoſis, caule erecto. *Linn. Spec.* 712. [*Hall.* 1124.]

H. in collibus ſiccis, ubique frequens. Floret Junio, Julio.

395. POTENTILLA, *verna*, foliis radicalibus quinatis acute ſerratis retuſis, caulinis ternatis, caule declinato. *Linn. Spec.* 712. [*Hall.* 1119.]

H. in collibus apricis ſiccis paſſim. Floret Aprili, Majo & Septembri.

396. POTENTILLA, *reptans*, foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn. S. N.* 351. *Spec.* 714. [*Hall.* 1118.]

H. ad verſuras & margines hortorum *im Fiſchweyhergrund*; *in der Altzbach*; alibique frequens. Floret Julio.
Pharm. PENTAPHYLLI Radix, Herba.

GEUM. *G. P.* 636.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Sem.* ariſta geniculata. *S. N.* 352.

397. GEUM, *urbanum*, floribus erectis, fructibus globoſis villoſis: ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Linn. S. N.* 352. *Spec.* 716. [*Hall.* 1130.]
H. in umbroſis ad ſepes ubique. Floret Junio.
Pharm. CARYOPHYLLATÆ Radix.
Receptaculum *ovatum*, *ſubſeſſile*.

398. GEUM, *rivale*, floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis. *Linn. Spec.* 717. [*Hall.* 1129.]
H. in pratis humentibus ad pagos *Rehe* & *Langenaubach*. Floret Majo & ſeq.
Receptaculum *oblongum*, *pedunculatum*. *Floribus ex latere proliferis ſæpe ludit.*

COMARUM. *G. P.* 638.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5, calyce minora. *Receptaculum* ſeminum ovatum, ſpongioſum perſiſtens. *S. N.* 353.

399. COMARUM, *paluſtre*. *Linn. Spec.* 718. [*Fragaria Hall.* 1128.]
H. in paludoſis ad pagum *Sinn*. Floret Junio, Julio.
Planta hæc in hortum translata, ſola tam ſicco quam humido; Caulibus viget ſuffruticoſis perennantibus, Radice valde luxuriante.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

A. MONOGYNIA.

** Flores tetrapetali.*

PAPAVER. *G. P.* 648.

Cor. 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Capſula* 1-locularis, ſub ſtigmate perſiſtente poris dehiſcens. *S. N.* 360.

a. *Capſulis hiſpidis.*

400. PAPAVER, *Argemone*, capſulis clavatis hiſpidis, caule folioſo multifloro. *Linn. Spec.* 725. [*Hall.* 1061. p. 15. no. 1.]

H. inter ſegetes *am Dollberg*, alibique. Floret Junio, Julio.

b. *Capſulis glabris.*

401. PAPAVER, *Rhœas*, capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis. *Linn. Spec.* 726. [*Hall.* 1064.]

H. inter ſegetes paſſim. Floret Junio, Julio.

Pharm. PAPAVERIS ERRATICI ſ. RHOEADIS Flores.

402. PAPAVER, *dubium*, capſulis oblongis glabris, caule multifloro ſetis adpreſſis, foliis pinnatifidis inciſis, *Linn. Spec.* 726. [*Hall.* 1063. p. 15. no. 3.]

H. inter ſegetes *am Dollberg*, alibique frequens. Floret Junio, Julio.

403. PAPAVER, *ſomniferum*, calycibus capſulisque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis. *Linn. Spec.* 726. [*Hall.* 1065.]

H. in cultis *auf dem Hinterſand; in der Puze*, alibique quaſi indigena rarius. Floret Junio.

Pharm. PAPAVERIS ALBI & NIGRI Capita, Semina.

CHELIDONIUM. *G. P.* 647.

Cor. 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua* 1-locularis, linearis. *S. N.* 359.

404. CHELIDONIUM, *majus*, pedunculis umbellatis. *Linn. Spec.* 723. [*Hall.* 1059.]

H. ad ſepes hortorum paſſim. Floret Junio & ſeq.

Pharm. CHELIDONII MAJORIS Radix.

ACTÆA. *G. P.* 644.

Cor. 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* unilocularis. *Semina* ſemiorbiculata. *S. N.* 359.

405. ACTÆA, *ſpicata*, racemo ovato, fructibus baccatis. *Linn. Spec.* 722. [*Hall.* 1076.]

H. in nemoroſis ad *Erbach*; in dumetis *am Beilſtein; am Homberg, unter der Lithau* frequens. Floret Majo, Junio.

Pharm. CHRISTOPHORIANÆ Radix, Herba.

*** Flores pentapetali*

CISTUS. *G. P.* 673.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus: foliolis duobus minoribus. *Capſula.* *S. N.* 366.

406. CISTUS, *Helianthemum*, ſuffruticoſus procumbens, ſtipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis ſubpiloſis. *Linn. Spec.* 744. [*Hall.* 1033.]

H. in paſcuis ſylvaticis ſiccis, *am Homberg*, *Rehberg*, alibique vulgaris. Floret Junio, Julio.

TILIA. *G. P.* 660.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* ſicca, globoſa, 5-locularis, 5-valvis, baſi dehiſcens. *S. N.* 363.

407. TILIA, *europæa*, floribus nectario deſtitutis. *Linn. Spec.* 733. [*Hall.* 1030.]

H. in ſylvis, & culta circa urbem frequens. Floret Junio, Julio. *Pharm.* TILIÆ Flores.

Germen 5-*loculare.* Capſula *turbinato-globoſa*, 5-*carinata*, *unilocularis*: Semine *unico*, *reliquis quatuor ſemper abortientibus.*

**** Flores polypetali.*

NYMPHÆA. *G. P.* 653.

Cor. polypetala. *Cal.* 4. f. 5-phyllus. *Bacca* multilocularis, truncata. *S. N.* 361.

408. NYMPHÆA, *lutea*, foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. *Linn. S. N.* 361. *Spec.* 729. [*Hall.* 1066.]

H. in piſcinis ad *Emmerichenhayn* rarius. Floret Junio, Julio. +

409. NYMPHÆA, *alba*, foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Linn. Spec.* 729. [*Hall.* 1067.]

H. in piſcuis ad *Driedorf*, albique infrequens. Floret Junio, *Pharm.* NYMPHÆÆ ALBÆ Radix, Flores.

B. *TRIGYNIA.*

DELPHINIUM. *G. P.* 681.

Cal. o. *Petala* 5. *Nectarium* bifidum; poſtice cornutum. *Siliquæ* 3. ſ. 1. *S. N.* 370.

410. DELPHINIUM, *Conſolida*, nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo. *Linn. Spec.* 748. [*Hall.* 1203.]
H. inter ſegetes frequens. Floret Junio, Julio.
Pharm. CONSOLIDÆ REGALIS Flores.

411. DELPHINIUM, *Ajacis*, nectariis monophyllis, caule ſimplici. *Linn. Spec.* 748. [*Hall.* 1202.]
H. in cultis quaſi indigena, *bey der obern Walkmühle* frequens. Floret Julio.

ACONITUM. *G. P.* 682.

Cal. nullus. *Petala* 5: ſupremo fornicato. *Nectaria* 2, pedunculata, recurva. *Siliquæ* 3-ſ. 5. *S. N.* 371.

412. ACONITUM, *Napellus*, foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis. *Linn. Spec.* 751. [*Hall.* 1197.]
H. in ſylvaticis & pratis ſiccis *bey Langenaubach*; ad pagum *Sinn* frequens; *im Roſenwäldgen* rarius. Floret Julio, Auguſto.
Nectaria *ſex minora linearia acuta*, Stamina *cingentia: quorum duo ſuperiora apice bifida.*

C. *PENTAGYNIA.*

AQVILEGIA. *G. P.* 684.

Cal. o. *Petala* 5. *Nectaria* 5, corniculata, interpetala. *Capſulæ* 5, diſtinctæ. *S. N.* 372.

413. AQVILEGIA, *vulgaris*, nectariis incurvis. *Linn. Spec.* 752. [*Hall.* 1195.]
H. in pomariis *am Homberg*; alibique frequens. Floret Junio. *Pharm.* AQVILEGIÆ Flores, Semina.

D. POLYGYNIA.

CLEMATIS. *G. P.* 696.

Cal. o. *Petala* 4, rarius 5. *Semina* caudata. *S. N.* 376.

414. CLEMATIS, *Vitalba*, foliis pinnatis: foliolis cordatis ſcandentibus. *Linn. Spec.* 766. [*Hall.* 1142.]

H. in dumetis ad viam publicam *am Bockshayn.* Floret Julio. Foliolis integris, & ſubdentatis ludit.

THALICTRUM. *G. P.* 697.

Cor. o. *Petala* 4 - ſ. 5. *Semina* ecaudata. *S. N.* 377.

415. THALICTRUM, *flavum*, caule folioſo ſulcato, panicula multiplici erecta. *Linn. Spec.* 770. [*Hall.* 1138.]

H. in pratis ad pagos *Breitſcheid*, *Roth* & *Langenaubach* frequens. Floret Julio.
Pharm. THALICTRI Radix.

CALTHA. *G. P.* 703.

Cor. o. *Petala* 5. *Nectaria* o. *Capſulæ* plures polyſpermæ. *S. N.* 381.

416. CALTHA, *paluſtris. Linn. Spec.* 784. [*Hall.* 1188.]
H. in pratis humentibus paſſim. Floret Majo.

ANEMONE. *G. P.* 694.

Cal. o. *Petala* 6-9. *Semina* plura. *S. N.* 374.

a. Hepatica, *Flore ſubcalyculato.*

417. ANEMONE, *Hepatica*, foliis trilobis integerrimis. *Linn. Spec.* 758. [*Hepatica. Hall.* 1156.]

H. in nemoroſis ad *Erbach* rarius. Floret Martio, Aprili.
Pharm. HEPATICÆ NOBILIS Herba, Flores.
b. Anemonoidea *flore nudo*, *ſeminibus ecaudatis.*

418. ANEMONE, *nemoroſa*, ſeminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. *Linn. Spec.* 762. [*Hall.* 1154.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg*; *Rehberg*; & alibi copioſe. Floret Aprili, Majo.
Pharm. RANUNCULI ALBI Flores.

419. ANEMONE, *ranunculoides*, ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis (5) ſubrotundis, caule ſubbifloro. *Linn. Spec.* 762. [*Hall.* 1153.]

H. in nemoroſis ad pagum *Erbach* frequens. Floret Majo, Junio.

TROLLIUS. *G. P.* 700.

Cal. 0. *Petala* circiter 14. *Capſulæ* plurimæ, ovatæ, monoſpermæ. *S. N.* 380.

420. TROLLIUS, *europæus*, corollis conniventibus, nectariis longitudine ſtaminum. *Linn. Spec.* 782. [*Hall.* 1189.]

H. in pratis humiduſculis, ad *Erbach*; *Gundersdorf*; alibique copioſe. Floret Junio.
Capſulæ *carinatæ*, *erectæ*, *introrſum ſutura dehiſcentes*: Seminibus *in noſtrate* (*culta*) *ſemper quatuor*, *ovatis*, *fuſcis*, *nitidis*, *ſutura affixis*.

RANUNCULUS. *G. P.* 699.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5 intra ungues poro mellifero. *Semina* nuda. *S. N.* 378.

a. *Foliis ſimplicibus.*

421. RANUNCULUS, *Flammula*, foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Linn. Spec.* 772. [*Hall.* 1182.]

H. juxta rivulos in pratis udis, *hinter dem Homberg*; alibique vulgaris. Floret Junio, Julio.

422. RANUNCULUS, *Ficaria*, foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Linn. S. N.* 378. *Spec.* 774. [*Ficaria. Hall.* 1160.]

H. in pomariis & cultis paſſim. Floret Aprili, Majo.
Pharm. CHELIDONII MINORIS Radix, Herba.

b. *Foliis*

b. Foliis *diſſectis & diviſis.*

423. RANUNCULUS, *auricomus*, foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Linn. Spec.* 775. [*Hall.* 1177.]

H. in pomariis & pratis ſylvaticis frequens. Floret Aprili & ſeq.

Hujus Flores *vernales* (Aprili) *apetali; ſeriores* (Majo) *uno alterove* Petalo, *demum* (Junio) Petalis *quinque inſtructi, obſervantur.*

424. RANUNCULUS, *ſceleratus*, foliis inferioribus palmatis; ſummis digitatis, fructibus oblongis. *Linn. Spec.* 776. [*Hall.* 1175.]

H. in aquis ſtagnantibus theriotrophei rarius; in foſſis ad *Heyer* frequens. Floret Majo, Junio.

425. RANUNCULUS, *bulboſus*, calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto multifloro, foliis compoſitis. *Linn. S. N.* 379. *Spec.* 778. [*Hall.* 1174.]

H. in paſcuis pomariis & pratis ubique. Floret Majo, Junio.

Locis ſiccioribus & ſterilioribus, Radice *ſemper bulboſa; in humentibus & pinguioribus, tota fibroſa reperitur.* Calyce *retroflexo, & ſtolonum repentium defectu*, a RAN. repente; Pedunculis *ſulcatis* a RAN. acri *dignoſcendus.*

426. RANUNCULUS, *repens*, calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſtolonibus repentibus, foliis compoſitis. *Linn. S. N.* 379. *Spec.* 779 [*Hall.* 1173.]

H. in cultis, pomariis, ſecus vias, ubique. Floret Majo, Junio.

427. RANUNCULUS, *polyanthemos*, calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Linn. Spec.* 779? [*Hall.* 1171.]

H. in pratis humentibus ad pagum *Gundersdorf* parcius. Floret Junio.

Caule *glabro, altiori, ramoſiori, multifloro;* Foliis *magis ad petiolum uſque diviſis, glabrioribus, acutius dentatis;* Pedunculis *ſubſtriatis, a ſequente noſter vix differt.*

428. RANUNCULUS, *acris*, calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: ſummis linearibus. *Linn. Spec.* 779. [*Hall.* 1169.]

H. in pratis & pomariis abunde. Floret Majo, Juuio.
Pharm. RANUNCULI Herba.

429. RANUNCULUS, *lanuginoſus*, calycibus patulis pedunculis teretibus, caule petiolisque hirſutis, foliis trifidis lobatis crenatis holoſericeis. *Linn. S. N.* 379. *Spec.* 779. [*Hall.* 1172.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg über der Lithau* rarius; in nemoroſis ad *Breitſcheid* & *Langenaubach* frequens. Floret Majo, Junio.

430. RANUNCULUS, *arvenſis*, ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. *Linn. Spec.* 780. [*Hall.* 1176.]

H. in arvis & agris, inter ſegetes frequens. Floret Majo, Junio.

431. RANUNCULUS, *hederaceus*, foliis ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Linn. Spec.* 781.

H. in aquis ſtagnantibus *bey der untern Walkmuhle* copioſe. Floret Junio & ſeq.

Caulis *repens ramoſiſſimus, teres, glaber, fibras ſimplices ex foliorum emittens alis.* Folia *infima longiſſime petiolata, reniformia, glabra, ſemiquinqueloba, ſuperiora triloba: lobis obtuſiſſimis; pagina ſuperiore macula purpureo-fuſca notata.* Stipulæ *duæ oblongæ ad baſin ſinguli petioli.* Pedunculi *oppoſitifolii, teretes, craſſi, (reſpectu floris) uniflori.* Flos *exiguus.* Calyx *patens.* Petala *obovata, alba, ungue flavo, poro nectarifero uti in ſequente.* Stamina 5-6-ſ. 8. Fructus *ſubgloboſus, maturo ſemine nutans.* Semina *obtuſiſſima, fuſca.* *Odor totius plantæ Moſchi,* Adoxæ *ſimilis.*

432. RANUNCULUS, *aquatilis*, foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis peltatis. *Linn. S. N.* 380. *Spec.* 781.

α. Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo. *Bauh. Pin.* 180. (*Hall.* 1163.)

β. Ranuuculus foliis omnibus capilllaceis circumſcriptione rotundis. *Linn. H. Cliff.* 231. (*Hall.* 1162.

γ. Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumſcriptione oblongis. *Roy. Lugd.* 492. (*Hall.* 1161.)

H. α. in ſtagnis *auf der Sandwieſe*; β & γ, *in der Dille* & *Muhlbach* copioſe. Floret Majo & ſequ.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

A. GYMNOSPERMIA.

** Calyces ſubquinquefidi.*

LEONURUS. *G. P.* 722.

Antheræ punctis nitidis adſperſæ. *S. N.* 396.

433. LEONURUS, *Cardiaca*, foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Linn. Spec.* 817. [*Cardiaca. Hall.* 274.]

H. in ruderatis, ad ſepes frequens. Floret Junio. *Pharm.* CARDIACÆ Herba.

GLECOMA. *G. P.* 714.

Antherarum ſingulum par in formam crucis connivens. *Cal.* 5-fidus. *S. N.* 393.

434. GLECOMA, *hederacea*, foliis reniformibus crenatis. *Linn. Spec.* 807. [*Chamæclema. Hall.* 245.]

H. in pomariis, ad ſepes paſſim. Floret Aprili, Majo. *Pharm.* HEDERÆ TERRESTRIS. Herba.

MENTHA. *G. P.* 713.

Cor. ſubæqualis, 4-fida: lacinia latiore emarginata. *Stamina* erecta, diſtantia. *S. N.* 391.

a. *Spicatæ.*

435. MENTHA, *ſylveſtris*, ſpicis oblongis, foliis oblongis tomentoſis ferratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Linn. Spec.* 804. [*Hall.* 227.]

H. in pratis udis, juxta rivulos *im Fiſchweyher-Grund* frequens. Floret Julio, Auguſto.

b. *Capitatæ.*

436. MENTHA, *hirſuta*, floribus capitatis, foliis ovatis ferratis ſubſeſſilibus pubeſcentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Linn. S. N.* 392. *Mantiſſ.* 81. [*Hall.* 225. β.]

H. in aquoſis & inundatis *an der Mühlbach*; ad ripas *Dillæ am ſteinern Waag* frequens. Floret Auguſto, Septembri.

437. MENTHA, *aquatica*, floribus capitatis, foliis ovatis ſertatis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Linn. S. N.* 392. *Spec.* 805. [*Hall.* 225. *α*.]

H. ſimilibus in locis cum præcedente copioſiſſime. Floret Auguſto, Sept.

e. *Verticillatæ.*

438. MENTHA, *gentilis*, floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ſertatis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Linn. Spec.* 805.

H. in foſſis *an dar Dille und Mühlbach* rarius. Floret Auguſto.

439. MENTHA, *arvenſis*, floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam æquantibus. *Linn. Spec.* 806. [*Hall.* 223.]

H. in agris poſt meſſem copioſiſſime. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. MENTHÆ SYLVESTRIS. Herba.

TEUCRIUM. *G. P.* 706.

Corollæ labium ſuperius (nullum) ultra baſin 2 - partitum, divaricatum ubi ſtamina, *S. N.* 387.

440. TEUCRIUM, *Botrys*, foliis multifidis, floribus lateralibus ternis pedunculatis. *Linn. S. N.* 387. *Spec.* 786. [*Chamædrys. Hall.* 289.]

H. in arvis *am Dollberg* frequens; *auf dem Homberg* alibique rarius. Floret Julio.

441. TEUCRIUM, *Scorodonia*, foliis cordatis ſerratis petiolatis, racemis lateralibus ſecundis, caule erecto. *Linn. Spec.* 789. [*Hall.* 287.]

H. in montoſis ſylvaticis *am Homberg über der Lithau; am Rehberg; Galgenberg; im Beilſtein* frequens. Floret Julio.

442. TEUCRIUM, *Chamædrys*, foliis cuneiformi ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis. *Linn. S. N.* 388. *Spec.* 790. [*Hall.* 286.]

H. in montoſis apricis *am Galgenberg*. Floret Julio. +.
Ipſe plantam hanc nondum legi.
Pharm. CHAMÆDRYOS Herba.

AJUGA. *G. P.* 705.

Corollæ labium ſuperius minimum. *Stamina* labio ſuperiore longiora. *S. N.* 387.

443. AJUGA, *pyramidalis*, tetragono-pyramidalis villoſa, foliis radicalibus maximis. *Linn. S. N.* 387. *Spec.* 785.? [*Bugula. Hall.* 283. α.]

H. in arvis & campis ſiccis apricis *am Homberg*, alibique vulgaris. Floret Majo, Junio.

Caulis *ſimplex, palmaris, ſenſim pedalis, erectus, villoſus.* Folia caulina *inferiora reliquis majora; petiolata, ovato-oblonga, repando-crenata.* Bracteæ *decuſſatæ, ſubtrilobæ, ſeu angulato-dentatæ, inferiores virides, ſuperiores violaceæ, villoſæ.* Flores *utrinque* 4. Calyx *villoſus, violaceus.* Corolla *ſaturate cœrulea.*

444. AJUGA, *alpina*, caule ſimplici, foliis caulinis radicalia æquantibus. *Linn. S. N.* 387. *Mantiſſ.* 80? [*Hall.* 283? β.]

H. in montoſis ſiccis *am Galgen- und Rehberg*, rarius. Floret Junio.

Caulis *ſpithamæus, villoſiſſimus.* Folia caulina *inferiora oblonga, lineata, crenato-dentata, ſubſeſſilia, villoſa, reliquis minora.* Bracteæ *ovatæ, crenulatæ, villoſæ, non coloratæ.* Floribus *utrinque* 5, *inque reliquis ab antecedente vix differt, cujus forte varietas eſt.*

445. AJUGA, *genevenſis*, foliis tomentoſis lineatis, calycibus hirſutis. *Linn. S. N.* 387. *Spec.* 785.

H. in arvis ſterilibus *am Homberg & Reuterberg* rarius; jam dudum lecta, nunc rariſſima planta. Floret Junio.

Caulis *ſemipedalis, ſimplex.* Folia *cuneiformi-oblonga, dentata, villoſa, lineata, inferiora reliquis minora.* Bracteæ *remotiores, ovatæ, dentatæ, ſuperiores fuſco-purpureæ.* Flores *utrinque tres.* Calyx *villoſus, purpuraſcens.* Corolla *incarnata, tubo longiſſimo, tenui.*

446. AJUGA, *reptans*, glabra, ſtolonibus reptantibus. *Linn. S. N.* 387. *Spec.* 785. [*Bugula Hall.* 282.]

H. in pratis & pomariis paſſim. Floret Majo.
Pharm. CONSOLIDÆ MEDIÆ Herba.

BETONICA. *G. P.* 718.

Cal. ariſtatus. *Corollæ* labium ſuperius adſcendens, planiuſculum; tubus cylindricus. *S. N.* 394.

447. BETONICA, *officinalis*, ſpica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Linn. Spec.* 810. [*Hall.* 264.]

H. in ſylvaticis *am Homberg*, alibique vulgaris. Floret Julio.
Pharm. BETONICÆ Herba, Flores.

LAMIUM. *G. P.* 716.

Corollæ labium ſuperius integrum fornicatum; labium inferius 2-lobum; faux utrinque margioe dentata. *S. N.* 393.

448. LAMIUM, *maculatum*, foliis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. *Linn. Spec.* 809. [*Hall.* 270? *α.*]

H. ad ſepes in pomariis paſſim. Floret Majo, Junio.
Differt a ſequente: Foliis *latioribus*, *obſcure-viridibus*, *primo vere autumnoque albido-maculatis*; *ſerrato-dentatis*: *dentibus duplo paucioribus*, *acutioribus*, *ſuperioribus profundius inciſis*, *per paria remotioribus*; Floribus *in ſingulo Verticillo* 10, *nec*-20. Calyce *incurvo*, *nulla macula fuſca ad baſin notato*: *dentibus inæqualibus*, *triangularibus*, *ariſtatis*, *piloſis*, *ſuperiore reliquis majore*. Corolla *purpurea*: Galea *crenulata*; Labio *albido*, *venis ſanguineis undulatis picto*.

449. LAMIUM, *album*, foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Linn. S. N.* 393. *Spec.* 809. [*Hall.* 271.]

H. in cultis & pomariis ad ſepes paſſim. Floret Majo & ſeq.
Pharm. LAMII ALBI ſ. GALEOPSIDIS Flores.

450. LAMIUM, *purpureum*, foliis cordatis obtuſis petiolatis. *Linn. Spec.* 809. [*Hall.* 272.]

H. in agris & cultis ubique. Floret Aprili & ſeq.

451. LAMIUM, *amplexicaule*, foliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis. *Linn. Spec.* 809. [*Hall.* 273.]

α. Corollis non explicatis, galeis purpureis holoſericeis.
β. Corollis perfectis; tubo longiſſimo.

H. α. in cultis primo vere paſſim; β. in arvis & agris *auf dem hinter Stahl*, alibique frequens. Floret ſerius Junio, Julio.

GALEOPSIS. *G. P.* 717.

Corollæ labium ſuperius ſubcrenatum, fornicatum; labium inferius ſupra 2-dentatum. *S. N.* 393.

452. GALEOPSIS, *ladanum*, internodiis caulinis æqualibus: verticillis omnibus remotis, calycibus inertibus. *Linn. S. N.* 393. *Spec.* 810. [*Hall.* 266.]
H. in agris arenoſis, inter ſegetes paſſim. Floret Julio & ſeq.

453. GALEOPSIS, *dubia*, foliis rhomboideis ſerratis ſericeis, verticillis diſſitis. *Hall.* 267. *add.* 183.
Var. grandiflora γ. Galeopſis *Tetrahit*, LINN. *Flores Suec.* edit. II. 523.
H. in arenoſis ſterilibus *auf der Sandwieſe*, alibique rarius. Floret Julio.
Internodia *ramorumque baſis incraſſata.* Folia *ovato-lanceolata, pubeſcentia, mollia, ſubſerrata.* Verticilli *remoti, denſi, ſubtomentoſi.* Calyx *ſetis capitatis flavis adſperſus: laciniis ſubæqualibus, ſetaceis, brevibus.* Corollæ tubus *cylindricus, calyce quadruplo longior.* Faux *inflata, ſulcata.* Galea *fornicata, pubeſcens; apice ſubbifido, crenulato, reflexo.* Labium *maximum:* Denticulis *eminentibus incraſſatis;* Laciniis *crenulatis: lateralibus quadratis, intermedia dupla latiore emarginata. Colore albido, flavo, purpureoque pulcherrime ludit. Internodiis incraſſatis, a præcedente, Calycibus non ariſtatis verticilliſque remotis a ſequente differt. In hortum introducta, per plures annos faciem non mutavit.*

454. GALEOPSIS, *Tetrahit*, internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, verticillis ſummis ſubcontiguis, calycibus pungantibus. *Linn. N. S.* 393. *Spec.* 810. [*Hall.* 268.]
H. in agris & cultis, ad ſepes paſſim. Floret Julio & ſeq.

455. GALEOPSIS, *Galeobdolon*, verticillis ſexfloris: involucro tetraphyllo. *Linn. Spec.* 810. [*Cardiaca. Hall.* 275.]
H. in ſylvaticis umbroſis *am Homberg;* ad ſepes *am Heiligen-Floſs;* in cultis *am Sieghaus* rarius. Floret Majo & ſeq.
Caulis *repens, florens erectus,* Folia *hyeme albido-maculata.*

STACHYS. *G. P.* 719.

Corollæ labium ſuperius fornicatum; labium inferius lateribus reflexum: intermedia majore emarginata. *Stamina* deflorata verſus latera reflexa. *S. N.* 394.

456. STACHYS, *ſylvatica*, verticillis ſexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Linn. Spec.* 811. [*Cardiaca. Hall.* 276.]

H. in umbroſis, ad ſepes paſſim. Floret Junio & ſeq.

457. STACHYS, *paluſtris*, verticillis ſexfloris, foliis lineari - lanceolatis ſemiamplexicaulibus. *Linn. Spec.* 811. [*Stachys Hall.* 257.]

H. ad foſſas; in agris & cultis vitium peſſimum. Floret Junio, Julio.

458. STACHYS, *alpina*, verticillis multifloris, foliorum ſerraturis apice cartilagineis, corollis labio plano. *Linn. Spec.* 812. [*Hall.* 256.]

H. in montoſis aſperis ad pagos *Schönbach*; *Breitſcheid*; & alibi non infrequens. Floret Julio, Auguſto.

459. STACHYS, *germanica*, verticillis multifloris, foliorum ſerraturis imbricatis, caule lanato. *Linn. Spec.* 812. [*Hall.* 255.]

H. in montoſis aſperis *bey dem Eulenhauſe*; *auf dem Schätzelberg*; *am Beilſtein* frequens. Floret Julio & ſeq.

460. STACHYS, *annua*, verticillis ſexfloris, foliis ovato - lanceolatis trinerviis lævibus petiolatis, caule erecto. *Linn. S. N.* 395. *Spec.* 813. [*Betonica. Hall.* 263.]

H. in agris & arvis *am Dollberg* frequens; alibique rarius. Floret Julio, Auguſto.

461. STACHYS, *arvenſis*, verticillis ſexfloris, foliis obtuſis nudiuſculis, corollis longitudine calycis, caule debili. *Linn. S. N.* 395. *Spec.* 814. [*Trixago. Hall.* 231.]

H. in cultis *am Homberg* & *Dollberg* frequens; *auf dem Schieſsplatz* rarius. Floret Julio, Auguſto.

NEPETA. *G. P.* 710.

Cor. labium inferius lacinula intermedia crenata: faux margine reflexo. *Stamina* approximata. *S. N.* 390.

462. NEPETA, *Cataria*, floribus ſpicatis, verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Linn. Spec.* 796. [*Cataria. Hall.* 246.]
H. in ruderatis & ad ſepes hortorum; *am Steghaus* frequens. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. NEPETÆ Herba.

SATUREGIA. *G. P.* 707.

Corollæ laciniæ ſubæquales. *Stamina* diſtantia. *S. N.* 389.

463. SATUREGIA, *hortenſis*, pedunculis bifloris. *Linn. Spec.* 795.
H. in cultis *auf dem Hinterſand; am Steghaus*, alibique quaſi indigena rarius. Floret Julio, Auguſto.

BALLOTA. *G. P.* 720.

Cal. hypocrateriformis, 5-dentatus, 10-ſtriatus. *Corollae* labium ſuperius crenatum, concavum. *S. N.* 395.

464. BALLOTA, *nigra*, foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus acuminatis. *Linn. Spec.* 814. [*Ballote. Hall.* 259.]
H. ad ſepes *auf dem Schieſsplatz* alibique frequens. Floret Julio, Auguſto.

MARRUBIUM. *G. P.* 721.

Cal. hypocrateriformis, rigidus, 10-ſtriatus. *Corollæ* lab. ſuper. 2-fidum lineare rectum. *S. N.* 395.

465. MARRUBIUM, *vulgare*, dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. *Linn. Spec.* 816. [*Hall.* 258.]
H. in montoſis aſperis duris Thertotrophei; Seminibus hinc inde per me diſperſis, *auf dem Schieſsplatz* copioſe. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. MARRUBII ALBI Herba.

** *Calyces bilabiati.*

SCUTELLARIA. *G. P.* 734.

Calyx ore integro: poſt floreſcentiam clauſo, operculato. *S. N.* 403.

466. SCUTELLARIA, *galericulata*, foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Linn. Spec.* 835. [*Caſſida. Hall.* 280.]

H. ad foſſas & ripas *Dillæ*; *an der Muhlbach*; alibique frequens. Floret Julio, Auguſto.

THYMUS. *G. P.* 727.

Calycis bilabiati faux villis clauſa. *S. N.* 399.

467. THYMUS, *Serpyllum*, floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Linn. S. N.* 399. *Spec.* 825. [*Hall.* 235.]

α. Serpyllum vulgare majus; & minus. *Bauh. Pin.* 220.

β. Serpyllum vulgare minus capitulis lanuginoſis. *Tourn. inſtit.* 197.

H. α. in collibus ſiccis paſſim; β. in ſterilibus editioribus vento boreali expoſitis, *am Dollberg* & *Stützelberg* infrequens. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. α. SERPYLLI Herba, Flores.

468. THYMUS, *Acinos*, floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. *Linn. S. N.* 399. *Spec.* 826. [*Clinopodium. Hall.* 237.]

H. in collibus ſiccis *am Homberg*, *Dollberg* & alibi frequens. Floret Julio, Auguſto.

Labii *lacinia intermedia emarginata.*

PRUNELLA. *G. P.* 735.

Filamenta bifurca: altero apice antherifera. *Stigma* bifidum. *S. N.* 404.

469. PRUNELLA, *vulgaris*, foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis. *Linn. Spec.* 837. [*Brunella. Hall.* 277.]

β. Foliis integerrimis, ſpicis majoribus, bracteis non coloratis, corollis albis.

H. α. in pratis, pomariis & paſcuis paſſim; β. in aſperis ſylvaticis *in der Hörre* frequens; *auf dem Homberg* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. α. PRUNELLÆ Herba.

470. PRUNELLA, *laciniata*, foliis ovato-oblongis petiolatis: ſupremis quatuor lanceolatis dentatis. *Linn. Spec.* 837. [*Hall.* 279.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Beilſtein*; *am Güldners-Grund*; *am Homberg* partius. Floret Julio, Auguſto.

Exceptis foliis ſupremis, omnibus in partibus cum præcedente convenit, cujus varietas eſt.

ORIGANUM. *G. P.* 726.

Strobilus tetragonus, ſpicatus, calyces colligens. *S. N.* 399.

471. ORIGANUM, *vulgare*, ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Linn. Spec.* 824. [*Hall.* 233.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg*, *Rehberg* & *Dollberg* copioſe. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. ORIGANI VULGARIS Herba.

CLINOPODIUM. *G. P.* 725.

Involucrum multiſetum, verticillo ſubjectum. *S. N.* 398.

472. CLINOPODIUM, *vulgare*, capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis. *Linn. Spec.* 821. [*Hall.* 239.]

H. montoſis ſylvaticis *am Homberg*; *Beilſtein*, alibique frequens. Floret Julio, Auguſto.

B. *ANGIOSPERMIA.*

* *Calyces biſidi.*

OROBANCHE. *G. P.* 779.

Cal. 2-fidus. *Cor.* ringens. *Capſ.* 1-locularis, 2-valvis, polyſperma. *Glandula* ſub baſi germinis. *S. N.* 422.

473. OROBANCHE, *major*, caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexſertis. *Linn. Spec.* 882. [*Hall.* 295.]

H. in pratis & agris ſterilibus *im Ebersbacher Grund.* Plantam ipſe nondum legi, ab ruſtico mihi adlatam tantum vidi. Floret Junio.

** *Calyces quadrifidi.*

LATHRÆA. *G. P.* 743.

Cal. 4-fidus. *Glandula* depreſſa, ad baſin ſuturæ germinis. *Capſula* 1-locularis. *S. N.* 406.

474. LATHRÆA, *Squamaria*, caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. *Linn. Spec.* 844. [*Squamaria. Hall.* 297]

H. in nemoroſis umbroſiſſimis *im Hirſchberg* parcius. Floret Majo. +

EUPHRASIA. *G. P.* 741.

Cal. 4-fidus, cylindricus, *Capſ.* 2-locularis, ovato-oblonga. *Antheræ* inferiores altero lobo baſi ſpinoſæ. *S. N.* 405.

475. EUPHRASIA, *officinalis*, foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Linn. Spec.* 841. [*Hall.* 303.]

H. in paſcuis ſterilibus, pratis & pomariis paſſim. Floret Julio. *Pharm.* EUPHRASIÆ Herba.

Infertorum Antherarum *infimus lobus tantum apice ſpinula terminatus.*

476. EUPHRASIA, *Odontites*, foliis linearibus omnibus ſerratis. *Linn. Spec.* 841. [*Odontites. Hall.* 304.]

H. in agris ſterilibus *bey dem Kalkofen* copioſe; locis humentibus *an der Mühlbach*, *bey der untern Walkmühle* frequens. Floret Julio, Auguſto.

Corolla *a priori diverſiſſima.* Galea *compreſſa, vix emarginata.* Labii *inferiores tres lobi Galea breviores, æquales, truncati, crenulati. Lobi* Antherarum *omnes apice ſpinoſi, baſi barbati.*

RHINANTHUS. *G. P.* 740.

Cal. 4-fidus, ventricoſus. *Capſula* 2-locularis, obtuſa, compreſſa. *S. N.* 405.

477. RHINANTHUS, *Criſta galli*, corollis labio ſuperiore compreſſo breviore. *Linn. S. N.* 405. *Spec.* 840.

ɩ. Alectorolophus calycibus glabris. HALL. 313.
β. Alectorolophus calycibus hirſutis. HALL. 314.
H. α. in pratis ſiccis paſſim, β. caule altiori magis diviſo; calycibus pubeſcentibus, corollarum roſtris violaceis: in pratis humentibus *auf der Ähr*, & alibi frequens. Floret α. Majo, β. Junio.

MELAMPYRUM. *G. P.* 742.

Cal. 4-fidus. *Corollæ* lab. ſuper. compreſſum, margine replicato. *Capſ.* 2-locularis obliqua, hinc dehiſcens. *Semina* 2, gibba. *S. N.* 406.

478. MELAMPYRUM, *criſtatum*, ſpicis quadrangularibus: bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis. *Linn. Spec.* 842. [*Hall.* 311.]
H. in pratis & paſcuis ſiccis *am Homberg über der Lithaa; am Rehberg; am Stürzelberg* frequens. Floret Julio.

479. MELAMPYRUM. *arvenſe*, ſpicis conicis laxis: bracteis dentato ſetaceis coloratis. *Linn. Spec.* 842. [*Hall.* 310.]
H. in agris inter ſegetes paſſim. Floret Junio, Julio.

480. MELAMPYRUM, *pratenſe*, floribus ſecundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis clauſis. *Linn. S. N.* 406. *Spec.* 843. [*Hall.* 308.]
H. in pratis ſylvaticis *am Homberg* frequens. Floret Junio, Julio.

481. MELAMPYRUM, *ſylvaticum*, floribus ſecundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Linn. S. N.* 406. *Spec.* 843. [*Hall.* 307.]
H. in ſylvaticis montoſis *auf der Steinſeite* rarius. Floret Junio, Julio. +

*** *Calyces quinquefidi.*

LIMOSELLA. *G. P.* 776.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-fida, æqualis. *Stamina* per paria approximata. *Capſ.* 1-locularis, 2-valvis, polyſperma. *S. N.* 421.

482. LIMOSELLA, *aquatica. Linn. Spec.* 881. [*Hall.* 300.]
H. in aquis ſtagnantibus *bey der untern Walkmühle*; ad viam publicam *in der untern Pitze*; in rivulis *auf der Herrnwieſe, unter dem Bockshayn*, alternis annis plus minusve frequens. Floret Julio, Auguſto.

SCROPHULARIA. *G. P.* 756.

Cal. 5-fidus. *Cor.* ſubgloboſa, reſupinata. *Capſula* 2-locularis. *S. N.* 413.

483. SCROPHULARIA, *nodoſa*, foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Linn. S. N.* 413. *Spec.* 863. [*Hall.* 326.]
H. in foſſis, ad vias *bey der Walkmühle*, & alibi paſſim. Floret Junio, Julio.
Pharm. SCROPHULARIÆ Radix.

484. SCROPHULARIA, *aquatica*, foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Linn. Spec.* 864. [*Hall.* 325.]
H. in aquoſis, *an der Mühlbach* alibique frequens. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. SCROPHULARIÆ Herba.

485. SCROPHULARIA, *vernalis*, foliis cordatis, pedunculis axillaribus ſolitariis dichotomis. *Linn. Spec.* 864. [*Hall.* 327.]
H. in aquoſis *am Pitzbrückgen*; ad ſepes *am Sieghäuſer Weg*. Floret Majo.
Planta alias non indigena, ſeminibus per me diſperſis annatim locis indicatis provenit.

DIGITALIS. *G. P.* 758.

Cal. 5-partitus. *Cor.* campanulata, 5-fida, ventricoſa. *Capſ.* ovata, 2-locularis. *S. N.* 414.

486. DIGITALIS, *purpurea*, calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtuſis: labio ſuperiore integro. *Linn. Spec.* 866. [*Hall.* 330.]
H. in ſylvaticis montoſis ad Heyer, *Frohnhauſen* & *Burbach* copioſe. Corollis albis ludit. Floret Junio, Julio.

487. DIGITALIS, *lutea*, calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis: labio ſuperiore bifido. *Linn. Spec.* 867.

β. Digitalis foliis calycinis lanceolatis, galea inciſa, faucibus maculoſis. HALL. 331. Digitalis *ambigua*. MURRAY *Prodr. St. Gœtt.* 62.

H. β. in ſylvaticis montoſis *im Thiergarten*, *an der Rüſterbach* rarius. Floret Junio, Julio.

Planta præcedente tenerior, ſubviſcida; imprimis differt: Caule *bipedali*, *ſubpubeſcente*; Foliis *ſupra glabris*, *ſubtus ſubpubeſcentibus*, *venis anaſtomoſantibus nullis*, *margine leviſſime & argute ſerratis*; Racemo *apice nutante*; Bracteis *anguſtioribus*, *obtuſioribus*; Calycinis Foliolis *lanceolatis*; Corolla *paulo minore*, *molliſſime pubeſcente*, *pallide flava*, *intus piloſa fuſco-maculata*: *Labio ſuperiore breviſſimo*, *obtuſiſſimo*, *bifido*, *laciniis lateralibus inferioreque acutis*; Stylo *recto*; Stigmate *bifido*, *connivente*; Capſulis *ſecundis*, *remotis*, *ovato-oblongis*, *acuminatis*, *calyce duplo longioribus*.

ANTIRRHINUM. *G. P.* 750.

Cal. 5-phyllus. *Corollæ* baſis deorſum prominens, nectarifera. *Capſ.* 2-locularis. *S. N.* 409.

488. ANTIRRHINUM, *Elatine*, foliis haſtatis alternis, caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 851. [*Hall.* 340.]

H. in arvis & agris *am Dollberg*; *auf dem Reuterberg*; in cultis *auf dem Steghäuſer Weg* frequens. Floret Julio, Auguſto.

489. ANTIRRHINUM, *ſpurium*, foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 851. [*Hall.* 341.]

H. in arvis *am Homberg*, *Rehberg*, jam dudum lecta, nunc viſu rarior planta. Floret Junio, Julio.

490. ANTIRRHINUM, *arvenſe*, foliis ſublinearibus: inferioribus quaternis, calycibus piloſo-viſcidis, floribus ſpicatis, caule erecto. *Linn. Spec.* 855. var. α.

H. in agris & arvis *am Dollberg* frequens; *am Homberg*, alibique rarius. Floret Julio.

Radix *annua.* Caulis *dodrantalis ſ. pedalis, ſimpliciuſculus; erectus, lævis, infra ſpicam nudus.* Folia *linearia: inferiora terna, quaterna, rarius quina; ſuperiora ſparſa, ex quorum alis ſæpe ramuli ſteriles.* Spica *terminalis, floribus confertis.* Bracteæ *lineares reflexæ, longitudine floris.* Calycina *foliola ſubinæqualia lanceolata, uti germinis apex pilis capitatis adſperſa.* Corolla *cærulea, odorata:* Tubus *baſi ventricoſus;* Calcari *tenui recurvo, bractea breviore;* Laciniæ *duæ ſuperiores acutiuſculæ: inferiores tres aquales, breviſſimæ, obtuſæ.* Capſulæ *ſubremotæ, obovatæ, ſtriatæ, apice ſexvalvi dehiſcentes,* Valvulam *intermediam utrinque deponentes.* Semina *margine membranaceo cincta uti in* A. *Linaria.*

491. ANTIRRHINUM, *minus*, foliis plerisque alternis lanceolatis obtuſis, caule ramoſiſſimo diffuſo. *Linn. Spec.* 852. [*Hall.* 335.]

H. in agris & arvis *am Dollberg, Homberg, auf dem Schieſsplatz;* & alibi frequens. Floret Julio, Auguſto.

492. ANTIRRHINUM, *Linaria*, foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *Linn. Spec.* 858. [*Hall.* 336.]

β. PELORIA, proles hybrida. LINN. S.N. 411. *Spec.* 859. *Amœn, acad. I. p.* 55. *T.* 3.

H. α. in cultis & ruderatis *auf dem Hinterſand, am Sieghaus;* & alibi frequens. Floret Julio, Auguſto.

β. PELORIAM Anno 1769 legi: ad verſuras *auf der Weisgärberwieſe*, & copioſius *am Waſſergraben hinter dem Bockshayn.* Floret Julio.

Pharm. α. LINARIÆ Herba.

PELORIÆ (*in meis ſpeciminibus*) Radix, Caulis, Foliaque *uti in* A. *Linaria.* Spicæ *flores inferiores* A. *Linariæ; duo vel tres terminali proximi, bi- ſeu tricalcarati;* Flos terminalis PELORIÆ. Calyx 5-*fidus, æqualis; vel duobus calycibus confluentibus* 10-*fidus, inæqualis.* Corolla *regularis, flava:* Tubus *ventricoſus, baſi in quinque cornua ſubulata, incurva, longitudine corollæ diviſus, collo cylindrico contracto;* Limbus 5-*fidus, laciniis æqualibus brevibus, obtuſis, reflexis, tubi collo adpreſſis; non patulis;* Palatum *gibbum: eminentiis quinque tumidis, conniventibus, villoſis, fulvis, intra tubum decurrentibus.* Stamina 5, *inæqualia, receptaculo nec tubo inſerta.* Antheræ *ovales.* Piſtillum *imperfectum, abortiens.* In hortum introducta, inſequente anno in A.

Linariam

Linariam tranſit. Simillimam metamorphoſin in Viola *martia* obſervavi.

493. Antirrhinum, *Orontium*, corollis ecaudatis, floribus ſubſpicatis, calycibus corolla longioribus. *Linn. S. N.* 411. *Spec.* 860. [*Hall.* 334.]
H. in agris & arvis *am Dollberg* & *Galgenberg* frequens; Corollis albis *auf dem Schiefsplatz* rarius. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. Antirrhini Herba.

Pedicularis. *G. P.* 746.

Cal. 5-fidus. *Capſ.* 2-locularis, mucronata, obliqua. *Semina* tunicata. *S. N.* 407.

494. Pedicularis, *paluſtris*, caule ramoſo, calycibus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio obliquis. *Linn. S. N.* 407. *Spec.* 845. [*Hall.* 320.]
H. in pratis uliginoſis ad pagum *Sim* copioſe. Floret Junio, Julio.
Pharm. Pedicularis Herba.

495. Pedicularis, *ſylvatica*, caule ramoſo, calycibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato. *Linn. Spec.* 845. [*Hall.* 321.]
H. in pratis ſylvaticis humidis *im Pulversgrund*, *am Beilſtein* rarius; ad pagos *Hörbach* & *Schönbach* frequens. Floret Majo, Junio.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

A. SILICULOSA.

* *Silicula integra, nec apice emarginata.*

Draba. *G. P.* 800.

Silicula integra, ovali-oblonga: valvis planiuſculis, diſſepimento parallelis. *Stylus* nullus. *S. N.* 432.

496. Draba, *verna*, ſcapis nudis, foliis ſubſerratis. *Linn. S. N.* 432. *Spec.* 896. [*Hall.* 496.]

H. in collibus ſterilibus, agris & arvis ubique. Floret Martio, Aprili.

LUNARIA. *G. P.* 809.

Silicula integra, elliptica, compreſſo-plana; pedicellata: valvis diſſipimento æqualibus, parallelis, planis. *Calyx* foliolis ſaccatis. *S. N.* 438.

497. LUNARIA, *rediviva*; foliis alternis. *Linn. Spec.* 911. [*Hall.* 500.]

H. in rupibus *bey den Steinkammern* ad pagum *Erbach.* Floret Majo, Junio.

MYAGRUM. *G. P.* 796.

Silicula ſtylo conico terminata; loculo ſubmonoſpermo. *S. N.* 431.

498. MYAGRUM, *ſativum*, ſiliculis obovatis pedunculatis polyſpermis. *Linn. Spec.* 894. [*Alyſſum. Hall.* 489.]

H. in agris inter Linum *in der Aue* vulgare. Floret Junio, Julio.

** *Silicula emarginata apice.*

ALYSSUM. *G. P.* 805.

Filamenta quædam introrſum denticulo notata. *Silicula* emarginata. *S. N.* 435.

499. ALYSSUM, *calycinum*, caulibus herbaceis, ſtaminibus omnibus dentatis, calycibus perſiſtentibus. *Linn. Spec.* 908.

H. in arvis ſterilibus *am Beilſtein* rarius. Floret Junio, Julio. +.

500 ALYSSUM, *campeſtre*, caule herbaceo, ſtaminibus ſtipatis pari ſetarum, calycibus deciduis. *Linn. Spec.* 909. [*Hall.* 494. *ſecund. deſcript.*]

H. in agris, & arvis ſterilibus *am Dollberg*; alibique frequens. Floret Majo, Junio.

Petala *apice bifida, flava, dein albida, Calyce paulo longiora. Setæ duæ ad latus ſinguli Filamenti brevioris, receptaculo inſertæ.* Calyx *ad maturitatem fere ſiliculæ, non vero ad dehiſcentiam uſque valvularum perſiſtens.*

COCHLEARIA. *G. P.* 803.

Silicula emarginata, turgida, ſcabra: valvulis gibbis obtuſis. *S. N.* 434.

501. COCHLEARIA, *Coronopus*, foliis pinnatifidis, caule depreſſo. *Linn. S. N.* 435. *Spec.* 904. [*Coronopus. Hall.* 502.]
H. in collibus apricis nudis, *im Beilſtein* rarius. Floret Julio, Auguſto.

502. COCHLEARIA, *Armoracia*, foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Linn. Spec.* 904. [*Naſturtium. Hall.* 504.]
H. in foſſis *an der Dille; auf der Sandwieſe* rarius. Floret Julio.
Pharm. ARMORACIÆ Radix.

LEPIDIUM. *G. P.* 801.

Silicula emarginata, cordata, polyſperma: valvulis carinatis contrariis. *S. N.* 433.

503. LEPIDIUM, *ſativum*, floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Linn. Spec.* 899.
H. in cultis inter olera *am Steghauſer Weg*, alibique rarius. Floret Julio, Auguſto.

THLASPI. *G. P.* 802.

Silicula emarginata, obcordata, polyſperma: valvulis navicularibus, marginato-carinatis. *S. N.* 434.

504. THLASPI, *arvenſe*, ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Linn. Spec.* 901. [*Naſturtium Hall.* 511.]
H. in agris & cultis *auf dem Dollberg*; alibique vulgaris. Floret Majo, Junio.
Pharm. THLASPEOS Semina.

505. THLASPI, *campeſtre*, ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis. *Linn.* 902. [*Naſturtium. Hall.* 509.]
H. in campis & arvis ſterilibus *auf der Höhle*; alibique vulgaris. Floret Majo, Junio.

506. THLASPI, *montanum*, ſiliculis obcordatis, foliis glabris: radicalibus carnoſis obovatis integerrimis, caulinis amplexicaulibus, corollis calyce majoribus. *Linn. Spec.* 902. [*Lepidium. Hall.* 518.]

H. in ſylvaticis montoſis muſcoſis *am Homberg* & *Galgenberg* frequens. Floret Aprili, Majo.

Radix *biennis*. Caulis *ſpithamæus*, *erectus*, *ſubramoſus*. Folia radicalia *numeroſa*, *ſubdentata*, *rarius integra*, *infima petiolata*: caulina *cordato-oblonga*, *amplexicaulia*, *ſinuato-dentata*. Corymbi Flores *ante explicationem purpurei*. Calyx *æqualis*, *erecto-patulus*. Petala *alba*, *calyce duplo longiora*. Stamina *diſtantia*, *longitudine fere petalorum*: Antheris *purpureis*. Stylus *longitudine Germinis*. Silicula *oblongo-obcordata*, *ſubtus convexa*, *margine tenui acuto cincta*. Semina 6 f. 8.

507. THLASPI, *perfoliatum*, ſiliculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris ſubdentatis, petalis longitudine calycis, caule ramoſo. *Linn. Spec.* 902. [*Naſturt. Hall.* 510.]

H. in arvis & campis ſterilibus ad pagum *Ballersbach* rarius. Floret Majo.

508. THLASPI, *Burſa paſtoris*, ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Linn. Spec.* 903. [*Naſturt. Hall.* 514.]

H. in agris, arvis & cultis paſſim. Floret tota æſtate.
Pharm. BURSÆ PASTORIS Herba.

B. *SILIQUOSÆ.*

* *Calyx clauſus foliolis longitudinaliter conniventibus.*

RAPHANUS. *G. P.* 822.

Cal. clauſus. *Siliqua* toroſa, ſubarticulata, teres. *Glandulæ* melliferæ 2 inter ſtamina breviora & piſtillum, totidem inter ſtamina longiora & calycem. *S. N.* 445.

509. RAPHANUS, *Raphaniſtrum*, ſiliquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Linn. Spec.* 935. [*Hall.* 468.]

H. inter ſegetes æſtivas, alibique frequens. Floret Junio, Julio.
Corollæ Petala *flava*; *albida venis violaceis in noſtrate rariſſima.*

ERYSIMUM. *G. P.* 814.

Siliqua columnaris, exacte tetraëdra. *Calyx* clauſus. *S. N.* 441.

510. ERYSIMUM, *officinale*, ſiliquis ſpicæ adpreſſis, foliis runcinatis. *Linn. Spec.* 922. [*Hall.* 478.]
H. in cultis & ruderatis, ad vias vulgaris. Floret æſtate.
Pharm. ERYSIMI Herba.

511. ERYSIMUM, *Barbarea*, foliis lyratis extimo ſubrotundo. *Linn. Spec.* 922. [*Hall.* 479.]
H. in foſſis, ad ripas *Dullæ* frequens. Floret Majo.

512. ERYSIMUM, *Alliaria*, foliis cordatis. *Linn. Spec.* 922. [*Hall.* 480.]
H. in pomariis ad ſepes paſſim. Floret Majo & ſeq.
Pharm. ALLIARIÆ Herba.

513. ERYSIMUM, *cheyranthoides*, foliis lanceolatis integerrimis, ſiliquis patulis. *Linn. S. N.* 441. *Spec.* 923. [*Hall.* 477.]
H. in arvis *am Dollberg*; in ruderatis *auf dem Hinterſand* rarius. Floret Junio, Julio.

ARABIS. *G. P.* 813.

Glandulæ nectariferæ 4, ſingulæ intra calycis foliola, ſquamæ inſtar reflexæ. *S. N.* 443.

514. ARABIS, *thaliana*, foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Linn. Spec.* 929. [*Hall.* 452.]
H. in arvis & agris ſterilibus paſſim. Floret Aprili, Majo.
Folia radicalia *ſubſerrata*, *ſetis furcatis ſcabra.*

BRASSICA. *G. P.* 820.

Cal. erectus, connivens. *Sem.* globoſa. *Glandula* inter ſtamina breviora & piſtillum, interque longiora & calycem. *S. N.* 444.
a. *Stylo obtuſiuſculo.*

515. BRASSICA, *campeſtris*, radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 931. [*Eruca. Hall.* 457.]
H. in agris inter Hordeum ad pagos *Amdorf* & *Burgk* parcius. Floret Junio.

516. BRASSICA, *Napus*, radice cauleſcente fuſiformi. *Linn. Spec.* 931.

H. in agris inter ſegetes alibique frequens. Floret Majo. *Pharm.* NAPI Semina.

b. Eruca *ſiliquis ſtylo enſiformi.*

517. BRASSICA, *Erucaſtrum*, foliis runcinatis, caule hiſpido, ſiliquis lævibus. *Linn. S. N.* 444. *Spec.* 932. [*Eruca. Hall.* 459.]

H. ad vias & margines agrorum ad pagum *Fleisbach* rarius. Floret Junio & ſeq.

[illegible]. TURRITIS. *G. P.* 819.

Siliqua longiſſima, angulata. *Calyx* connivens, erectus. *Corolla* erecta. *S. N.* 443.

518. TURRITIS, *Braſſica*, foliis omnibus glabris: caulinis cordato-ſagittatis amplexicaulibus, radicalibus ovatis petiolatis.

BRASSICA, *alpina. Linn. S. N.* 444. *Mantiſſ.* 95. (*Turritis.* Hall 454.)

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg* & *Beilſtein* parcius; in nemoroſis ad *Erbach* & *Breitſcheid* frequens. Floret Majo.

Radix *perennis.* Caulis *ſimplex, ſeſquipedalis, erectus, teres, glaber.* Folia radicalia *petiolata, ovata, firma, glabra, ſubtus rubra: marginalibus denticulis exiguis, calloſis, remotis; ſub plantæ floreſcentia emarcida, fere nulla.* Folia caulina *amplexicaulia, patentia, glabra, cordato-ſagittata, acuminata, carinata, integerrima, glauca, ſubtus albidiora.* Corymbus *anguſtatus.* Calycis Foliola *erecta, ſubconniventia flaveſcentia: quorum duo latiora convexa, duo oppoſita anguſtiora plana, paulo longiora.* Petala *alba, lineari-oblonga, obtuſiſſima, calyce duplo longiora: unguibus erectis, lamina (loco natali umbroſo) erecto-patente.* Stamina *duo longitudine calycis, totidem* Glandulis *nectariferis inſerta; quatuor calyce longiora, nulla glandula inſtructa:* Antheris *ſagittatis, flavis, apice reflexis.* Germen *ſubtetragonum, fuſco-purpureum, longitudine ſtaminum.* Stylus *nullus.* Stigma *obtuſum, capitatum.* Siliqua *longiſſima, ſtricta, erecta pedunculo patente, obtuſa, tetragona: angulis duobus oppoſitis ſubcompreſſis;* Diſſepimento *valvulis ſubæquali, apice non prominente.* Semina *numeroſa, obovata, compreſſa, ſubemarginata.*

519. TURRITIS, *glabra*, foliis radicalibus dentatis hiſpidis; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Linn. Spec.* 930. [*Hall.* 455]

H. ad margines agrorum *bey der Weiſsgarberwieſe*; in ſylvaticis montoſis *am Rehberg*, alibique. Floret Junio.

520. TURRITIS, *hirſuta*, foliis omnibus hiſpidis; caulinis amplexicaulibus. *Linn. Spec.* 930. [*Hall.* 456.]

H. in ſylvaticis theriotrophei rarius. Floret Junio.

DENTARIA. *G. P.* 811.

Siliqua elaſtice diſſiliens valvulis revolutis. *Stigma* emarginatum. *Calyx* longitudinaliter connivens. *S. N.* 438.

521. DENTARIA, *bulbifera*, foliis inferioribus pinnatis, ſummis ſimplicibus. *Linn. Spec.* 912. [*Hall.* 470.]

H. in ſylvis, *in der Hörre*; *im Hirſchberg* frequens. Floret Majo.

** *Calyx hians foliolis ſuperne diſtantibus.*

CARDAMINE. *G. P.* 812.

Siliqua elaſtice diſſiliens valvulis revolutis. *Stigma* integrum. *Calyx* ſubhians. *S. N.* 438.

522. CARDAMINE, *impatiens*, foliis pinnatis inciſis ſtipulatis, floribus apetalis. *Linn. Spec.* 914. [*Hall.* 471.]

H. in ſylvaticis humidis *im Hirſchberg* frequens. Floret Majo. Radix *biennis*. Caulis *acutangulus*, *lævis*. Stipulæ *piloſæ*. Flos *in noſtrate conſtanter apetalus*.

523. CARDAMINE, *parviflora*, foliis pinnatis exſtipulatis, foliolis lanceolatis obtuſis, floribus corollatis. *Linn. S. N.* 439. *Spec.* 914

Cardamine caule foliisque hirſutis, pinnis ſubrotundis. *Hall.* 472 α. addend. III. 184.

H. in nemoroſis umbroſis humidis *im Hirſchberg* ad pagum *Gundersdorf*. Floret Majo.

Radix *annua*. Caulis *ultra medium uſque*, Petioli & Folia *inferiora pilis raris patulis ſubhirta*. Stipulæ *nullæ*, Flores *magnitudine* T. *Burſæ paſtoris*. Petala 4. *alba*. Stamina *ſex*.

524. CARDAMINE, *hirſuta*, foliis pinnatis, floribus tetrandris. *Linn. Spec.* 915.

Cardamine tetraſtemon, caule glabro, foliis ſubhirſutis, imis ſubrotundis. *Hall.* 472. β. add. III. 184.

H. in arvis & paſcuis ſterilibus *auf der Sandwieſe*; olim lecta, nunc rariſſima planta. Floret Junio.

Flores *paulo majores quam in præcedente.* Petala *alba.* Stamina 4: *duo breviora ſemper deficientia.*

525. CARDAMINE, *pratenſis*, foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis. *Linn. Spec.* 915. [*Hall.* 473.]

H. in pomariis & pratis humidis paſſim. Floret Majo.

526. CARDAMINE, *amara*, foliis pinnatis, axillis ſtoloniferis. *Linn. Spec.* 915. [*Hall.* 474.]

H. in nemoroſis ad pagos *Sinn* & *Gundersdorf*; ſecus rivulos *im Zwinger*; *an der Mühlbach* parcius. Floret Majo.

SINAPIS. *G. P.* 821.

Cal. patens. *Cor.* ungues recti. *Glandula* inter ſtamina breviora & piſtillum, interque longiora & calycem. *S. N.* 444.

527. SINAPIS, *arvenſis*, ſiliquis multangulis toroſoturgidis lævibus roſtro ancipiti longioribus. *Linn. S. N.* 444. *Spec.* 933. [*Sinapi. Hall.* 467.]

H. in agris inter ſegetes æſtivas, alibique vulgatiſſima. Floret Majo & ſeq.

SISYMBRIUM. *G. P.* 813.

Siliqua dehiſcens valvulis rectiuſculis. *Calyx* patens. *Corolla* patens. *S. N.* 439.

a. *Siliquis declinatis brevibus.*

528. SISYMBRIUM, *Naſturtium aquaticum*, ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis. *Linn. Spec.* 916. [*Hall.* 482.]

H. in rivulis, ad ſcaturigines, in ſylvaticis udis ad *Breitſcheid* & *Langenaubach* frequens. Floret Junio.

Pharm. NASTURTII AQUATICI Herba.

529. SISYMBRIUM, *ſylveſtre*, ſiliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Linn. S. N.* 439. *Spec.* 916. [*Hall.* 485.]

H. ad margines foſſarum *auf der Sandwieſe*, jam dudum lecta. Floret Junio.

530. SISYMBRIUM, *amphibium*, ſiliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ſerratis. *Linn. Spec.* 917.

α. *paluſtre.* Radicula foliis pinnatis, pinnis dentatis, petalis calyce brevioribus. *Hall.* 487.

β. *aquaticum.* Radicula foliis integris, aut pinnatifidis, petalis calyce longioribus. *Hall.* 486. α.

γ. *terreſtre.* Radicula foliis inferioribus ovatis ſerratis, ſuperioribus ſemipinnatis. *Hall.* 486. β.

H. α. in foſſis *im Judenweyher*; β. ad ripas *Dillæ*; γ. *an der Mühlbach* alibique. Floret Majo & ſeq.

b. *Caule nudo.*

521. SISYMBRIUM, *arenoſum*, caule ſubfolioſo ramoſo, foliis lyratis rectangulo-dentatis hiſpidis: pilis ramoſis. *Linn. Spec.* 919. [*Eruca. Hall.* 462.]

H. in arvis & pratis ſterilibus *hinter dem Homberg* rarius. Floret Majo.

Petala *violacea.* Foliorum *ſetæ bi-ſ. trifidæ, caulinæ ſimplices.*

c. *Foliis pinnatis.*

532. SISYMBRIUM, *Sophia*, petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. *Linn. Spec.* 920. [*Hall.* 484.]

H. in ruderatis *auf dem Hinterſand*, alibique rarius. Floret Majo, Junio.

Pharm. SOPHIÆ Semina.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA

A. *DECANDRIA.*

GERANIUM. G. P. 832.

Monogyna. *Stigmata* 5. *Fructus* roſtratus, 5-coccus. *S. N.* 452.

a. *Staminibus quinque antheriferis.*

533. GERANIUM, *cicutarium*, pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis obtuſis, caule ramoſo. *Linn. S. N.* 454. *Spec.* 951. [*Hall.* 944.]

H. in arvis ruderatis & cultis paſſim. Floret Aprili & ſeq. Vernalis Planta Caule *nullo*, Scapo *radicali*, Petalis *ſuperioribus duobus macula notatis*; æſtivalis Caule *ramoſo, procumbente*, Petalis *omnibus immaculatis. In hoc & ſequentibus ſub ſingulo filamento breviore*, Squama *nectarifera exigua.*

534. GERANIUM, *puſillum*, pedunculis bifloris, petalis emarginatis, caule depreſſo, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis. *Linn. N. S.* 456. *Spec.* 957. [*Hall.* 940.]

H. in ſterilibus ad ſepes hortorum, *am Homberg*, alibique frequens. Floret Majo.

Radix *annua.* Caules *plures, depreſſi, procumbentes, ramoſi, diffuſi, læves, ſeu pube vix per lentem conſpicua tactu molles.* Folia radicalia *ſeptiloba*, caulina *omnia oppoſita, quinqueloba: lobis linearibus, trifidis, acutis*: Stipulis *piloſis*; Petiolis Pedunculisque *depreſſis.* Bracteæ 4, *lanceolatæ, ſubpiloſæ.* Pedicelli *declinati, demum erecti, apice incraſſati.* Calycina foliola *mutica, piloſa.* Petala *obcordata, cærulea, calyci non longiora.* Stamina 5 *caſtrata*, 5 *antherifera*: Antheris *cærulescentibus.* Stigmata *albida, patula.* Roſtrum Fructus *tenue, breve.* Arilli *fuſci, nitidi, læves, per lentem ſetis ſurſum adpreſſis veſtiti.*

b. *Staminibus* 10 *antheriferis.*

535. GERANIUM, *ſylvaticum*, pedunculis bifloris, foliis ſubpeltatis quinquelobis inciſo-ſerratis, caule erecto, petalis emarginatis, *Linn. Spec.* 954. [*Hall.* 932.]

H. in ſylvaticis *im Hirſchberg*; ad pagos *Breitſcheid* & *Langenaubach*, alibique rarius. Floret Majo, Junio.

Caulis *ſeſquipedalis, erectus, teres, glaber, nudus, ſuperne dichotomus, folioſus.* Pedunculi *ex caulis diviſionibus & axillis foliorum ſuperiorum, erecti, bi- rarius triflori. terminales plures* (*ſæpe* 4) *ſubuniflori, faſtigiati.* Pedicelli *breves, apice vix incraſſati, ſub & poſt floreſcentiam erecti.* Flos *campanulato-patens,* Calycina *foliola ſubvilloſa, ariſtata: ariſta*

fructu maturo recurvis. Petala *ſubemarginata, cœrulea, venis 5 purpureis.* Stigmata *erecta.*

536. GERANIUM, *paluſtre*, pedunculis bifloris longiſſimis declinatis, petalis integris, foliis quinquelobis inciſis. *Linn. Spec.* 954. [*Hall.* 933.]

H. in foſſis & dumetis ad margines pratorum *bey der untern Papiermühle*, alibique frequens. Floret Julio.

Caulis *ſæpe cubitalis, obliquus, ſubprocumbens, pubeſcens, ſexangulatus, angulis obtuſis: duobus oppoſitis depreſſioribus; geniculis valde incraſſatis; ramis divaricatis.* Pedunculi *biflori, longi.* Pedicelli *longi poſt floreſcentiam declinati, apice incraſſati.* Flos *patens.* Calycis *foliola nervoſa, lævia, ariſtata: ariſtis maturo fructu erectis.* Petala *magna, integra, ſubſanguinea, venis 7 ſaturatioribus.* Stigmata *recurva.*

537. GERANIUM, *pratenſe*, pedunculis bifloris, foliis ſubpeltatis multipartitis rugoſis acutis, petalis integris. *Linn. S. N.* 455. *Spec.* 954. [*Hall.* 931.]

H. in pratis ſucculentis ad *Erbach*, infrequens. Floret Julio.

Plantam hanc mihi adhuc dubiam, nondum ſufficienter examinare licuit.

538. GERANIUM, *robertianum*, pedunculis bifloris, calycibus piloſis decemangulatis. *Linn. Spec.* 955. [*Hall.* 943.]

H. in umbroſis, ad ſepes frequens. Floret Majo & ſeq.

Pharm. GERANII ROBERTIANI Herba.

539. GERANIUM, *molle*, pedunculis bifloris foliisque floralibus alternis, petalis bifidis calycibus muticis, caule erectiuſculo. *Linn. S. N.* 455. *Spec.* 955? [*Hall.* 939?]

H. in cultis, ad ſepes hortorum *am Dollberg* & *Homberg* infrequens. Floret Majo, Junio.

Tota Planta tactu molliſſima. Caules *pauci, erectiuſculi, vix ramoſi: pilis raris patulis adſperſi.* Folia radicalia *ſemiſeptiloba;* Caulina *alterna, remota, quinqueloba: lobis ſubtrifidis, obtuſis.* Stipulæ 4 *emarcidæ.* Pedunculi *oppoſitifolii, alterni, piloſi.* Bracteæ 4 *exiguæ, rubræ.* Pedicelli *reflexo-declinati, apice vix incraſſati.* Calycina Foliola *ovata, mutica, mucrone breviſſimo rubro.* Petala *ſemibifida, ſubſanguinea, venis tribus ſaturatioribus, calyci longiora.* Stamina *omnia antherifera.* Antheris *cœruleis.* Stigmata *patula, purpurea.* Fructus *roſtrum breve, craſſiuſculum, 5 ſulcatum, læve.* Arilli *nudi transverſim rugoſi.* Caules *in culta Planta ramoſiores;*

Foliorum *lobi obtuſiſſimi.* His notis a G. *puſillo* (noſtro) cui ſimile, caute diſtinguendum; ob Folia lobata & Petala ſemibifida eſſe neqoit G. *rotundifolium*, cujus ſpecimina tantum deflorata hucusque a me lecta, nondum ſatis perſcrutari & cum G. *molli* conferre licuit.

540. GERANIUM, *columbinum*, pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartito-multifidis, arillis glabris, calycibus ariſtatis. *Linn. S. N.* 455. *Spec.* 956. [*Hall.* 938.]

H. in umbroſis, ad ſepes *am Dollberg*, alibique freqoens. Floret Junio, Julio.

Pedunculi *longiſſimi.* Calyx *ariſtatus ariſtis longis, nervoſus, fructu maturo maximus, pedicellis longis, declinatis.* Petala *ſubſanguinea, trinervia, emarginata, vel retuſa interjecto mucrone, calyce nec ariſtis longiora. Arilli & roſtrum lævia.*

541. GERANIUM, *diſſectum*, pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villoſis. *Linn. Spec.* 956. [*Hall.* 937.]

H. in cultis paſſim. Floret Junio, Julio.

Stipulæ & Bracteæ *purpureæ, nitidæ.* Calycina *foliola piloſa, ariſtata.* Petala *ſanguinea, emarginata, calycis longitudine.* Pedicelli *breviſſimi, declinati*: *Roſtrum arillique piloſi.*

542. GERANIUM, *rotundifolium*, pedunculis bifloris, petalis ſubintegris longitudine calycis, caule proſtrato, foliis reniformibus iocifis. *Linn. S. N.* 456. *Spec.* 957. [*Hall.* 941.]

H. in cultis *in der Pitze* rarius. Floret Junio & ſeq. +

B. *POLYANDRIA.*

MALVA. *G. P.* 841.

Cal. duplex: exterior triphyllus. *Arilli* plurimi, monoſpermi. *S. N.* 459.

543. MALVA, *rotundifolia*, caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobatis, pedonculis fructiferis declinatis. *Linn. S. N.* 460. *Spec.* 969. [*Hall.* 1070.]

H. in cultis, ruderatis, ad vias paſſim. Floret æſtate.

Pharm. MALVÆ VULGARIS Herba, Flores, Semina.

544. MALVA, *ſylveſtris*, caule erecto herbaceo, foliis ſeptemlobatis acutis, pedunculis petiolisque piloſis. *Linn. Spec.* 969. [*Hall.* 1069.]

H. ad ſepes hortorum & quidem unico tantum in loco: *in der Höhle am Dollberg.* Floret Junio & ſeq.

545. MALVA, *criſpa*, caule erecto, ſoliis angulatis criſpis, floribus axillaribus glomeratis. *Linn. Spec.* 970.

H. in cultis oleraceis *vor dem Homberg*, ad ſepes *bey der Walkmühle*, alibique quaſi indigena parcius. Floret Julio & ſeq.

546. MALVA, *Alcea*, caule erecto, foliis multipartitis ſcabriuſculis. *Linn. Spec.* 971. [*Hall.* 1071.]

H. in montoſis ad verſuras *am Rehberg* infrequens. Floret Julio.

547. MALVA, *moſchata*, caule erecto, ſoliis radicalibus reniſormibus inciſis; caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Linn. S. N.* 461. *Spec.* 971. [*Hall.* 1072.]

H. in montoſis ſterilibus *auf dem Galgen- und Dollberg* frequens, *am Roſenwaldgen* parcius. Floret Julio.

Caulibus *brevioribus ſeſquipedalibus.* Foliis caulinis *ad petiolum uſque 5-partitis: lobis pinnatifidis, ſummis anguſtiſſimis.* Floribus *paulo minoribus;* Arillis *hirſutis; odoreque ſub floreſcentia moſchato, a præcedente diſtinguitur.*

CLASSIS XVII.

D I A D E L P H I A.

A. *H E X A N D R I A.*

F U M A R I A. *G. P.* 849.

Cal. diphyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2, membranacea, ſingula *Antheris* 3. *S. N.* 469.

548. FUMARIA, *bulboſa major*, caule ſimplici, bracteis longitudine florum. *Linn. Spec.* 983, var. *α. cava*, & *β. intermedia.*

Fumaria radice bulboſa, cava, caule ſimplici bifolio, bracteis ovato-lanceolatis. *Hall.* 348. vid. *Nomenclat.*

H. α. & β. in nemoroſis ad pagum *Erbach* copioſe, ad ſepes in pratis *hinter dem Schloſs* parcius. Floret Majo.

Pharm. ARISTOLOCHIÆ CAVÆ Radix.

Plantæ junioris α, Radix *ſubgloboſa, ſolida, radiculas undique emittens; adultioris* Radix *hemiſphærica, ſubtus excavata, a priori ætate tantum diverſa.* Bracteæ *integerrimæ, floribus breviores.* Corollis *albis & purpureis ludit.*

549. FUMARIA, *bulboſa minor*, radice bulboſa, ſolida, caule ſimplici multifolio, bracteis digitatis. *Hall.* 349.

Fumaria *bulboſa*, var. γ. *Linn. Spec.* 983.

H. in pomariis ad ſepes *unter der neuen Brücke*, alibique frequens. Floret Aprili

Pharm. ARISTOLOCHIÆ FABACEÆ Radix.

Hujus Radicis *Bulbus ſemper ſolidus, obovatus; radiculas tantum baſi emittens.* Bracteæ *digitorum parallelorum inſtar fiſſæ, longitudine florum.* Corollæ *ſemper (in noſtrate) purpureæ, minores. In hortum promiſcue cum antecedente transplantata, Radicem ſolidam in cavam, & Bracteas fiſſas in integerrimas, per decem annos non mutavit.*

550. FUMARIA, *officinalis*, pericarpiis monoſpermis racemoſis, caule diffuſo. *Linn. Spec.* 984. [*Hall.* 346.]

H. in agris & cultis paſſim. Floret æſtate.

Pharm. FUMARIÆ Herba.

B. *OCTANDRIA.*

POLYGALA. *G. P.* 851.

Cal. 5-phyllus: foliolis duobus alæformibus, coloratis. *Legumen* obcordatum, biloculare. *S. N.* 470.

551. POLYGALA, *vulgaris*, floribus criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Linn. Spec.* 986. [*Hall.* 344.]

H. in paſcuis ſylvaticis montoſis paſſim. Corollis violaceis, albidis & carneis ludit. Floret Majo, Junio.

C. *DECANDRIA.*

* *Stamina omnia connexa.*

SPARTIUM. *G. P.* 858.

Stigma longitudinale, ſupra villoſum. *Filamenta* germini adhærentia. *Calyx* deorſum productus. *S. N.* 474.

552. SPARTIUM, *ſcoparium*, foliis ternatis ſolitariisque, ramis inermibus angulatis. *Linn. Spec.* 996. [*Hall.* 354.]

H. in montoſis ſylvaticis *am Homberg* frequens. Floret Majo, Junio.

Calyx *bilabiatus*, *labio ſuperiore bi-inferiore tridentato.* Siliqua *compreſſo-plana*, *marginibus villoſa.*

GENISTA. *G. P.* 859.

Cal. 2-labiatus: $\frac{2}{3}$. *Vexillum* oblongum, a piſtillo ſtaminibusque deorſum reflexum. *S. N.* 474.

a. *Inermes.*

553. GENISTA, *ſagittalis*, ramis ancipitibus membranaceis articulatis, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. S. N.* 475. *Spec.* 998. [*Hall.* 353.]

H. in montoſis ſylvaticis *am Beilſtein* rarius. Floret Junio.

554. GENISTA, *tinctoria*, foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis. *Linn. Spec.* 998. [*Hall.* 350.]

H. in ſylvaticis *am Homberg*, *Rehberg*, alibique vulgaris.
Pharm. GENISTÆ Herba, Flores, Semina.

555. GENISTA, *piloſa*, foliis lanceolatis obtuſis, caule tuberculato decumbente. *Linn. Spec.* 999. [*Hall.* 351.]

H. in ſylvaticis *im Hirſchberg* parcius. Floret Junio.

b. *Spinoſa.*

556. GENISTA, *germanica*, ſpinis compoſitis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Linn. Spec.* 999. [*Hall.* 352.]

H. in ſylvis *am Beilſtein*, alibique vulgaris. Floret Junio.

ANTHYLLIS. *G. P.* 864.

Cal. ventricoſus. *Legumen* ſubrotundum, tectum. *S. N.* 480.

557. ANTHYLLIS, *Vulneraria*, herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Linn. Spec.* 1012. [*Vulneraria Hall.* 398.]

H. in pratis ſylvaticis ſiccis *am Rehberg*, alibique. Floret Junio.

ONONIS. *G. P.* 863.

Cal. 5 - partitus: laciniis linearibus. *Vexillum* ſtriatum. *Legumen* turgidum, ſeſſile. *Filamenta* connata absque fiſſura. *S. N.* 478.

558. ONONIS, *arvenſis*, floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis inermibus villoſis. *Linn. S. N.* 478. *Spec. ſpinoſa.* 1006. [*Anonis Hall.* 356.]

H. in campis ſterilibus paſſim. Floret Junio, Julio.
Pharm. ONONIDIS Radix, Herba.

** *Stigma pubeſcens.* (nec priorum notæ.)

OROBUS. *G.* 871.

Stylus linearis. *Cal.* baſi obtuſus: laciniis ſuperioribus profundioribus, brevioribus. *S. N.* 485.

559. OROBUS, *vernus*, foliis pinnatis ovatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici. *Linn. Spec.* 1028. [*Hall.* 416.]

H. in nemoroſis ad *Breitſcheid*; *im Hirſchberg*; *im Thiergarten* frequens. Floret Majo.

560. OROBUS, *tuberoſus*, foliis pinnatis lanceolatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici. *Linn. Spec.* 1028. [*Hall.* 417.]

H. in ſylvis *im Hirſchberg*; *im Driedorfer Wald* rarius. Floret Junio. +.

LATHY-

LATHYRUS. *G. P.* 872.

Stylus planus, ſupra villoſus, ſuperne latior. *Calycis* laciniæ ſuperiores 2 breviores: *S. N.* 486.

561. LATHYRUS, *pratenſis*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliolis lanceolatis. *Linn. Spec.* 1033. [*Hall.* 436.]

H. in pratis & ſepibus ubique. Floret Junio.

562. LATHYRUS, *ſylveſtris*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis. *Linn. Spec.* 1033. [*Hall.* 434.]

H. in ſylvaticis *am Geiſtlichen Berg*, *Homberg*, alibique. Floret Julio.

563. LATHYRUS, *latifolius*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Linn. Spec.* 1033. [*Hall.* 433.]

H. in nemoroſis ad *Erbach* rarius. Floret Julio.

VICIA. *G. P.* 873.

Stigma latere inferiore transverſe barbatum. *S. N.* 487.

564. VICIA, *piſiformis*, pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis ovatis: infimis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 1034. [*Hall.* 428.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Beilſtein* copioſe. Floret Junio; Julio.

Caules *cubitales*, *erectiuſculi*, *angulati*. Stipulæ *ſemiſagittatæ*, *dentatæ*. Foliola 6. ſ. 8., *ovata*, *integerrima*, *rarius ſubcrenulata*, *mucrone apice prominulo quorum inferiora duo reliquis majora*, *inter petiolum & caulem ſubſeſſilia*, *caulique approximata*, *Stipulas obtegentia*. Cirrhi *multifidi*. Pedunculi *angulati*, *multiflori*. Bracteæ *ſetaceæ*, *ſub floribus ſuperioribus nullæ*. Flores 20 - 30. (Aſtragal *glycyphyll.*) Filamentum *ſolitarium baſi lanceolatum*. Germen *pedicellatum*. Nectarium *obtuſum*. Siliqua *brevis*.

565. VICIA, *ſylvatica*, pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, ſtipulis denticulatis. *Linn. Spec.* 1035. [*Hall.* 426.]

L

H. in ſylvis, *im Hirſchberg*, *in der Hörre* infrequens. Floret Junio, Julio.

566. VICIA, *Cracca*, pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris. *Linn. Spec.* 1035. [*Hall.* 424.]

H. inter ſegetes rarius, in ſepibus paſſim. Floret Julio.

567. VICIA, *ſativa*, leguminibus ſeſſilibus ſubbinatis erectis, foliolis retuſis, ſtipulis notatis. *Linn. Spec.* 1037.

β. Vicia foliis imis ovatis, ſuperioribus linearibus, ſcapis breviſſimis bifloris. *Hall.* 430.

H. α. & β. in agris inter Lentem frequens. Floret Julio.

568. VICIA, *lathyroides*, leguminibus ſeſſilibus ſolitariis erectis glabris, foliolis ſenis: inferioribus obcordatis. *Linn. Spec.* 1037?

H. in montoſis apricis aridis theriotrophei *an der Ruſterbach* rarius. Floret Majo, Junio.

Caulis *ſpithamæus, erectus, ſubramoſus, ſubtrigonus.* Stipulæ *dentatæ, nulla macula ſubtus notatæ.* Petioli *inferiores breviſſimi, cirrho nullo.* Foliolis *minimis, ſenis, obcordatis cum acumine; ſuperiores breves, cirrhiferi:* Foliolis 6 f. 8, *anguſtiſſimis, linearibus, glabris, retuſis cum acumine; junioribus conduplicatis.* Flos *ſolitarius, ſeſſilis,* VIC. *ſativæ triplo minor, ejusdem tamen figuræ & coloris.* Legumen *erecto-patens, ſubſeſſile, glabrum,* 8-*ſpermum. Vereor ne planta hæc pulchella habitu & ſtructura a priori* (β.) *diverſiſſima, ob pubeſcentiam licet leviſſimam in foliolis inferioribus & ipſo legumine, ejusdem ſit mera varietas.*

569. VICIA, *ſepium*, leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decreſcentibus. *Linn. Spec.* 1038. [*Hall.* 429.]

H. in pomariis, ſepibus & ſylvis frequens. Floret Majo, Junio.

*** *Legumen ſubbiloculare.* (nec priorum notæ.)

ASTRAGALUS. *G. P.* 892.

Legumen biloculare, gibbum. *S. N.* 498.

570. ASTRAGALUS *glycyphyllos*, cauleſcens proſtratus, leguminibus ſubtriquetris arcuatis, folio-

lis ovalibus pedunculo longioribus. *Linn. S. N.* 498. *Spec.* 1067. [*Hall.* 413.]

H. in ſylvaticis montoſis *im Beilſtein* frequens. Floret Junio. Calycis *denticuli inferiores tres ſetacei æquales, reliquis longiores.*

**** *Legumina ſubmonoſperma.* (nec priorum notæ.)

TRIFOLIUM. *G. P.* 896.

Flores ſubcapitati. *Legumen* vix calyce longius, non dehiſcens, deciduum. *S. N.* 501.

a. Melilotus, *leguminibus nudis polyſpermis.*

571. TRIFOLIUM, *Melilotus officinalis*, leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto. *Linn. Spec.* 1078. [*Melilotus. Hall.* 362]

H. in ruderatis *auf dem Hinterſand*; in arvis *auf dem Reuterberg*, alibique parcius. Floret Junio, Julio.

Pharm. MELILOTI Herba cum Floribus.

b. Lotoidea *leguminibus tectis, polyſpermis.*

572. TRIFOLIUM, *hybridum*, capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule adſcendente. *Linn. Spec.* 1079. [*Hall.* 368.]

H. in pratis ſubbumidis paſſim. Floret Junio, Julio.

573. TRIFOLIUM, *repens*, capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. *Linn. Spec.* 1080. [*Hall.*. 367.]

H. in pratis pomariis & paſcuis ubique. Floret Majo & ſeq.

Pharm. TRIFOLII ALBI Flores.

c. Lagopoda *calycibus villoſis.*

574. TRIFOLIUM, *pratenſe*, ſpicis ſubvilloſis cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis. *Linn. Spec.* 1082. [*Hall.* 377.]

H. in pomariis & pratis pinguioribus paſſim. Floret Junio & ſeq.

Caulis *teres, ſuperne ſtriatus lævis.* Stipulæ *amplexantes, ovatæ, dilatatæ, acuminatæ, nervoſæ: ſupremæ duæ florales ſubovatæ, ſcarioſæ, nervis rubris.* Foliola *mollia, ſupra maculæ ſubſagittata notata, ſubtus vix villoſa; inferiora ovata, obtuſa, ſuperiora lanceolata acuta.* Capitulum *terminale (in planta non culta) ſolitarium, ovatum, ſeſſile inter ſtipulas duorum*

ſaltorum. Calycis *dentes piloſi*, 4 *breves*, *infimo longitudine fere tubi corollæ.* Corolla *monopetala pallide purpurea*, *minor quam in ſequente:* Alis *vexillo brevioribus.*

575. TRIFOLIUM, *alpeſtre*, ſpicis ſubgloboſis villoſis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis ſerrulatis. *Linn. S. N.* 502. *Spec.* 1082? [*Hall.* 376.]

H. in montoſis ſylvaticis paſſim. Floret Junio & ſeq.

Caulis *ſubdepreſſus*, *pubeſcens*, *ſuperne teres*, *ſubvilloſus.* Stipulæ *vaginantes*, *ſubulatæ ſupremæ duæ florales ovato-lanceolatæ*, *virides.* Foliola *firma*, *omnia lineari-lanceolata*, *ſupra rariſſime maculata*, *ſubtus albido-villoſa.* Capitula *terminalia duo*, *ſubgloboſa*, *ſeſſilia inter duas ſtipulas*; *demum oblonga*, *pedunculata.* Calycis *dentes breviſſimi*, *ſubpiloſi*, *recti*, *infimo tubo corollæ dimidio breviore.* Corolla *monopetala mojor quam in præcedente*, *ſaturatius purpurea:* Alis *longitudine vexilli.* *Hoc & præcedens calyce villoſo & lævi*, *nervis rubris & non coloratis*, *foliolisque integris & ſerrulatis ludit.* *Caulem in noſtro alpeſtri magis obliquum fere procumbentem*, *in pratenſi vero adſcendentem erectum*, *ſemper obſervavi.*

576. TRIFOLIUM, *anguſtifolium*, ſpicis villoſis conico-oblongis, dentibus calycinis ſetaceis ſubæqualibus, foliolis linearibus. *Linn. Spec.* 1083.

H. in paſcuis ſiccis ſterilibus *in der Hörre* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Differt a ſequente: Caule *altiori erectiori*, *ſubtetragono*, *lævi*, *non pubeſcente.* Ramis *caule multo brevioribus.* Stipulis *nervoſis longius acuminatis.* Foliolis *anguſtioribus*, *utrinque lævibus*, *ſubtus ſtriatis.* Capitulis *ſubcylindricis*, *anguſtioribus*, *longioribus.* Calycibus *ſtriatis*: *dentibus purpureis nudis*, *non plumoſis*, *inferioribus tribus reliquis paulo longioribus.* Corollis *calyce brevioribus*, *albidis*, *abſque macula alarum ſanguinea.* Receptaculo *nudo nec villoſo.*

577. TRIFOLIUM, *arvenſe*, ſpicis villoſis ovalibus, dentibus calycinis ſetaceis villoſis æqualibus. *Linn. S. N.* 503. *Spec.* 1083. [*Hall.* 373.]

H. in agris, arvis & campis ſterilibus paſſim. Floret Julio & ſeq.

578. TRIFOLIUM, *ſtriatum*, capitulis ſeſſilibus ſublateralibus ovatis calycibus ſtriatis rotundatis. *Linn. Spec.* 1085.

H. in paſcuis ſiccis *am Dolſberg.* Floret Majo, Junio.

Radix *biennis*, *lignoſa*, *ramoſa*. Caules *plures*, *procumbentes*, *ſpithamæi*, *ſubramoſi*, *teretes*, *ſubvilloſi*. Stipulæ *ovato-acuminatæ*, *venis rubris*. Foliola *obovata*, *integerrima*, *pubeſcentia*. Floralia *acutiuſcula*, *antice ſerrulata*. Capitula *oblonga*, *demum ovata*, *terminalia axillariaque*, *ſeſſilia in foliorum ſtipulis* Calyx *tubuloſus*, *viridis*, *denticulis rectis*: *ſuperioribus 4 æqualibus*, *infimo duplo majore*. Corolla *exigua*, *carnea*, *calyce paulo major*. Calyx Fructus *ſubgloboſus*, *collo contracto*, *nervis* 10 *rubris ſtriatus*, Legumen *ovato-acutum monoſpermum includens*.

d. Lupulina *vexillis corollæ inflexis*.

579. TRIFOLIUM, *montanum*, ſpicis ſubimbricatis ſubtribus: vexillis ſubulatis emarceſcentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Linn. Spec.* 1087. [*Hall.* 372.]

H. in pratis *auf dem Weſterwald*; ad pagos *Waldaubach*, *Liebenſcheid*, alibique frequens. Floret Julio.

580. TRIFOLIUM, *agrarium*, ſpicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Linn. Spec.* 1087. [*Hall.* 363.]

H. in agris & arvis *am Dollberg*, *Reuterberg*, alibique. Floret Junio & ſeq.

581. TRIFOLIUM, *ſpadiceum*, ſpicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus piloſis, caule erecto. *Linn. Spec.* 1087. [*Hall.* 365.]

H. in ſylvaticis montoſis *im Beilſtein* rarius. Floret Julio.

582. TRIFOLIUM, *procumbens*, ſpicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 1088. [*Hall.* 364.]

H. in arvis & campis ſiccis *am Dollberg*; *Homberg*; *auf dem Schieſsplatz* frequens. Floret Julio & ſeq.

Radix *biennis*. Caules *dodrantales*, *procumbentes*, *ramoſi*, *firmi*, *piloſi*. Stipulæ *ovatæ*, *acutæ*, *nervoſæ* Foliola *obovata*, *retuſa*, *antice ſerrulata*, *ſubtus ſtriata*. Pedunculi *piloſi*, *longitudine foliorum* Capitula *ovalia*, *multiflora*. Calycis *denticuli tres inferiores reliquis duplo longiores*, *filo brevi ſub apice*. Vexillum *margine ſerrulatum*. Semen 1, *ſæpe* 2.

583. TRIFOLIUM, *filiforme*, ſpicis ſubimbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus pedicella-

tis caulibus procumbentibus. *Linn. Spec.* 1088. [*Hall. var. præc.* 364.]

H. in pratis & pomariis copioſiſſime. Floret Majo, Junio.

Radix *annua*. Caules *ſæpe ultrapedales, filiformes, procumbentes, inter gramina erectiuſculi, vix ramoſi, ſubnudi.* Stipulæ *exiguæ, ovatæ.* Folia *remota, breviſſime petiolata.* Foliola *obcordata, antice ſerrulata, utrinque ſtriata.* Pedunculi *tenues, foliis longiores.* Capitula *pauci-* (10-15-) *flora.* Flores *ſubpedicellati.* Calyx *præcedentis.* Vexillum *vix manifeſte ſerrulatum.* Alæ *ſtriatæ.* Semen *unicum.*

* * * * * *Legumen ſubarticulatum.*

HEDYSARUM. *G. P.* 887.

Cor. carina transverſe obtuſa. *Legumen* articulis 1-ſpermis. *S. N.* 493.

584. HEDYSARUM, *Onobrychis*, foliis pinnatis, leguminibus monoſpermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus, caule elongato. *Linn. Spec.* 1059. [*Onobrychis. Hall.* 396.]

H. in pratis *bey der obern Papiermühle* rarius. Floret Junio, Julio.

Oeconom. SAINT FOIN, ſeu ESPARSETTE.

MEDICAGO. *G. P.* 899.

Legumen compreſſum cochleatum. *Carina* corollæ a vexillo deflectens. *S. N.* 505.

585. MEDICAGO, *ſativa*, pedunculis racemoſis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Linn. Spec.* 1096. [*Medica. Hall.* 382.]

H. in pratis & pomariis *an der Dille bey dem Sieghaus.* Floret Julio, Auguſto.

Oeconom. LUZERNE.

586. MEDICAGO, *lupulina*, ſpicis ovalibus, leguminibus reniformibus monoſpermis, caulibus procumbentibus. *Linn. S. N.* 506. *Spec.* 1097. [*Medica. Hall.* 380.]

H. in paſcuis, arvis & agris ubique. Floret Junio & ſeq.

****** *Legumen uniloculare polyſpermum.* (nec priorum notæ.)

ERVUM. *G. P.* 874.

Cal. 5-partitus, longitudine corollæ. *S. N.* 488.

587. ERVUM, *Lens*, pedunculis ſubbifloris, ſeminibus compreſſis convexis. *Linn. Spec.* 1039. [*Lens. Hall.* 421.]

H. in agris inter ſegetes *am Dollberg*, alibique. Floret Junio.

588. ERVUM, *tetraſpermum*, pedunculis ſubbifloris, ſeminibus globoſis quaternis. *Linn. Spec.* 1039. [*Vicia. Hall.* 423.]

H. in agris & arvis *am Homberg* & *Dollberg*; in cultis *am Steghaus*. Floret Julio.

Foliola 8 ſ. 10, *lineari-lanceolata, acuta: quorum infimum par cauli approximatum.* Stipulæ *lanceolatæ, acuminatæ, unico ſæpe denticulo laterali.* Cirrhi *trifidi, interdum ſimpliciſſimi.* Pedunculi 1-ſ. 2-*flori.* Calyx *corolla brevior, denticulis inferioribus tribus reliquis longioribus.* Legumen *nutans obtuſiſſimum, glabrum*, 3-ſ. 4-*ſpermum.*

589 ERVUM, *hirſutum*, pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis binis. *Linn. Spec.* 1039. [*Vicia. Hall.* 422.]

H. in agris & cultis ubique; vitium nimis frequens. Floret Junio & ſeq.

Stipulæ *tripartitæ.* Folia 16-18, *lineoria, retuſa cum acumine.* Pedunculi 4-5-6-*flori.* Calyx *corolla paulo brevior, ſubpiloſus; denticulis ſubæqualibus.* Legumina *pendula, hirſuta, acutiuſcula, diſperma.*

590. ERVUM, *monanthos*, pedunculis unifloris. *Linn. Spec.* 1040.

H. in agris inter Lentem *am Homberg*, alibique rarius Floret Julio.

Lente *vulgari major*, Cirrhis *bi-ſ. trifidis ſcandens.* Petioli *horizontales.* Foliola 16-18, *linearia, retuſa cum acumine.* Stipulæ *duæ, alternatim majores, figura diverſæ: quarum unica breviſſima lanceolata, altera oppoſita quintuplo major, petiolata, pedato-multifida: laciniis ſetaceis, longiſſimis, patulis.* Pedunculus *uniflorus.* Calyx *corolla triplo brevior, denticulis ſubæqualibus.* Vexillum *compreſſum albidum venis violaceis.* Legumen *magnum ſubnutans*, 2-ſ 3-*ſpermum.* Semen *magnitudine piſi, compreſſum, margine obtuſo.*

591. ERVUM, *Ervilia,* germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Linn. Spec.* 1040. [*Ervum. Hall.* 420.]

H. in agris inter Lentem cum præcedente rarius. Floret Junio. *Pharm.* ERVI ſ. OROBI Semina.

Planta *erecta, non ſcandens.* Stipulæ *ovatæ, dentatæ.* Foliola 18-24, *lineari-oblonga, retuſa cum acumine.* Petiolus *apice in mucronem productus, loco cirrhi, quo caret.* Pedunculi 2 ſ. 3-*flori.* Calyx *corolla duplo brevior, denticulis ſubæqualibus, ſuperioribus duobus decuſſatis.* Vexillum *ſubemarginatum, cum acumine.* Germen *lineare, rectum, Antheſi peracta tantum undulato-plicatum.* Legumina *pendula, articulato-nodoſa,* 3 ſ. 4-*ſperma* Semina *ſubanguloſa.*

LOTUS. *G. P.* 897.

Legumen cylindricum ſtrictum. *Alæ* ſurſum longitudinaliter conniventes. *Calyx* tubuloſus. *S. N.* 504.

592. LOTUS, *corniculatus,* capitulis depreſſis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Linn. Spec.* 1092. [*Hall.* 385.]

H. in pratis & pomariis ubique. Floret Julio, Auguſto.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

HYPERICUM. *G. P.* 902.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Filamenta* multa, in 5 phalanges baſi connata. *Capſula.* *S. N.* 509.

593. HYPERICUM, *quadrangulum,* floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. *Linn. Spec.* 1104. [*Hall.* 1038.]

H. in pratis humidis juxta rivulos *hinter dem Homberg; bey der untern Walkmuhle; auf dem Schluſſel.* Floret Julio.

Caulis *tetragonus, angulis membranaceis, punctis purpureis adſperſis.* Folia *margine nigro-punctata, flavo-viridia,* de-

mum ruſeſcentia. Flores *minores quam in ſequentibus.* Calycis *laciniæ lanceolatæ, acuminatæ.* Petala *integra, punctis nullis.* Filamentorum *phalanges* 3, *longitudine corollæ. Punctum Antherarum atrum, dein album, uti in ſequentibus.* Capſula *ovato cylindrica.*

594. HYPERICUM, *dubium*, floribus trigynis, caule ſubquadrato herbaceo, foliis ovatis, calycibus obtuſiſſimis.

H. ad ſepes *am Steghaus; am Homberg;* ad vias paſſim. Floret Julio, Auguſto.

Caules, *plures* 2 ſ 3-*pedales, erecti, ſubquadrangulares, punctis nigris adſperſi.* Folia *magna, amplexicaulia, ovata, margine acutiſſimo ſcarioſo ſubtus nigro-punctato, apice ſubretuſa cum acumine brevi.* Flores *majores quam in ſequentibus, ſubcorymboſi, ſæpius terni, pedunculati.* Calyx *pentaphyllus.* Foliolis *diſtinctis, ovatis, integerrimis, obtuſiſſimis, flavo-viridibus, lineolis interruptis atris undique notatis.* Petala *magna, integerrima, ſupra lineolis, ſubtus margine punctis atris raris notata.* Staminum *phalanges* 3, *longitudine corollæ.* Capſula *ventricoſa, triangularis, calyce reflexo ad baſin cincta. An præcedentis varietas?* an HYP. *perfoliatum S. N.* 510. *no.* 32? *cujus* Perill. LINNÆUS *nec in Speciebus Pl. nec in Mantiſſa mentionem fecit.*

595. HYPERICUM, *perforatum*, floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido-punctatis. *Linn. Spec.* 1105. [*Hall.* 1037.]

H. in montoſis *am Homberg, Dollberg* & alibi copioſiſſime. Floret Julio, Auguſto.

Pharm HYPERICI Herba, Flores.

Calycis *Foliola lanceolata acuta.* Petala *oblique truncata, crenulata, puncto atro inter ſingulam crenam.* Staminum *phalanges* 3. Capſula *ovata, acuminata.*

596. HYPERICUM, *montanum*, floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. *Linn. S. N.* 510. *Spec.* 1105. [*Hall.* 1042.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg über der Lithau* frequens. Floret Julio.

Caulis *ſeſquipedalis, ſimplex, teres, lævis.* Folia *ovato-oblonga, glabra, margine inferiore punctis atris in lineam ordinatis notata.* Calycis *Foliola* & Bracteæ *Floribus ſubjectæ ſerratæ;*

ſerraturis lateralibus ſetaceis glanduliferis, terminali nulla glandula inſtructa. Petala *obtuſa, punctis nullis. Phalanges* Filamentorum *in primariis Floribus quinque, in ſertoribus tres.* Stigmata *purpurea.* Capſula *ovata, apicibus divaricatis.* Semina *nigra.*

597. HYPERICUM, *hirſutum*, floribus trigynis, calycibus ſerrato-glandulofis, caule tereti erecto, foliis ovatis ſubpubeſcentibus. *Linn. Spec.* 1105. [*Hall.* 1043.]

H. in dumetis & ſepibus *am Homberg* frequens. Floret Julio. *Calycis foliola & non raro Bracteæ ſerratæ, ſerraturis omnibus etiam terminalibus glanduliferis.* Petala *lineolis nigris notata. Punctum ſub* Antheris *in hoc nullum.* Capſula *ovato-oblonga.* Semina *rubra.*

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

A. *POLYGAMIA ÆQUALIS.*

* Semifloſculoſi T. *Corollis ligulatis omnibus.*

CICHORIUM. *G. P.* 911.

Receptaculum ſubpaleaceum. *Calyx* calyculatus. *Pappus* ſub 5-dentatus, obſolete piloſus. *S. N.* 527.

598. CICHORIUM, *Intybus*, floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis. *Linn. Spec.* 1142. [*Hall.* 1.]

H. in arvis & verſuris *bey der Sandwieſe; am Reuterberg* frequens. Floret Julio & ſeq.

Pharm. CICHORII Radix, Herba, Flores, Semina.

HYPOCHÆRIS. *G. P.* 918.

Receptaculum paleaceum. *Cal.* ſubimbricatus. *Pappus* plumoſus. *S. N.* 526.

599. HYPOCHÆRIS, *glabra*, calycibus oblongis imbricatis, caule ramoſo nudo, foliis dentato-ſinuatis. *Linn. Spec.* 1140. [*Hall.* I. pag. 3. III. p. 181.]

H. in ſylvaticis montoſis *hinter Burgk* verſus Theriotropheum rarius. Floret Julio.

600. HYPOCHÆRIS, *radicata*, foliis runcinatis obtuſis ſcabris, caule ramoſo nudo lævi, pedunculis ſquamoſis. *Linn. Spec.* 1140. [*Hall.* 3?]
H. in pratis pomariis & paſcuis frequens. Floret Julio & ſeq.

TRAGOPOGON. *G. P.* 905.

Receptaculum nudum. *Calyx* ſimplex. *Pappus* plumoſus. *S. N.* 518.

601. TRAGOPOGON, *pratenſe*, calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Linn. Spec.* 1109. [*Hall.* 8.]
H. in pomariis & pratis paſſim, ad verſuras *am Dollberg* frequens. Floret Junio, Julio.

PICRIS. *G. P.* 907.

Receptaculum nudum. *Cal.* calyculatus. *Pappus* plumoſus. *Semina* transverſim ſulcata. *S. N.* 519.

602. PICRIS, *Hieracioides*, perianthiis laxis, foliis integris. *Linn. Spec.* 1115. [*Hall.* 24.]
H. in campis ſterilibus, ad verſuras *am Dollberg; im Beilſtein* copioſe; in dumetis *bey der untern Walkmuhle* rarius. Floret Julio, Auguſto.

LEONTODON. *G. P.* 912.

Receptaculum nudum. *Calyx* imbricatus ſquamis laxiuſculis. *Pappus* plumoſus. *S. N.* 521.

603. LEONTODON, *Taraxacum*, calyce ſquamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. *Linn. S. N.* 521. *Spec.* 1122. [*Taraxacum. Hall.* 56.]
H. in pratis paſcuis & pomariis paſſim. Floret Majo & ſeq.
Pharm. TARAXACI Radix, Herba.
Pappus *longiſſime ſtipitatus*, *ſimplex*.

604. LEONTODON, *autumnale*, caule ramoſo, pedunculis ſquamoſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Linn. Spec.* 1123. [*Picris. Hall.* 28.]

H. in pratis, pomariis, ad verſuras paſſim. Floret Julio & ſeq. Seminum *radialum* Pappus *ſeſſilis*, *centralum ſubſtipitatus*.

605\. LEONTODON, *hiſpidum*, calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hiſpidis: ſetis furcatis. *Linn. S. N.* 522. *Spec.* 1124. [*Picris. Hall.* 25.]

H. in pratis & pomariis ubique. Floret æſtate.

606\. LEONTODON, *hirtum*, calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis: ſetis ſimpliciſſimis. *Linn. S. N.* 522. *Spec.* 1123. [*Rhagadiolus Hall.* 7.].

H. in pratis paludoſis ad pagum *Sinn* frequens. Floret Julio.

Planta *præcedenti ſimillima*; *ſed præcipue differt*: Radice *præmorſa*. Foliis *flavo-viridibus*, *dum ſicca*, *undulato-flexuoſis*, *pilis ſimplicibus*, *non furcatis*, *in petiolo tereti vix depreſſo longioribus*, *conſertioribusque*; *dentibus brevioribus*, *ſurſum*, *nec deorſum ut in alia obliquatis*. Scapo *lævi*, *minus manifeſte ſtriato*, *nulla bracteola*, *uti ſæpius in præcedente*, *instructo*. Flore *minore*. *Ceterum* Calyx *lævis*; *vix baſi ſetis paucis ſubhirtus*: Squamis 13 *lanceolatis*, *planiuſculis*, *totidemque exterioribus minimis*, *baſi dilatatis*, *ſurſum adpreſſis conſtructus*.

Corollulæ *extimæ radii tot quot ſquamæ calycis*, (13) *ſubtus lividæ*, *demum flavæ*: Stigmatibus *extra antheras non prodeuntibus*. Semen *incraſſatum*, *albidum*, *vix ſcabrum*, *calyculo brevi multidentato*, *loco pappi*, *coronatum*.

Corollulæ *interiores duplo minores*: Stigmatibus *revolutis*. Semen *tenue*, *ſubfuſcum*, *ſcabrum*. Pappo *ſeſſili*; *in centralibus ſuſtipitato*, *inſtructum*: *radiis* 13, *baſi lanceolatis*, *extrorſum plumoſis*, *alternis totidem brevioribus ſimplicibus*. Calyx *ante explicationem nutans*, *uti in præcedente*, *peracta floreſcentia vero*, *ob ſemina radii calycinis ſquamis involuta*, *ſubgloboſus*, *angulato-ſulcatus*, *pappo vix prominente*, *ſquamis demum patulis non reflexis*. *Setas Foliorum ſæpe in hoc etiam apice bifidas obſervabis*, *ſi microſcopio uſus fueris*.

SONCHUS. *G. P.* 908.

Receptaculum nudum. *Calyx* imbricatus, ventricoſus. *Pappus* piloſus. *S. N.* 519.

607\. SONCHUS, *arvenſis*, pedunculis calycibusque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis. *Linn. Spec.* 1116. [*Hall.* 23.]

H. in agris inter ſegetes paſſim. Floret Junio, Julio.

608. SONCHUS, *oleraceus*, pedunculis tomentoſis, calycibus glabris. *Linn. Spec.* 1116.

α. Sonchus (*lævis*) laciniatus latifolius. *Bauh. Pin.* 124. (*Hall.* 21.)

β. Sonchus (*aſper*) laciniatus & non laciniatus. *Bauh. Pin.* 124. (*Hall.* 22.)

H. α. in cultis oleraceis copioſiſſime. β. in agris & arvis *am Homberg*, alibique frequens. Floret Julio & ſeq.

CREPIS. *G. P.* 914.

Receptaculum nudum. *Calyx* calyculatus ſquamis deciduis. *Pappus* piloſus, (*) ſtipitatus. *S. N.* 524.

609. CREPIS, *fœtida*, foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis dentatis. *Linn. Spec.* 1133. [*Hall.* 29.]

H. ad verſuras *am Reuterberg*; in arvis *am Dollberg* copioſe. Floret Julio, Auguſto.

Calyx *albidus, ante explicationem nutans.* Pappus *ſtipitatus calyce longior.* Receptaculum *ſubpiloſum.*

610. CREPIS, *tectorum*, foliis lanceolato-runcinatis ſeſſilibus lævibus, inferioribus dentatis. *Linn. S. N.* 525. *Spec.* 1135. [*Hall.* 31?]

H. in paſcuis & arvis, ſecus vias ubique frequens. Floret Julio, Auguſto.

Pappus ſeſſilis. Planta *polymorpha, magnitudine & habitu maxime varians.*

611. CREPIS, *biennis*, foliis runcinato-pinnatifidis ſcabris: baſi ſuperne dentatis, calycibus muricatis. *Linn. Spec.* 1136. [*Hall.* 30.]

H. in pratis & pomariis paſſim. Floret Majo, Junio.

Calycis *exterioris ſquamæ læves, interioris ſetis nigris rigidis hiſpidæ.* Pappus *ſeſſilis.*

PRENANTHES. *G. P.* 911.

Receptaculum nudum. *Calyx* calyculatus. *Pappus* ſimplex, ſubſeſſilis. *Floſculi* ſimplici ſerie. *S. N.* 521.

(*) plumoſus. S. N. l. c. ex errore typogr. forte.

612. PRENANTHES, *muralis*, floſculis quinis, foliis runcinatis. *Linn. Spec.* 1121. [*Hall.* 18.]
H. in ſylvaticis umbroſis paſſim. Floret Julio & ſeq.

HIERACIUM. *G. P.* 913.

Receptaculum nudum. *Cal.* imbricatus, ovatus. *Pappus* ſimplex, ſeſſilis. *S. N.* 522.

a. *Scapo nudo unifloro.*

613. HIERACIUM, *Piloſella*, foliis integerrimis ovatis ſubtus tomentoſis, ſtolonibus repentibus, ſcapo unifloro. *Linn. S. N.* 522. *Spec.* 1125. [*Hall.* 55.]
H. in campis & collibus ſiccis paſſim. Floret Majo & ſeq.
Pharm. FILOSELLÆ ſ. AURICULÆ MURIS Herba.
Corollæ *extimæ ſubtus rubræ.*

b. *Scapo nudo multifloro.*

614. HIERACIUM, *dubium*, foliis integris ovato-oblongis, ſtolonibus repentibus, ſcapo nudo multifloro, *Linn. Spec.* 1125? [*Hall.* 53?]
H. in montoſis *am Homberg* frequens. Floret Julio & ſeq.
Stolones *repentes plures, foliati.* Folia *ſubtus nuda, ſupra ſubpiloſa, baſi ciliata.* Scapus *ſpithamæus, lævis, nudus,* Foliolo *ad baſin unico lanceolato inſtructus.* Pedunculi *umbellares* 3 ſ. 4, *ſimplices*, Bracteis *totidem brevibus involucrati.* Flores (H. *Piloſellæ*) *altitudine ſubæquales.* Corollæ *utrinque pallide flavæ.*

615. HIERACIUM, *Auricula*, foliis integerrimis lanceolatis, ſcapo nudo multifloro, ſtolonibus repentibus. *Linn. S. N.* 522. *Spec.* 1126? [*Hall.* 52?]
H. in paſcuis pomariis & ad verſuras *am Dollberg*; in ruderatis *auf dem Hinterſand.* Floret Majo & ſeq.
Stolones *repentes pauci, ſubfoliati.* Folia *lato-lanceolata, ſubdenticulata, obſcure viridia, utrinque ſcabra.* Scapus *pedalis, ſetis nigris ad baſin confertioribus undique muricatus,* Folio *unico ſupra baſin inſtructus:* Flores *terminales, cymoſi, conferti.* Pedunculi 5 ſ. 6, *ramoſi, craſſiuſculi, breves, uti calyces ſetis baſi nigris confertis, inæqualibus adſperſi.* Corollæ *utrinque ſaturatius flavæ.* Receptaculum *ſubpiloſum.* Ramo *unico florifero ex ſcapi medio prodeunte, ſæpe ludit.*

616. HIERACIUM, *cymoſum*, foliis lanceolatis integris piloſis, ſcapo ſubnudo baſi piloſo, floribus ſubumbellatis. *Linn. Spec.* 1126? [*Hall.* 51?

H. in paſcuis arvis & agris *am Homberg* frequens. Floret Junio & Septembri.

Radix *præmorſa.* Stolones *nulli.* Folia *omnia radicalia, erecta, longe lanceolata, acutiuſcula, glabra; pagina ſuperiore, carinaque ſubpiloſa, pilis albidis flexuoſis baſi purpureis.* Scapus *ſeſquipedalis, ſtriatus, fere lævis, foliolo lanceolato nudo infra medium inſtructus.* Pedunculi *terminales, longiores quam in præcedentibus, tenuiores ramoſioresque; ſub floreſcentia cymoſi, demum inæquales ſubpaniculati.* Flores *magnitudine* Crep. *tector.* Calyx *albidus, ſetis brevibus nigris adſperſus.* Corollæ *utrinque pallide flavæ.*

c. *Caule folioſo.*

617. HIERACIUM, *murorum*, caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis; caulino minori. *Linn. Spec.* 1128. [*Hall.* 46.]

α. Hieracium (*piloſiſſimum*) murorum folio piloſiſſimo. *Bauh. Pin.* 129.

β. Hieracium (*ſylvaticum*) murorum minus piloſum. *Bauh. Pin.* 129.

γ. Hieracium (*myophoron*) myophoron, ſive mures proferens. *Heuch. prov.* 2 p. 74. t. I.

H. α. in muris cœmeterii & urbis; β. in ſylvaticis ubique; γ. in ſylvis *im Beilſtein*; *am Rehberg* & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

618. HIERACIUM, *paludoſum*, caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hiſpidis. *Linn. Spec.* 1129. [*Hall.* 45.]

H. in pratis humidis *im Stubens-Grund; in der Callenbach; hinter dem Homberg* copioſe. Floret Junio.

Calyx *ſubcylindricus, ſetis nigris ſcaber.* Caulis Folia & Pedunculi *glabri.*

619. HIERACIUM, *ſabaudum*, caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus. *Linn. Spec.* 1131. [*Hall.* 3c.]

H. in ſylvaticis montoſis *in der Callenbach, im Beilſtein*, alibique frequens. Floret Julio, Auguſto.

620. HIERACIUM, *umbellatum*, foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. *Linn. Spec.* 1131. [*Hall.* 34.]
H. in paſcuis ſterilibus *am Homberg*, *Rehberg*, alibique. Floret Julio, Auguſto.
Calycina *foliola planiuſcula, apice patula.* Receptaculum *piloſum uti in præcedente.* Caule *ſpithamæo & bi-ſ. tripedali;* Foliis *linearibus & ovato-lanceolatis; integerrimis & ſubdentatis, maxime ludit.*

LAPSANA. *G. P.* 919.

Receptac. nudum. *Calyx* calyculatus, ſquamis ſingulis interioribus canaliculatis. *S. N.* 526.

621. LAPSANA, *communis*, calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis. *Linn. Spec.* 1141. [*Hall.* 6.]
H. in ruderatis cultis & arvis frequens. Floret Junio & ſeq.

** *Capitati.*

CARLINA. *G. P.* 929.

Calyx radiatus ſquamis marginalibus longis, coloratis. *S. N.* 532.

622. CARLINA, *vulgaris*, caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radio albis. *Linn. Spec.* 1161. [*Hall.* 182.]
H. in montoſis aſperis duris paſſim. Floret Julio, Auguſto.
Anthera *ſingula infra Filamentum, in ligulam apice bifidam producta.* Seminis Pappus *radiis* 9, *tripartitis, plumoſis.*

CNICUS. *G. P.* 926.

Calyx ovatus, imbricatus ſquamis ramoſo-ſpinoſis, obvallatus bracteis. *Corollulæ* æquales. *S. N.* 530.

623. CNICUS, *oleraceus*, foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis concavis integris ſubcoloratis. *Linn. S. N.* 530. *Spec.* 1156. [*Carſium. Hall.* 173.]
H. in pratis humidis; ad ripas *Dillæ* alibique vulgaris. Floret Julio, Auguſto.
Antherarum *appendices minimæ, bifidæ, uti in præcedente.*

ARCTIUM.

ARCTIUM. *G. P.* 923.

Cal. globoſus: ſquamis apice hamis inflexis. *S.* 528.

624. Arctium, *Lappa*, foliis cordatis inermibus petiolatis. *Linn. Spec.* 1143. [*Lappa. Hall.* 161.]
α. Lappa major ſ. Arctium Dioſcoridis. *Bauh. Pin.* 198.
β. Lappa major montana, capitulis tomentoſis. *Bauh. Pin.* 198.
H. α. & β ad vias in ruderatis *auf dem Hinterſand*, alibique vulgaris. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. Bardanæ Radix, Semina.

CARDUUS. *G. P.* 925.

Cal. ovatus, imbricatus ſquamis ſpinoſis. *Recept.* piloſum. *S. N.* 529.

a. *Foliis decurrentibus.*

625. Carduus, *lanceolatus*, foliis decurrentibus pinnatifidis hiſpidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis ſpinoſis villoſis, caule piloſo. *Linn. Spec.* 1149. [*Cirſium. Hall.* 169.]
H. ad vias & pagos vulgaris. Floret Julio, Auguſto.
In hoc & omnibus ſequentibus Carduis, appendices Antherarum *breves, apice plerumque non bifidæ*, Filamentis *piloſis. In hoc* Pappus *longiſſimus, plumoſus.*

626. Carduus, *nutans*, foliis ſemidecurrentibus ſpinoſis, floribus cernuis: ſquamis calycinis ſuperne patentibus. *Linn. Spec.* 1150. [*Hall.* 167.]
H. ad vias paſſim. Floret Julio, Auguſto.
Pappus *piloſus.*

627. Carduus, *criſpus*, foliis decurrentibus ſinuatis: margine ſpinoſis, floribus aggregatis terminalibus: ſquamis inermibus ſubariſtatis patulis. *Linn. S. N.* 529. *Spec.* 1150. [*Hall.* 165.]
H. in dumetis & ſepibus *bey der untern Papiermühle.* Floret Julio, Auguſto.
Pappus *piloſus.*

628. CARDUUS, *paluſtris*, foliis decurrentibus dentatis: margine ſpinoſis, floribus racemoſis erectis, pedunculis inermibus. *Linn. Spec.* 1151. [*Cirſium. Hall.* 170.]

H. in pratis udis paſſim; ad vias *bey der untern Walkmühle* frequens. Floret Julio, Auguſto.

Calycis *ſquamæ ovatæ, adpreſſæ, apice ſpineſcenti, ſubinermi, viſcoſo.* Pappus *plumoſus.* Corollis *albis ludit.*

b. *Foliis ſeſſilibus.*

629. CARDUUS, *marianus*, foliis amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis: ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. *Linn. Spec.* 1153. [*Silybum. Hall.* 181.]

H. in ruderatis *am Kirchhof*; in cultis *vor dem untern Thor* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. CARDUI MARIÆ Semina.

630. CARDUUS, *acaulis*, acaulis, calyce glabro. *Linn. Spec.* 1156. [*Cirſium. Hall.* 178.]

H. in paſcuis montoſis apricis *auf dem Stützelberg*; *am Galgenberg* frequens. Floret Auguſto.

Caulis *ſæpe bipollicaris, folio uno alterove inſtructus.*

Pappus *longiſſimus, plumoſus.*

ONOPORDUM. *G. P.* 927.

Recept. favoſum. *Calycis* ſquamæ mucronatæ. *S. N.* 531.

631. ONOPORDUM, *Acanthium*, calycibus ſquarroſis: ſquamis patentibus, foliis ovato-oblongis ſinuatis. *Linn. S. N.* 531. *Spec.* 1158. [*Hall.* 159.]

H. in ruderatis, ad vias paſſim. Floret Julio, Auguſto.

SERRATULA. *G. P.* 924.

Cal. ſubcylindricus, imbricatus, muticus. *S. N.* 528.

632. SERRATULA, *arvenſis*, foliis dentatis ſpinoſis. *Linn. Spec.* 1149. [*Cirſium. Hall.* 171.]

H. in agris arvis & cultis, ad vias paſſim. Floret Julio, Auguſto.

Pappus *plumoſus*, Recept. *piloſum.*

Variat *Corollis purpureis & albidis*; a) Calyce *majori*, *magis cylindrico: corollulis minimis*, *ſaturatius purpureis*; *Stigmatibus patentiſſimis.* b) Calyce *ovato-oblongo*, *corollulis duplo majoribus*, *pallidioribus*, *Stigmatibus ſubbifidis*, *erectis.*

*** *Diſcoidei.*

EUPATORIUM. *G. P.* 935.

Receptaculum nudum. *Pappus* plumoſus. *Calyx* imbricatus, oblongus. *Stylus* ſemibifidus, longus. *S. N.* 536.

633. EUPATORIUM, *cannabinum*, foliis digitatis. *Linn. Spec.* 1173. [*Hall.* 136.]

H. ſecus rivulos in paſcuis ſylvaticis *im Beilſtein* copioſiſſime; in dumetis *bey der untern Walkmühle* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. EUPATORII Herba.

Pappus *capillaris*, *radiis flexuoſis*, *ſimplicibus*, *nec plumoſis.*

BIDENS. *G. P.* 932.

Receptac. paleaceum. *Pappus* ariſtis erectis, ſcabris. *Calyx* imbricatus. *Cor.* rarius floſculo uno alterne radiante inſtruitur. *S. N.* 534.

634. BIDENS, *tripartita*, foliis trifidis, calycibus ſubfolioſis, ſeminibus erectis. *Linn. Spec.* 1165. [*Hall.* 121.]

H. in foſſis paſſim; *an der Mühlbach* copioſe. Floret Julio, Auguſto.

635. BIDENS, *cernua*, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, ſeminibus erectis. *Linn. Spec.* 1165. [*Hall.* 120.]

H. ſimilibus in locis cum præcedente rarius; *bey der obern Walkmühle*; *auf dem Sandwiesgen*; *auf der Burgermeiſter-Wieſe* frequens. Floret Julio, Auguſto.

Corollulæ *octo in ambitu diſci uti centrales* Hermaphroditæ, Tubo *tamen ſemper ventricoſiore depreſſo*, *locis diutius inundatis in* Corollulas *ligulatas* neutras *tranſeunt.* Vid. COREOPS. *Bidens.*

B. POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Diſcoidei.*

ARTEMISIA. *G. P.* 945.

Recept. ſubvilloſum vel nudiuſculum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus ſquamis rotundatis, conniventibus. *Corollæ* radii nullæ. *S. N.* 541.

636. ARTEMISIA, *Abſinthium*, foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis: receptaculo villoſo. *Linn. Spec.* 1188. [*Abſinthium. Hall.* 124.]

H. in cultis & ruderatis paſſim. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. ABSINTHII VULGARIS Herba.
Corollulæ Radii circiter 15, femineæ, nudæ.

637. ARTEMISIA, *vulgaris*, foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, floribus ovatis: radio quinqueſloro. *Linn. S. N.* 542. *Spec.* 1188. [*Artemiſia. Hall.* 130.]

H. in ruderatis, ad vias *auf dem Hinterſand*, alibique copioſe, Floret Julio, Auguſto.
Pharm. ARTEMISIÆ ALBÆ & RUBRÆ Herbs.

TANACETUM. *G. P.* 944.

Receptaculum nudum. *Pappus* ſubmarginatus. *Cal.* imbricatus, hemiſphæricus. *Cor.* radii obſoletæ, 3-fidæ. *S. N.* 541.

638. TANACETUM, *vulgare*, foliis bipinnatis inciſis ſerratis. *Linn. Spec.* 1184. [*Hall.* 132.]

H. ad verſuras & margines pratorum, in ruderatis paſſim. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. TANACETI Herba, Semina.

CONYZA. *G. P.* 950.

Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Cal.* imbricatus, ſubrotundus. *Cor.* radii trifidæ. *S. N.* 547.

639. CONYZA, *ſquarroſa*, foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboſo, calycibus ſquarroſis. *Linn. S N.* 547. *Spec.* 1205. [*Hall.* 135.]

H. in montoſis ſiccis apricis *am Dollberg; Homberg; im Beilſtein* frequens. Floret Julio, Auguſto.

GNAPHALIUM. *G. P.* 946.

Recept. nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* imbricatus: ſquamis marginalibus rotundatis ſcarioſis, coloratis. *S. N.* 543.

a. *Argyrocomæ*, ſ. *calycibus albis.*

640. GNAPHALIUM, *dioicum*, ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, floribus dioicis. *Linn. S. N.* 545. *Spec.* 1199. [*Filago. Hall.* 157.]

α. Gnaphalium (Mas) montanum flore rotundiore. *Bauh. Pin.* 263.

β. Gnaphalium (Femina) montanum longiore & folio & flore. *Bauh. Pin.* 263.

H. α & β. in collibus & ſterilibus montoſis *am Homberg, Dollberg & Rehberg* copioſe. Floret Majo, Junio.

Feminæ *floſculi etiam corollati:* Tubo *tenui, ſuperne purpurea,* Limbo 5-*fido-erecto.* Pappus *vix plumoſus, in* Mare *radiis apice incraſſatis.*

Pharm. GNAPHALII Flores.

b. *Filaginoidea* ſ. *calycibus cinereis.*

641. GNAPHALIUM, *ſylvaticum*, caule herbaceo ſimpliciſſimo erecto, floribus ſparſis. *Linn. S. N.* 545. *Spec.* 1200. [*Filago. Hall.* 148.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Beilſtein* copioſe; *im Guldners-Grund* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Corollulæ hermaphroditæ 3 *ſ.* 5 *in centro diſci;* Femineæ *numeroſæ in ambitu:* Tubo *tenui,* Limbo 5-*fido erecto inſtructæ.* Pappus *capillaris, ſimplex.*

642. GNAPHALIUM, *uliginoſum*, caule herbaceo ramoſo diffuſo, floribus confertis terminalibus. *Linn. S. N.* 545. *Spec.* 1200. [*Filago. Hall.* 151.]

H. in ſtagnis, locis inundatis *auf dem Schieſsplatz*, & alibi frequens. Floret Julio, Auguſto.

Calyces *baſi tomentoſi, ſquamis acutiuſculis fuſcis, demum nigris.* Corollulæ hermaphroditæ *paucæ in diſco*; Femineæ *plures in ambitu, tubuloſæ*, Limbo 5-*fido*. Pappus *radiis tantum ſex brevibus deciduis conſtat.*

** *Radiati.*

BELLIS. *G. P.* 962.

Recept. nudum, conicum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemiſphæricus: ſquamis æqualibus. *Semina* obovata. *S. N.* 560.

643. BELLIS, *perennis*, ſcapo nudo. *Linn. Spec.* 1248. [*Hall.* 93.]

H. in paſcuis pratis & pomariis ubique. Floret toto fere anno.
Pharm. BELLIDIS MINORIS Herba, Flores.

MATRICARIA. *G. P.* 967.

Recept. nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemiſphæricus, imbricatus: ſquamis marginalibus ſolidis, acutiuſculis. *S. N.* 563.

644. MATRICARIA, *Parthenium*, foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Linn. Spec.* 1255. [*Hall.* 100.]

H. in ruderatis *auf dem Hinterſand*; in cultis *am Steghaus*; ad ſepes paſſim. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. MATRICARIÆ Herba, Flores.

645. MATRICARIA, *ſuaveolens*, receptaculis conicis, radiis deflexis, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Linn. S. N.* 563. *Spec.* 1256.

H. in agris ad pagum *Sinn*; *in der Aue* rarius. Floret Julio, Auguſto.

646. MATRICARIA, *Chamomilla*, receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Linn. S. N.* 563. *Spec.* 1256. [*Hall.* 101.]

H. in agris præſertim ſecalinis ubique copioſiſſime. Floret Majo & ſeq.
Pharm. CHAMOMILLÆ VULGARIS Flores.

CHRYSANTHEMUM. *G. P.* 966.

Recept. nudum. *Pappus* marginatus. *Calyx* hemiſphæricus, imbricatus: ſquamis marginalibus membranaceis. *S. N.* 561.

a. *Leucanthema.*

647. CHRYSANTHEMUM, *Leucanthemum*, foliis amplexicaulibus oblongis: ſuperne ſerratis; inferne dentatis. *Linn. Spec.* 1251. [*Matricaria. Hall.* 98.]
H. in pomariis & pratis paſſim. Floret Junio, Julio.
Pharm. BELLIDIS MAJORIS Herba.

648. CHRYSANTHEMUM, *inodorum*, foliis pinnatis multifidis, caule ramoſo diffuſo. *Linn. Spec.* 1253.
H. in agris & cultis *in der untern Pitze*; in ruderatis *bey dem dicken Thurm*; *am Dollberg* rarius. Floret Julio, Auguſto.
Flores *quam in C. Leucanth. paulo minores.* Calyx *plano-convexus: ſquamis interioribus margine membrana fuſca ſcarioſa undulata auctis.* Floſculi *radii* 13-15. Semina *tetragona, atra, angulis eburneis, apice 4-dentata.* Receptaculum *ovato-oblongum, intus cavum.*

649. CHRYSANTHEMUM, *corymboſum*, foliis pinnatis inciſo-ſerratis, caule multifloro. *Linn. Spec.* 1251. [*Pyrethrum Hall.* 95.]
H. in ſylvis *im Beilſtein*, *am Homberg*, alibique frequens: Floret Julio, Auguſto.
Semina *tetragona*, *Calyculo tubuloſo; oblique truncato, denticulato, coronata.*

b. *Chryſanthemum.*

650. CHRYSANTHEMUM, *ſegetum*, foliis amplexicaulibus: ſuperne laciniatis; inferne dentato-ſerratis. *Linn. Spec.* 1254.
H. inter ſegetes; in cultis, ruderatis, ad vias paſſim. Floret Julio, Auguſto.

ARNICA. *G. P.* 958.

Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Corollulæ* radii filamentis 5 absque antheris. *S. N.* 559.

651. ARNICA, *montana*, foliis ovatis integris: caulinis geminis oppoſitis. *Linn. Spec.* 1245. [*Hall.* 89.]

H. in pratis ſiccis circa pagos *Mademühlen; Roth*; ubique frequens; in pratis *am Rehberg* rarius. Floret Julio.

Pharm. ARNICÆ Herba, Flores.

Calycis *foliola* 20, *ordine duplici: exteriora ſubcarinata, hirſuta, viſcoſa; interiora alterna linearia, lævia.* Corollulæ *radii tot quot calycis foliola, quinque-ſulcatæ, apice tridentatæ.* Filamenta 3-4, *rarius* 5, *inæqualia. ſulcis reſpondentia, fauci tubo inſerta.* Semen *Hermaphroditi angulato-cylindricum, ſurſum piloſum*, Pappo *capillari coronatum. Feminæ* Semen *angulo unico planiore*, Pappo *ſimillimo inſtructum.*

INULA. *G. P.* 956.

Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Antheræ* baſi in ſetas duas deſinentes. *S. N.* 557.

652. INULA, *Helenium*, foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis: ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis. *Linn. Spec.* 1236. [*Aſter. Hall.* 72.]

H. in pomariis & ad margines agrorum *am Dollberg*, Floret Julio, Auguſto.

Pharm. HELENII ſ. ENULÆ Radix.

Radii *Corollulæ acute tridentatæ, nec integræ.*

653. INULA, *Pulicaria*, foliis amplexicaulibus undulatis, caule proſtrato, floribus ſubgloboſis: radio breviſſimo. *Linn. S. N.* 558. *Spec.* 1238. [*Aſter. Hall.* 80.]

H. in inundatis *auf dem Schieſsplatz* copioſe; *auf dem Sauwiesgen* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Radii Corollulæ *Limbo breviſſimo, tridentato.*

Seminum Pappus *radiis tantum ſex conſtat, mox deciduis.*

ERIGERON. *G. P.* 951.

Recept. nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii lineares, anguſtiſſimæ. *S. N.* 549.

654. ERIGERON, *canadenſe*, caule floribusque paniculatis. *Linn. Spec.* 1210. [*Hall.* 84.]

H. in agris inter Solanum tuberoſum, ſemel lectum *am Dollberg.* Floret Auguſto.

Caulis *bipedalis, ſulcatus, ſetis albidis rectis hirtus.* Folia radicalia *ovato-lanceolata, trinervia, ſubſerrata:* Caulina

ſparſa, patentiſſima, lineari-lanceolata, ciliata. Corollulæ Diſci *Limbo 4-fido, patulo*: Stigmatibus *apice conniventibus*, Cor. Radii *acute bidentatæ*, Stigmatibus *longis, patentiſſimis.*

655. ERIGERON, *acre*, pedunculis alternis unifloris. *Linn. Spec.* 1211. [*Hall.* 85.]

H. in ſiccis glareoſis *am Homberg; Dollberg; auf dem Schieſsplatz*, & alibi frequens. Floret Julio, Auguſto.

Floris corollulæ *triplices*: a. Diſci *centrales pauca* hermaphroditæ: Limbo *5-fido, calyce breviores.* b. Diſci *laterales numeroſæ* femineæ: *Tubo tenui; Limbo oblique truncato, longitudine calycis.* Radii *plures* femineæ, *ligulatæ, erectæ: Limbo bidentato, calyce longiores. Omnium* Styli *altitudine inter ſe & Pappo æquales.*

SOLIDAGO. *G. P.* 955.

Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Cor.* radii circiter 5. *Calycis* ſquamæ imbricatæ, clauſæ. *S. N.* 556.

656. SOLIDAGO, *Virga aurea*, caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Linn. Spec.* 1235. [*Hall.* 69.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg*, alibiqoe. Floret Julio, Auguſto.

Corollulæ *radii ſæpius* 6-7; *diſci* 9-10. Stigmata *apice conniventia.*

SENECIO. *G. P.* 953.

Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Cal.* cylindricus, calyculatus: ſquamis apice ſphacelatis. *S. N.* 550.

a. *Floribus floſculoſis.*

657. SENECIO, *vulgaris*, corollis nudis, foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis. *Linn. Spec.* 1216. [*Hall.* 58.]

H. in cultis inter olera, vitium ubique vulgatiſſimum. Floret toto fere anno.

Pharm. SENECIONIS Herba.

b. *Floribus radiatis: radio revoluto.*

658. SENECIO, *viſcoſus*, corollis revolutis, foliis pinnatifidis viſcidis, ſquamis calycinis laxis longitudine periantbii. *Linn. Spec.* 1217. [*Hall.* 60.]
H. in cultis & roderatis *auf dem Hinterſand*, in muris cœmeterii & urbis frequens. Floret Julio, Auguſto.

659. SENECIO, *ſylvaticus*, corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboſo erecto. *Linn. Spec.* 1217. [*Hall.* 59.]
H. in ſylvis *in der Hörre* copioſe. Floret Julio.

c. *Floribus radiatis: radio patente, foliis pinnatifidis.*

660. SENECIO, *erucifolius*, corollis radiantibus, foliis pinnatifidis dentatis ſubhirtis, caule erecto. *Linn. Spec.* 1218. [*Hall.* 62. *var.* δ.]
H. ad margines agrorum *am Dollberg*; *Homberg*; & alibi frequens. Floret Julio, Auguſto.

661. SENECIO, *Jacobæa*, corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis; laciniis laciniulatis, caule erecto. *Linn. Spec.* 1219. [*Hall.* 62. *var.* α.]
H. iisdem in locis cum præcedente. Floret Julio, Auguſto.

d. *Floribus radiatis: radio patente, foliis indiviſis.*

662. SENECIO, *ſaracenicus*, corollis radiantibus, floribus corymboſis, foliis lanceolatis ſerratis glabriuſculis. *Linn. Spec.* 1221. [*Hall.* 65.]
H. in dumetis *auf der Weiſsgærberwieſe*; *auf der Sandwieſe*; in ſylvis *im Beilſtein* frequens. Floret Julio, Auguſto.
Pharm. CONSOLIDÆ SARACENICÆ Herba.

TUSSILAGO. *G. P.* 952.

Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Calycis* ſquamæ æquales, diſcum æquantes, ſubmembranaceæ. *S. N.* 550.

663. TUSSILAGO, *Farfara*, ſcapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Linn. Spec.* 1214. [*Petaſites. Hall.* 143.]
H. in agris argilloſis humentibus *in der Aue* frequens. Floret Aprili.
Pharm. TUSSILAGINIS ſ. FARFARÆ Radix, Herba, Flores, Corollulæ *Radii integerrimæ.*

664. TUSSILAGO, *hybrida*, thyrſo oblongo, floſculis femineis nudis plurimis. *Linn. Spec.* 1214. [*Petaſites. Hall.* 140.]

H. in pratis humidis *unter der neuen Brücke; bey der untern Walkmühle, auf der Pfingſtweide* copioſe. Floret Aprili.
Corollulæ femineæ *numeroſæ, apice bifidæ.* Hermaphroditæ *vix* 3-ſ. 5, *in centro diſci.*

665. TUSSILAGO, *Petaſites*, thyrſo ovato, floſculis femineis nudis paucis. *Linn. S. N.* 550. *Spec.* 1215. [*Petaſites.* 138.]

H. cum præcedente copioſiſſime. Floret Aprili.
Corollulæ femineæ *noſtrate penitus nullæ.* Pappus *in hac & præcedentibus ſeſſilis, nec ſtipitatus.*

ANTHEMIS. *G. P.* 970.

Recept. paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemiſphæricus, ſubæqualis. *Floſculi* radii plures quam 5. *S. N.* 565.

a. *Radio diſcolore ſ. albo.*

666. ANTHEMIS, *arvenſis*, receptaculis conicis: paleis ſetaceis, ſeminibus coronato-marginatis. *Linn. Spec.* 1261. [*Chamæmelum. Hall.* 103.]

H. in agris arvis & cultis paſſim. Floret Junio & ſeq.
Radix *biennis.* Caules *plures, proſtrati, diffuſi.* Folia *caneſcentia.* Pedunculi *longi, angulato-ſulcati, pubeſcentes.* Calycis *ſquamæ ovato-lanceolatæ: interiores ovatæ, membrana ſcarioſa auctæ.* Semina *lævia, ſubtetragona,* 10-*ſulcata, apice incraſſata, centro excavata, gibberibus* 10 *coronata.* Receptaculum *ovatum:* Paleæ *lanceolatæ, carinatæ, acuminatæ. Planta aliquem habet odorem, minus tamen fætentem quam in ſequente.*

667. ANTHEMIS, *Cotula*, receptaculis conicis: paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. *Linn. Spec.* 1261. [*Chamæmelum. Hall.* 104.]

H. in arvis ruderatis & cultis ubique. Floret Julio & ſeq.
Radix *annua.* Caulis *unicus, erectus.* Folia *lævia.* Pedunculi *ſtriati.* Calycis *ſquamæ lineares, margine vix ullo.* Semina *obovata, ſtriata, pubeſcentia, apice contracto, vix poro excavato, nudo.* Receptaculum *oblongum:* Paleæ *ſetaceæ, anguſtiſſimæ. Planta fætida.*

668. ANTHEMIS, *tinctoria*, foliis bipinnatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule corymboſo. *Linn. Spec.* 1263. [*Chamæmelum. Hall.* 105.]

β. Buphthalmum alpinum flore candido. Triumf. obſ. 79. t. 80.

H. α in ſterilibus ſiccis, inque muris & ruderatis paſſim; β. Floribus minoribus, Radio albo, infra medium flaveſcente: *am Dollberg & auf dem Schieſsplatz* rarius. Floret Julio, Auguſto.

ACHILLEA. *G. P.* 971.

Recept. paleaceum. *Pappus* nullus. *Calyx* ovatus, imbricatus. *Floſculi* radii circiter 5. *S. N.* 566.

669. ACHILLEA, *Ptarmica*, foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis. *Linn. Spec.* 1266. [*Hall.* 117.]

H. ad foſſas, in pratis humidis ubique. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. PTARMICÆ Herba, Flores.

670. ACHILLEA, *Millefolium*, foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſuperne ſulcatis. *Linn. S. N.* 567. *Spec.* 1267. [*Hall.* 107.]

β. Millefolium purpureum majus. *Bauh. Pin.* 140.

H. α. in paſcuis ſiccis, ad verſuras paſſim; β. in graminoſis *auf dem Hinterſand; auf der Sandwieſe.* Floret Julio & ſeq.

Pharm. α. MILLEFOLII Herba, Flores.

671. ACHILLEA, *nobilis*, foliis bipinnatis: inferioribus nudis planis, ſuperioribus obtuſis tomentoſis, corymbis convexis confertiſſimis. *Linn. Spec.* 1268. [*Hall* 109.]

H. in montoſis aridis apricis circa *Aslar & Werdorff.* Floret Julio. +

Plantam hanc ipſe nondum legi.

C. *POLYGAMIA FRUSTRANEA.*

CENTAUREA. *G. P.* 984.

Recept. ſetoſum. *Pappus* ſimplex. *Cor.* radii infundibuliformes, longiores, irregulares. *S. N.* 572.

672. CENTAUREA, *Cyanus*, calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis; infimis dentatis. *Linn. Spec.* 1289. [*Cyanus. Hall.* 191.]

H. in agris inter ſegetes paſſim. Floret Junio, Julio.
Pharm. CYANI Flores.

673. CENTAUREA, *Scabioſa*, calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis. *Linn. Spec.* 1291. [*Cyanus. Hall.* 186.]

H. in montoſis ſterilibus frequens. Floret Julio.

674. CENTAUREA, *Jacea*, calycibus ſcarioſis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn. Spec.* 1293. [*Rhaponticum. Hall.* 195]

H. in pratis ſiccis ubique Floret Julio, Auguſto.
Pappus *ſetis breviſſimis, paucis, mox deciduis, conſtat.*

RUDBECKIA. *G. P.* 980.

Recept. paleaceum, conicum. *Pappus* margine 4-dentato. *Calyx* duplici ordine ſquamarum. *S. N.* 570.

675. RUDBECKIA, *laciniata*, foliis compoſitis laciniatis. *Linn. Spec.* 1279.

H. in ſaucetis, ad ripas Dillæ *auf der Burgermeiſterwieſe*; ſemel lecta, nec iterum reperta; forte aliunde ex hortis aufuga fluminisque inundatione advecta. Floret Julio & ſeq.

COREOPSIS. *G. P.* 981.

Recept. paleaceum. *Pappus* bicornis. *Cal.* erectus, polyphyllus, baſi radiis patentibus cinctus. *S. N.* 570.

676. COREOPSIS, *Bidens*, foliis lanceolatis ſerratis oppoſitis amplexicaulibus. *Linn. Spec.* 1281. [*Bidens. Hall.* 120. β.]

H. in foſſis & locis inundatis *an der Muhlbach*; *bey der obern Walkmühle*; alibique alternis annis plus minusve frequens. Floret Julio, Auguſto.
Caulis *altior, erectior, minusque ramoſus*; Folia *latiora, longius acuminata, argutius ſerrata, baſi manifeſtius connata, quam in* Bideote *cernua.* Florum *radio excepto, omnibus in*

reliquis partibus cum ea convenit. Calyx *exterior pentaphyllus, radio paulo longior*: Foliolis *lanceolatis, integris, ſubciliatis.* Calyx *interior erecto-patens: ſquamis octo planis, glabris, ſtriatis, margine flavis.* Diſci corollulæ hermaphroditæ, & Semina *quadri-ariſtata: ariſtis duabus alternis brevioribus, uti in illa.* Radii Corollulæ *vero octo neutræ, ſquamis calycinis oppoſitæ, ovali-oblongæ, planæ, patentes, flavæ; ſupra novem-ſulcatæ, ſubtus binervatæ, apice bi-ſ. tridentatæ, ſæpe integerrimæ*: Tubo *brevi*; Germine *inermi, ſterili*; Stylo *nullo inſtructæ. Quoniam inter has ſæpe obſervatur* Corollula *una alterave tubuloſa* hermaphrodita: Limbo 5-*fido*, Stylo Staminibusque *imperfectis inſtructa, ceteroquin Corollulis octo in* Bidentis *cernuæ ambitu memoratis ſimillima, extra dubium eſſe patet*: Plantam *hanc ab illa minime eſſe diverſam, ſolo Floris radio vero, ſingulari artificio Naturæ, diverſiſſimam evadere. Cauſſa hujus metamorphôſeos in loco natali diutius mundato certe latet: quia æſtate humida poſt diuturnas pluvias, diverſis in locis, ubi ſimplici Flore provenire ſolebat, mere flores radiatos, ac ne unicum quidem abſque radio, in numeroſis plantis reperire potui; æſtate ſicciori vero, ſimplici flore non radiato, iisdem in locis ſemper, ſemel tantum flores radiatos & non radiatos in eadem planta obſervavi.*

D. *POLYGAMIA NECESSARIA.*

FILAGO. *G. P.* 995.

Recept. nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus. *Floſculi feminei* inter ſquamas calycis locati. *S. N.* 580.

677. FILAGO, *germanica*, panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirſutis, foliis acutis. *Linn. Spec.* 1311. [*Hall.* 153.]

H. in ſterilibus arenoſis *auf dem Stutzelberg; auf dem Schieſsplatz*; alibique vulgaris. Floret Julio, Auguſto.

Caulis *dodrantalis, erectus, foliatus, albido-tomentoſus, baſi ramoſus.* Capitulum *terminale globoſum, ex pluribus floribus arcte congeſtis compoſitum; ſub quo dein rami duo oppoſiti rarius tres enaſcuntur, ſimilibus Capitulis terminati; ſic diviſione ramorum ſimili modo repetita, caulis tandem dichotomo-brachiatus fit, ramis horizontalibus, & capitula antea terminalia demum axillaria evadunt.* Flores *pentagoni, baſi to-*

mentoſi: ſquamis calycinis ovato-acuminatis, interioribus ariſtatis, coloratis, nitidis. In hac Specie & duabus ſequentibus triplices floſculos in ſingulo Flore, *omnes corollatos, obſervo:*

a. Diſci centrales 2. ſ. 3, hermaphroditi, *tubuloſi:* Limbo 4-*fido*, *patente;* Stigmatibus *erecto-patulis*, *longitudine Limbi;* Germine *exiguo*, *abortiente*, Pappo *brevi ſimplici inſtructo.*

b. Diſci laterales *numeroſi*, feminei. Tubo *tenui baſi tumido;* Limbo 4-*fido*, *erecto;* Stigmatibus *patulis*, *Limbo longioribus;* Semine *fertili*, Pappo *ſimili coronato.*

c. Floſculi *inter ſquamas* Calycis *exteriores* 5 ſ. 7, feminei; *etiam corollati:* Tubo *tenuiſſimo*, *vix armatis oculis conſpicuo;* Limbo *bifido*, *acuto:* Stylo *limbo longiore;* Stigmatibus *longis patentibus;* Semine *oblongo fertili*, Pappo *nullo.*

678. FILAGO, *montana*, caule ſubdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribusque. *Linn. S. N.* 580. *Spec.* 1311. [*Hall.* 155.]

H. in arvis & campis arenoſis *am Dollberg; Homberg;* alibique vulgaris. Floret Julio; Auguſto.

679. FILAGO, *arvenſis*, caule paniculato, floribus conicis lateralibus. *Linn. Spec.* 1312. [*Hall.* 154.]

H. in campis aridis ſabuloſis ubique. Floret Julio, Auguſto. *Hujus* Semen hermaphroditi Pappo *deſtitutum. In hac & antecedente* Floſculi *triplices, omnes corollati, uti in F. germanica.*

C A L E N D U L A. *G. P.* 990.

Receptac. nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* polyphyllus, æqualis. *Sem.* diſci membranacea. *S. N.* 577.

680. CALENDULA, *officinalis*, ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Linn. Spec.* 1304.

H. in cultis *am Steghaus; auf dem Hinterſand* rarius. Floret Julio, Auguſto.

Pharm. CALENDULÆ Flores.

E. *M O N O G A M I A.*

J A S I O N E. *G. P.* 1005.

Cal. communis 10-phyllus. *Cor.* 5-petala, regularis. *Capſ.* infera, bilocularis. *S. N.* 582.

681. JASIONE, *montana. Linn. Spec.* 1317. [*Rapunculus. Hall.* 678.]

H. in collibus apricis ſiccis paſſim, *am Rehberg; Galgenberg;* alibique copioſe. Floret Julio, Auguſto.

Calyx *conſtanter icoſiphyllus:* Foliolis *quatuor ſerierum ſubſerratis, exterioribus gradatim majoribus.* Antheræ *ante pertuſionem Stigmatis fere coalitæ, demum evacuato polline patentes, baſi cohærentes.* Floſculi Diſci centrales ſteriles; Stigmate *clavato integerrimo, polline adſperſo, nec villoſo;* Capſulis *brevius pedicellatis, nunquam ad maturitatem pervenientibus.* Floſculi laterales *numeroſiores* fertiles: Stigmate *clavato demum bifido. Quoniam horum* Antheræ, *tempore ruptionis Stigmatis,* Polline *evacuatæ ſunt, veriſimile eſſe patet. Stigmata a* Polline *ſuperiorum Antherarum fœcundari.* Styli *ſuperiorum floſculorum omnes erecti; inferiorum fertiliorum vero declinati, Stigmata pro faciliori* Pollinis *receptione ſurſum porrigentes.*

VIOLA. *G. P.* 1007.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis, poſtice cornuta. *Capſ.* ſupera, 3-valvis, 1-locularis. *S.* 584.

a. *Acaules.*

682. VIOLA, *hirta*, acaulis, foliis cordatis piloſo-hiſpidis. *Linn. Spec.* 1324. [*Hall.* 559.]

H. in ſylvaticis *im Beilſtein;* in dumetis & ſepibus *am Rehberg & Homberg* frequens. Floret Majo, Junio.

Capſula *ſubgloboſa, tricarinata, hirta, nutans, terram petens.*

683. VIOLA, *odorata*, acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. *Linn. Spec.* 1324. [*Hall.* 558.]

H. in pomariis, locis pinguibus umbroſis frequens. Floret Martio, Aprili.

Pharm. VIOLARIÆ. Herba; VIOLÆ Flores, Semina.

Hujus Prolem hybridam ſemel legi loco umbroſo *am Homberg:* Floribus *majoribus, campanulatis;* Petalis *fere æqualibus conniventibus,* omnibus baſi calcaratis, Aquilegiæ *Flores, demtis petalis, referentibus.* VIOLÆ PELORIA?

b. *Cauleſcentes.*

684. VIOLA, *canina*, caule adultiore adſcendente, foliis oblongo-cordatis. *Linn. Spec.* 1324. [*Hall.* 563.]

H. in

H. in paſcuis ſylvaticis, ad ſepes ubique. Floret Aprili, Majo.

Hujus varietatem ſingularem legi in ſylvis *in der Hörre*. *Caule dedrantali erecto.* Foliis *obtuſioribus*, *ſcabriuſculis.* Floribus *radicalibus primo vere nullis*; *caulinis inferioribus omnibus ſterilibus:* Petalis Antheris Germineque *quidem inſtructis*, *ut in V. canina*, Stigmate *vero ſemper imperfecto*, *capitato*, *ſetis ſurſum verſis hirto.* Floribus *ſuperioribus omnibus fertilibus: at apetalis*, *vel vix rudimentis* Petalorum *minimis inſtructis*; Antheris *nullis*; Piſtillo *perfecto*, *mox in* Capſulam *intumeſcente V. Caninæ ſimillimam. Ad* Violam *mirabilem accederet*, *niſi Stipulæ ſerrato-ciliatæ*, & Flores *inferiores magnitudine*, *colore*, *odoriſque defectu*, Violæ *caninæ eſſent ſimillimi.*

c. *Stipulis pinnatifidis; Stigmate urceolato.*

685. VIOLA, *tricolor*, caule triquetro diffuſo, foliis oblongis inciſis, ſtipulis pinnatifidis. *Linn. S. N.* 589. *Spec.* 1326.

α. Viola bicolor arvenſis. *Bauh. Pin.* 200. (*Hall.* 569.)

β. Viola tricolor hortenſis repens. *Bauh. Pin.* 299. (*Hall.* 568.)

H. α. in cultis & agris ubique copioſe; β. in cultis *auf der Schafdille.* Floret æſtate.

In Var. α. Petala *vix calycis longitudine*, *ſæpius breviora.*

IMPATIENS. *G. P.* 1008.

Cal. 2-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis, nectario cucullato. *Capſ.* ſupera, 5-valvis. *S. N.* 586.

686. IMPATIENS, *noli tangere*, pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Linn. Spec.* 1329. [*Hall.* 557.]

H. in nemoroſis ſubhumidis ad *Erbach* copioſe; *im Beilſtein*; *an der Mühlbach* alibique frequens. Floret Julio.

Squamæ *duæ*, *ovatæ*, *minimæ*, *ad baſin* Petali *ſuperioris*, Calyce *tectæ:* quid?

CLASSIS XX.
GYNANDRIA.
A. *DIANDRIA.*
ORCHIS. *G. P.* 1009.

Nectarium corniforme pone florem. *S. N.* 589.

a. *Bulbis indiviſis.*

687. ORCHIS, *bifolia*, bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longiſſimo, petalis patentibus. *Linn. Spec.* 1331. [*Hall.* 1285.]

β. Orchis trifolia minor. *Bauh. Pin.* 83.

H. α. in ſylvaticis montoſis *am Beilſtein* & *Homberg*; β. floribus duplo minoribus, odoratiſſimis, calcaribus filiformibus: in pratis ſiccis *am Rehberg* copioſe. Floret Majo, Junio.

688. ORCHIS, *Morio*, bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo adſcendente, petalis obtuſis conniventibus. *Linn. S. N.* 589. *Spec.* 1333. [*Hall.* 1282.]

H. in pomariis *am Steghaus* rarius; in pratis ſiccis *am Rehberg* frequens. Floret Majo.

689. ORCHIS, *maſcula*, bulbis indiviſis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis. *Linn. Spec.* 1333. [*Hall.* 1283.]

H, in pratis ſylvaticis *hinter dem Homberg*; & alibi frequens. Floret Majo, Junio.

Pharm. SATYRII Radix.

690. ORCHIS, *uſtulata*, bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido punctis ſcabro: cornu obtuſo, petalis diſtinctis. *Linn. Spec.* 1333. [*Hall.* 1273.]

H. in montoſis muſcoſis *am Rehberg* rarius. Floret Junio.

b. *Bulbis palmatis.*

691. ORCHIS, *latifolia*, bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Linn. Spec.* 1334. [*Hall.* 1279.]

H. in pratis humidis paſſim. Foliis *maculatis*, & *non maculatis ludit.* Floret Majo.

692. ORCHIS, *maculata*, bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore: labio plano, petalis dorſalibus erectis. *Linn. S. N.* 590. *Spec.* 1335. [*Hall.* 1278.]
H. in pratis ſylvaticis *am Rehberg* copioſe. Floret Majo, Junio.
Bracteæ *ſubſerrulatæ.* Labii *lacinia intermedia minor, integerrima, acuta.*

693. ORCHIS, *odoratiſſima*, bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo breviore: labio trilobo, foliis linearibus. *Linn. S. N.* 590. *Spec.* 1335. [*Hall.* 1274.]
H. in pratis ſiccis *am Rehberg.* Floret Junio.

694. ORCHIS, *conopſea*, bulbis palmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore: labio trifido, petalis duobus patentiſſimis. *Linn. Spec.* 1335. [*Hall.* 1287.]
H. in pratis montoſis *am Rehberg*; & alibi frequens. Floret Majo, Junio.

c. *Bulbis faſciculatis.*

695. ORCHIS, *abortiva*, bulbis faſciculatis filiformibus, nectarii labio ovato integerrimo, caule aphyllo. *Linn. S. N.* 591. *Spec.* 1336. [*Epipactis. Hall.* 1288.]
H. in ſylvis, *im Schönbacher Wald* rarius. Floret Majo. +

OPHRYS. *G. P.* 1011.

Nectarium ſubtus ſubcarinatum. *S. N.* 592.

696. OPHRYS, *Nidus avis*, bulbis fibroſo-faſciculatis, caule vaginato aphyllo, nectarii labio bifido. *Linn. S. N.* 592. *Spec.* 1339. [*Epipactis. Hall.* 1290.]
H. in nemoroſis ad *Schönbach*; *im Hirſchberg* copioſe; in pratis ſylvaticis *am Rehberg* rarius. Floret Majo, Junio.

697. OPHRYS, *ovata*, bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Linn. Spec.* 1340. [*Epipactis. Hall.* 1291.]
H. in pratis ſylvaticis *am Rehberg* frequens; in pomariis paſſim parcius. Floret Majo, Junio.

SERAPIAS. *G. P.* 1012.

Nectarium ovatum, gibbum, labio ovato. *S. N.* 593.

698. SERAPIAS, *latifolia*, bulbis fibroſis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Linn. S. N.* 593. *S. Helleborine. α. Spec.* 1344. [*Epipactis. Hall.* 1297.]

H. in pratis humidis ad pagos *Schönbach*, *Driedorff* & *Roth.* Floret Junio, Julio.

699. SERAPIAS, *longifolia*, bulbis fibroſis, foliis enſiformibus ſeſſilibus, floribus pendulis. *Linn. S. N.* 593. [*Epipactis. Hall.* 1296.]

H. in pratis ſiccis *hinter dem Homberg* copioſe. Floret Julio.

700. SERAPIAS, *rubra*, bulbis fibroſis, foliis enſiformibus, floribus erectis: nectarii labio acuto. *Linn. S. N.* 594. [*Epipactis. Hall.* 1299.]

H. in ſylvis *im Beilſtein; in der Hörre; im Hirſchberg* infrequens. Floret Julio.

Bulbi *teretes, flexuoſi, ſubtomentoſi, ſimplices.* Spadix *pedalis, ad baſin ſquamis aliquot ſtriatis vaginantibus veſtitus, ſuperne nudus, inter Flores pubeſcens.* Folia 5-*nervia: infimum ovatum, ſequentia duo ovato-lanceolata, reliqua* 2 ſ. 3 *enſiformia.* Flores *erecti, magni, pauci.* (5 ſ. 9.) Bracteæ *lanceolatæ, acutæ, inferiores longitudine Germinis, ſuperiores gradatim breviores.* Petala *quinque, ovato lanceolata, acuminata purpurea, ſubconniventia, inferioribus duobus baſi latioribus magis hiantibus.* Nectarium *Petalis vix longius, ſubtus convexo-planum, pone gibbum, ſulco longitudinali:* Labellum *albidum ſubcordatum, acuminatum, apice reflexum, margine adſcendente ſerrulato; ſupra totum cum poſtica parte, lineolis novem, eminentibus, longitudinalibus, undulatis, flavis, notatum.* *Stylus arcuatus, ſupra convexus, ſubtus canaliculatus, apice tridentato.* Antheræ *minimæ.* Capſula *oblonga, anguloſa.*

B. *HEXANDRIA.*

ARISTOLOCHIA. *G. P.* 1022.

Hexagyna. *Cal.* nullus. *Cor.* 1-petala, lingulata, integra. *Capſ.* 6-locularis, infera. *S. N.* 600.

701. ARISTOLOCHIA, *clematitis*, foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Linn. Spec.* 1364. [*Hall.* 1029.]
H. in cultis *in der Callenbach* copioſe; in hortis *vor dem untern Thor*, alibique vitium pervulgare. Floret Junio.
Pharm. ARISTOLOCHIÆ Herba.

C. POLYANDRIA.

ARUM. *G. P.* 1028.

Spatha monophylla, cucullata: *Spadix* ſupra nudus, inferne femineus, medio ſtamineus. *S. N.* 603.

702. ARUM, *maculatum*, acaule, foliis haſtatis integerrimis: ſpadice clavato. *Linn. Spec.* 1370. [*Hall.* 1302.]
H. in ſylvis & nemoribus paſſim. Foliis maculatis & non maculatis ludit. Floret Majo.
Pharm. ARI Radix.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

A. DIANDRIA.

LEMNA. *G. P.* 1038.

MASC. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla.
FEM. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla. *Stylus* 1. *Capſ.* 1-locularis. *S. N.* 614.

703. LEMNA, *minor*, foliis ſeſſilibus utrinque planiuſculis, radicibus ſolitariis. *Linn. Spec.* 1376. [*Hydrophace. Hall.* 1900.]
H. in aquis ſtagnantibus *im Judenweyer; bey der Weiſsgärberwieſe*, & alibi frequens. Floret Junio, Julio.

704. LEMNA, *gibba*, foliis ſeſſilibus ſubtus hemiſphæricis, radicibus ſolitariis. *Linn. Spec.* 1376. [*Hall.* 1898.]
H. in ſtagnis ad *Dutedorf.* Floret Julio.

B. TRIANDRIA.

CAREX. *G. P.* 1046.

MASC. Amentum imbricatum. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o.

FEM. Amentum imbricatum. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o. *Nectarium* inflatum, 3-dentatum. *Stigmata* 3. *Semen* triquetrum, intra nectarium. *S. N.* 616.

A. Stylus bifidus. Semina hinc convexa, inde plana.

a. *Spica unica ſimplici.*

705. CAREX, *pulicaris*, ſpica ſimplici androgyna: ſuperne maſcula, capſulis divaricatis retroflexis. *Linn. Spec.* 1380. [*Hall.* 1350.]

H. in pratis uliginoſis *in der Alzbach* frequens. Floret Majo.

T. XIV f. 1. Radix *denſa, fibroſa, ruſeſcens.* Culmi *florentes vix ſpithamæi, deflorati dodrantales, f. pedales erecti, nudi, enodes, læves, teretes, altero latere planiore:* Vaginis *aliquot ad baſin veſtiti, inferioribus in foliola brevia, ſuperioribus in acumina deſinentibus.* Folia radicalia *erecta, carinato-ſetacea, ſcabra, apice compreſſo, culmo breviora.* Spica *terminalis, ſimplex, cylindracea, ſubtrigona,* (1) ſuperne ad medium uſque maſcula, (♂) inferne feminea. (♀) Cal. ſquamæ *fuſcæ, albido-marginatæ: maſculæ oblongæ, obtuſæ,* (♂ a. A II.) *perſiſtentes; femineæ ovatæ, acutæ, deciduæ.* (♀ a.) Capſulæ *ſpadiceo-ruſeſcentes, nitidæ, erectæ, rachi trigona articulata adpreſſæ, demum retroflexæ.* (p.)

b. *Spicis androgynis.*

706. CAREX, *arenaria*, ſpica compoſita, ſpiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori inſtructis, culmo triquetro. *Linn. Spec.* 1381. [*Hall.* 1362. & 1363.?]

T. XIV. f. 2. Radix *juniformis, articulata, profunde ſub terra repens: geniculis remotis, fibroſis, ſetis barbatis.* Culmi *ultrapedales, ſubfoliati, triquetri, ſuperne nudi ſcabri.* Folia *anguſta, carinata, ſcabra, inferiora lævia, longitudine culmi florentis.* Spica *erecta, demum nutans, compoſita:* Spiculis 20 f. 30 *ſeſſilibus, oblongis, acuminatis, flavo-ferrugineis, nitidis, confertis, inferioribus remotioribus, alternis;* (I.+.♀.)

quarum, duæ infimæ & terminalis (II. ♀.) totæ femineæ; intermediæ 2 ſ. 3, femineæ apice maſculæ; (+ ♀. ♂) ſuperiores plures (15-20) confertæ, totæ maſculæ, (♂.) ſteriles. Bractea *ſingulæ ſpiculæ ſubjecta ſeſſilis*, *lanceolato-acuminata*; (+ II.) *duæ ſeu tres inferiores ovatæ*, *in ſulcolum ſetaceum propria Spicula vix longius deſinentes.* Cal. ſquamæ *maſculæ lanceolatæ*, (a. ♂.) *femineæ ovatæ*, *acutæ.* (♀. a.) Nectarium *margine ſcabrum.* (I. L.) *Spiculæ femineæ fructu maturo ovatæ*, *valde incraſſatæ* (♀.) Capſulæ *ovatæ*, *acuminatæ*, *acute marginatæ*, *apice bifido*; p.) *ſæpe corniculatæ*, *majores*, (*) *ob larvam Inſecti cujusdam inhabitantis*, *monſtroſæ.*

707. CAREX, *leporina*, ſpica compoſita, ſpiculis ovatis ſeſſilibus approximatis alternis androgynis nudis. *Linn. Spec.* 1381. [*Hall.* 1361.]

H. in pratis humidis ad pagum *Sinn*; *im Pulversgrund*, & alibi infrequens. Floret Majo.

T. XIV. f. 6. Radix *multiplex*, *fibroſa.* Culmi 1 ſ. 2-*pedales erecti*, *ſubfoliati*, *trigoni*, *læves*, *inter ſpiculas flexuoſi*, *ſcabri.* Folia *anguſta*, *carinata*, *ſcabra*, *culmo breviora.* Spiculæ 5 ſ. 6, *alternæ*, *diſtinctæ*: *florentes ovatæ*, (I.) *fuſco virentes*, *fructiferæ ſubrotundæ*, (II.) *ferrugineæ* ſ. *fuſcæ*, *nitidæ*; omnes femineæ, apicæ maſculæ. Bracteæ *ovato-oblongæ*, *quarum infima ſubariſtata*, *ſpiculis breviores*, Cal. ſquamæ *ovato-lanceolatæ*, *acuminatæ*, (a. A.) *ferrugineæ*, *nervo viridi*, *margine albido.* Capſulæ *lanceolatæ*, *acuminatæ*, *margine acuto*, *ſcabro*, (p. P.) *calyce non longiores.* (A. P.)

708. CAREX, *vulpina*, ſpica ſupradecompoſita inferne laxiore, ſpiculis ovatis androgynis glomeratis: ſuperne maſculis. *Linn. S. N.* 616. *Spec.* 1382. [*Hall.* 1364?]

H. in foſſis urbis & cœmeterii, *im Judenweyer*; *in der Alzbach* frequens. Floret Majo, Junio.

T. XIV. f. 5. Radix *multiplex*, *denſa*, *fibroſa.* Culmi *bi-* ſ. *tripedales*, *ſubfoliati*, *exacte triquetri*, *craſſi*, *angulis acutis ſuperne retrorſum ſcabris*; *farcti medulla arachnoidea.* Folia *lata*, *carinata marginibus replicatis*, *flavo viridia*: radicalia *lævia*; culmea *margine carinaque ſcaberrima.* Spica *coarctato-ramoſa*, *demum hiſpida*, *plus minusve contracta*, *compoſita*: *ramulis inferioribus* 3 ſ. 4 *alternis*, *ſub floreſcentia diſtinctioribus*, (I.) *ſpiculis glomeratis obtectis.* Spiculæ *ovatæ*,

griſeo-virentes: omnes femineæ (♀) apice maſculæ. (♂) Bracteæ *ramulis ſubjectæ ſemiamplexantes, baſi ovata in foliolum ſetaceum longitudine ramuli, deſinentes; Bractea ſingulæ ſpiculæ propria, lanceolato ſetacea,* (+) *ſpiculo vix longior.* Capſulæ *ovatæ, acutæ, fuſcæ.* (p.) *divergentes.* (II.)

709. CAREX, *muricata*, ſpiculis ſubovatis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis acutis divergentibus ſpinoſis. *Linn. Spec.* 1382. [*Hall.* 1365. & *var. minor.* 1366?]

H. in pratis ſylvaticis *hinter dem Homberg*, alibique frequens. Floret Majo.

T. XIV. f. 8. Radix *multiplex, fibris longiſſimis ſimpliciuſculis.* Culmi *numeroſi, ſubfoliati, trigoni, læves; florentes digito vix longiores; fructu maturo pedales.* Spiculæ 3-4. f. 5. *alterne, remotiuſculæ,* inferne *cylindraceæ* maſculæ (♂) ſuperne *ovatæ* femineæ· *terminali longiore* (I ♀) Bracteæ *ſubvaginantes, acutæ, ſpiculis breviores.* Cal. ſquamæ *acutæ, virideſcentes: maſculæ ovato-triangulares,* (a. A. ♂) *femineæ ovato-acuminatæ.* (a. ♀.) Capſulæ *ovato-acuminatæ, divergentes.* (II. p.)

710. CAREX, *remota*, ſpicis ovatis ſubſeſſilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus. *Linn. S. N.* 617. *Spec.* 1383. [*Hall.* 1357.]

H. in pratis humidis ſecus rivulos *im Guldnersgrund; am Dollberg; im Zwinger* copioſiſſime. Floret Majo.

T. XV. f. 1. Radix *multiplex, fibroſa, fibris firmis ſimpliciuſculis.* Culmi *tenues, infirmi, trigoni, ſubſcabri; florentes pedales, foliorum vaginis toti obtecti, fructiferi tripedales.* Folia *anguſta, carinata, longa, ſubſcabra, flavo-viridia.* Spiculæ 6. 7. f. 8, *ovatæ,* femineæ, inferne maſculæ, (♀. ♂.) *remotiſſimæ, ſeſſiles in alis foliorum: quorum inferiora duo culmum ſuperantia, tertium anguſtius, ejusdem longitudinis, reliqua gradatim breviora; ſupremis ſpiculis ſubjecta, ſetacea, breviſſima.* Cal. ſquamæ *albido-virentes, lanceolatæ, acutæ,* (a. A.) Capſulæ *ſubfloveſcentes, acutæ.* (p.)

711. CAREX, *elongata*, ſpiculis oblongis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis ovatis acutis. *Linn. Spec.* 1383. [*Hall.* 1359.]

H. in pratis uliginoſis ad pagum *Sinn, am Mühlenberg* infrequens. Floret Majo.

T. XIV. f. 7. Radix *priorum*, *fibroſa*, *albida*. Culmi *ſeſquipedales*, *ſubfoliati*, *triquetri*, *læves*, *infra ſpicam ſcabri*. Folia *anguſta*, *ſubcarinata*, *lævia*, *vix apice ſcabra*, *longitudine culmi*. Spiculæ 7-8-9, *alternæ*, *remotæ*, *diſtinctæ*, *oblongæ*, femineæ, inferne maſculæ (♀ ♂.) Bracteæ *ovatæ*, *apice ſetaceo breviſſimæ*, *albidæ*. Cal. ſquamæ *ovatæ*, *acutæ* (a.A.) Capſulæ *griſeo-virentes*, *exiguæ*, *utrinque ſubconvexæ*, *acutæ*. (p. P.)

712. CAREX, *caneſcens*, ſpiculis ſubrotundis remotis ſeſſilibus obtuſis androgynis, capſulis ovatis obtuſiuſculis. *Linn. Spec.* 1383? [*Hall.* 1360.]

H. ad verſuras & ſepes, locis ſiccis graminoſis ubique frequens. Floret Majo.

T. XIV. f. 3. Radix *craſſiuſcula*, *fibroſa*, *ſetis*, *atro-fuſcis barbata*. Culmi *ſubfoliati*, *triquetri*, *ſuperne ſcabri*, 1 f. 2-*pedales*, *erecti*, *demum obliqui*, *procumbentes*. Folia *anguſta*, *lævia*, *carinata*, *marginibus replicatis*, *apicem verſus ſcabra*. Vaginæ *hinc truncatæ*, *membranaceæ*, *albidæ*, *tenuiſſimæ*. Spica 1-2-3 *pollicaris*. Spiculæ *in minoribus ſpeciminibus* 5, *ſubrotundæ*; *in majoribus* 9-15, *ovatæ*, *obtuſiſſimæ*: inferne femineæ, ſuperne maſculæ: *quarum inferiores alternæ*, *ſubremotæ*, *diſtinctæ*, *infima ſæpe duabus lateralibus minoribus*, *rarius pluribus ramulo brevi inſidentibus*, *auctæ* (I. II.) Bracteæ *ſetaceæ*, *breviſſimæ*. Cal ſquamæ *ovato-lanceolatæ*, *acutæ*, (a.) *cineraſcentes*, *nervo viridi*, *margine ferrugineo*, *nitido*. Capſulæ *acute marginatæ*, *apice-bifidæ*, *ſæpiſſime corniculatæ*, *majores*, *varie curvatæ*. (f*) *Inſectorum opus.*) Carici *vulpinæ* (*noſtræ*) *maxime adfinis*; *vereor ne ſit ejuſdem varietas ſiccioribus in locis proveniens.*

713. CAREX, *paniculata*, racemo compoſito, ſpiculis androgynis. *Linn. Spec.* 1383. [*Hall.* 1368.]

β. Cyperoides paluſtre ſpica laxa minus. *Scheuchz. Agr.* 501. (*Hall.* 1368. var. β.)

H. in paludoſis prope pagum *Sinn* frequens. β. ibidem rarius. Floret Majo.

T. XIV. f. 4. Radix *multiplex*, *lignoſa*, *fibroſa*. Culmi 3 f. 4-*pedales*, *erecti*, *ſubfoliati*, *triquetri*, *hiſpidi*, *ad baſin ſquamis fuſco-atris*, *nitidis*, *ſubimbricatis*, *veſtiti*. Folia *latiuſcula*, *ſtriata*, *carinata*; *dum ſicca*, *convoluto-fiſtuloſa*, *marginibus & partim carina hiſpida*. Spica *ramoſa*, *demum paniculata*, *hiſpida*, *compoſita*: Ramulis *alternis*, *remotiuſculis*, *ſtrictis*, *ſpiculis undique fere obtectis*. Spiculæ inferne ma-

ſculæ, ſuperne femineæ: *florentes ſubovatæ, diſtinctiores;* (I.) *fructiferæ glomeratæ, confluentes, hiſpidæ.* (II.) Bracteæ *ſetaceæ, ramulis paulo breviores.* Cal. ſquamæ *ovato-acuminatæ, fuſcæ, margine albido.* (a.) Capſulæ *utrinque convexæ, ventricoſæ, exiguæ, fuſcæ, divergentes, margine obtuſiuſculo, apice acuto, ſubbifido.*

Var. β. Spica *ſimplici 1-2-pollicari*, ramis *nullis differt.*

B. Stylus trifidus, Semina triquetra.

b. *Spicis ſexu diſtinctis: femineis ſeſſilibus.*

714. CAREX, *flava*, ſpicis confertis ſubſeſſilibus ſubrotundis: maſcula lineari, capſulis acutis recurvis. *Linn. Spec.* 1384. [*Hall.* 1380.]

H. in pratis uliginoſis ſylvaticis *hinter dem Homberg; im Beilſtein* frequens. Floret Aprili, Majo.

T. XV. f. 6. Radix *multiplex, fibroſa.* Culmi *læves: florentes ſubtrigoni, undique vaginis obtecti, vix digito longiores;* (*Fig. ſuper.*) *fructiferi triquetri, ſubnudi, pedales.* Folia *latiuſcula, ſubcarinata, ſcabra.* Spica terminalis maſcula, *cylindrica gracilis:* ſquamis *imbricata oblongis, obtuſis,* (a) *inferioribus acutis,* (a. A*.) *infima ſæpe ariſtata.* Spicæ feminæ duæ ſ. tres, *approximatæ; florentes, ſubrotundæ, ſeſſiles; fructiferæ ſubpedunculatæ, ſubovatæ, ſquarroſæ.* (*Fig. infer.*) Bracteæ *foliaceæ, vaginantes, culmo longiores.* Cal. ſquamæ *lato-lanceolatæ, mucronatæ, ferrugineæ, nervo viridi,* (a. A. ♀.) *capſulis breviores.* Capſulæ *ventricoſæ, ſtriatæ, flaveſcentes, roſtro longo, reflexo, breviſſime bifido.* (p. P.)

715. CAREX, *digitata*, ſpicis linearibus erectis: maſcula breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capſulis diſtantibus. *Linn. Spec.* 1384. [*Hall.* 1376.]

H. in ſylvaticis montoſis *am Homberg* infrequens. Floret Martio, Aprili.

T. XVI. f. 4. Radix *multiplex, deſcendens, ſquamis purpureis tunicata.* Culmi *ſpithamæi ſ. pedales, ſubnudi, hinc convexi, inde planiuſculi, læves, apice ſcabri; ad baſin veſtiti vaginis quatuor carinatis, purpureis, aphyllis, ſuperioribus in foliola ſetacea breviſſima deſinentibus.* Foliola radicalia *anguſta, ſubcarinata, firma, ſtriata, inferne ſurſum, ſuperne retrorſum ſcabra.* Spica terminalis maſcula, *cylindrica, brevis: reliquæ* duæ ſ. tres femineæ, *graciliores, longiores, lineares; ſeſſiles, dein pedunculatæ: quarum ſuperior florens altitudine maſculæ æqualis, deflorata pedunculo elongato altior evadit*

ipſa maſcula. Bracteæ *vaginantes, ſpadiceo purpureæ, laxæ, oblique truncatæ, aphyllæ.* Cal. ſquamæ *oblongæ, obtuſæ, ſpadiceo-rufeſcentes, margine albido, nitido;* (a. ♂) *femineæ nervo medio viridi, apice ſetaceo, prominulo.* (a. ♀.) Capſulæ *alternæ, remotæ, trigonæ, acutæ, baſi productiori attenuata, pubeſcentes.* (p. P.)

716. CAREX, *montana*, ſpicis femineis ſeſſilibus ſubſolitariis ovatis maſculæ approximatis, culmo nudo, capſulis pubeſcentibus, *Linn. Spec.* 1385. [*Hall.* 1372.]

H. in montoſis apricis *am Homberg; Dollberg;* alibique vulgaris. Floret Aprili. ♃

T. XVI. f. 6. Radix *multiplex, fibroſa.* Culmi *ſpithamæi, ſubnudi, ſubtrigoni, læves, erecti, maturo fructu procumbentes;* Foliis 3 ſ. 4 *vaginantibus, brevibus, ad baſin veſtiti.* Folia radicalia *numeroſa, anguſta, plano-carinata, marginibus & apice carinæ ſubſcabra, flaveſcentia, culmo florenti breviora, demum æqualia:* Vaginis *inferioribus purpuraſcentibus.* Spica terminalis maſcula, *ſubcylindrica, acutiuſcula, deflorata apice ſubventricoſa.* (II.) Spicæ femineæ duæ, (rarius unica,) *approximatæ, ſeſſiles, breviores, oblongæ ſ. ſubovatæ, paucifloræ.* Bracteæ *ſeſſiles, obcordatæ, atropurpureæ, nervo medio viridi, apice in foliolum ſetaceum propria ſpicula brevius deſinentes.* Cal. ſquamæ *ſpadiceo-purpureæ, demum atræ, nervo dorſali flaveſcente apice prominulo: maſculæ oblongæ,* (a. ♂.) *femineæ ſubovatæ,* (a. ♀.) *truncatæ mucrone prominulo.* Nectarium *ovatum, apice purpureo, bi- ſ. trifido.* (I. L.) Capſulæ *ſubtrigonæ gibbæ, hirtæ, divergentes.* (p. P.)

717. CAREX, *tomentoſa*, ſpicis femineis ſubpedunculatis, capſulis ſubgloboſis tomentoſis. *Linn. S. N.* 617. *Mantiſſa*, 123. [*Hall.* 1373.]

H. in pratis humidis *im Pulversgrund* rarius; in paludoſis ad pagum *Stnn* frequens. Floret Majo.

T. XV. f. 7. Radix *repens, articulata, ſquamis fuſco-purpureis tunicata.* Culmi *dodrantales, demum ſeſquipedales, ſubfoliati, ſubtrigoni, ſtriati, ſuperne ſcabri.* Folia radicalia *anguſta, ſubcarinata, ſupra ſcabra, ſubtus leviſſime pubeſcentia, culmo florenti breviora;* culmea *lævia apice ſcabra.* Spica terminalis maſcula, *teres, ſubtrigona; laterales* duæ (*ſæpe unica*) femineæ, *triplo minores, oblongæ, ſeſſiles,* (I.) *ſubapproximatæ, demum pedunculatæ, remotiores.* (H. III) Bracteæ *foliaceæ, ſubvaginantes; quarum inferior maſculam*

demum ſuperans; ſuperior propria ſpicula paulo longior. Cal. ſquamæ *maſculæ oblongæ, obtuſiuſculæ,* (a. A. ♂) *ferrugineo-purpureæ, nervo lato flaveſcente, margine albido, inferiores majores; femineæ duplo minores, ovato-acuminatæ,* (a. ♀) *purpuraſcentes, nervo viridi.* Capſulæ 15 ſ. 20, *ſubgloboſæ, albido-villoſæ, apice vix prominulo bifido.* (p. P.) Semen *triquetrum, uti in reliquis; ſtylo brevi apice vix prominulo terminatum.* (ſ. S.)

718. CAREX, *filiformis*, ſpica maſcula oblonga, femineis ſeſſilibus oblongis: inferiore foliolo, proprio breviore. *Linn. Spec.* 1385.

α. Varietas minor (*Hall.* 1381?) *Scheuchz. Agr.* 433. no. 4.
β. ——— major (*Hall.* 1383?) *Scheuchz. Agr.* 425. no. 1.
γ. ——— media (*Hall.* 1387?) *Scheuchz. Agr.* 428. no. 1.

H. α. in paſcuis pomariis & pratis ſiccis copioſiſſime. Floret Martio, Aprili; β. in ſylvaticis montoſis *am Beilſtein*; γ. in collibus ſiccis *am Homberg* rarius. Floret Aprili, Majo.

T. XVI. f. 5. Radix *repens.* Culmi *in α. palmares, β. ultrapedales, filiformes, γ. ſpithamæi; ſubnudi, trigoni, læves.* Folia *ſubanguſta, carinata, recurva, firma, ſubſcabra.* Spica terminalis maſcula, *oblonga, obtuſa, ferruginea*; duæ vel tres femineæ, *approximatæ, breviores, ſeſſiles, demum ſubpedunculatæ.* Bracteæ *ſubvaginantes, ſetaceæ: inferiore propria Spicula (ſæpe) longiore* Calycinæ ſquamæ *luteo-virentes, ſubfuſcæ, nitidæ: maſculæ obtuſiuſculæ,* (♂. a.) *femineæ truncatæ interjecto mucrone.* (♀. a.) Capſulæ *ſubhirtæ,* (P. p.) *confertæ.*

In Var. β. (III.) *Spicæ femineæ longius pedunculatæ.* Var. γ. *Spicæ femineæ remotiores,* 3-4-ſ. 5, *pedunculatæ: quarum maſculæ proxima androgyna,* ſ. *ſuperne partim maſcula.* Capſulæ *in hac ſæpe uſtilagineæ, globoſæ, cruſta cinerea, nitida, induratæ, duplo majores.*

c. *Spicis ſexu diſtinctis: femineis pedunculatis.*

719. CAREX, *limoſa*, ſpicis ovatis pendulis: maſcula longiore erectiore, radice repente. *Linn. Spec.* 1386. [*Hall.* 1392.]

β. Cyperoides paluſtre, ſpicis purpureo-ſpadiceis, tenuibus pediculis inſidentibus, *Scheuchz. Agr.* 467. (*Hall.* 1408.)

H. α. & β. in pratis ſylvaticis udis; juxta rivulos *hinter dem Homberg* frequens. Floret Majo.

T. XV. f. 3. Radix *repens*, *ſtolonifera*. Culmi 1-ſ. 2-*pedales*, *ſubtrigoni*, *læves*, *baſi foliati*. Folia *numeroſa*, *carinata*, *latiuſcula*, *firma*, *recurva*, *ſcabra*, *albido-viridia*. Vaginis *inferioribus purpureis*. Spicae *atro-purpureae*: terminalis maſcula: *in* Var. α unica, *in* β duae ſeu tres. *pedunculatae*, *terminali breviores*, *gracilioresque*, *ſquamula ovata acuta bracteatæ*. (♂) Spicae femineae 2 ſ. 3, *ovatæ*; *in* β *oblongæ*, *ventricoſæ*, *pedunculatæ*, *verſus culmi apicem prodeuntes*, *erectæ*, *demum pendulæ*. (♀) Bracteae *foliaceæ*: *infima vaginans*, *longitudine culmi*; *ſuperior multo anguſtior*, *ſeſſilis*, *propria ſpica vix longior*; *utraque baſi duabus auriculis exiguis*, *atro-ſpadiceis aucta*. Cal. ſquamae *oblongae*: *femineae nervo dorſali lato flaveſcente*, *apice prominulo*; (♀ A.) *maſculæ obtuſæ*, *conſimili nervo*, (a. A. ♂) *in* Var. α, *fere nullo conſpicuo inſtructæ*. Nectarium *flavum*, *ſæpe atrum*, *ſubpurpureum*. Capſulæ *denſiſſime confertæ*, *depreſſiuſculæ*, *baſi producta*, *calyces ſuperantes*. (p.)

720. CAREX: *capillaris*, ſpicis pendulis: maſcula erecta, femineis oblongis diſtichis, capſulis nudis acuminatis. *Linn. Spec.* 1386? [*Hall.* 1394]

β. Carex ſpicis femininis pendulis, raris, prælongis, capſulis roſtratis bifidis. (*Hall.* 1395.)

H. α. in pratis udis ſylvaticis *im Güldnersgrund*; ad pagum *Erbach*; β. in ſylvis *in der Horre* frequens. Floret Majo.

T. XV. f. 2. In Var. α. Culmus *dum floret vix digito longior*, *demum ſpithamæus*; Capſulis *paucioribus*, *alternis*, *remotiuſculis*, *ſubdiſtichis*. Var. β. *omnibus partibus major*: Radix *ſubrepens*. Culmi *ſpithamæi*, *demum bipedales*, *foliati*, *triquetri*, *infirmi*, *læves*; *inter ſpicas ſupremas tantum ſcabri*. Folia radicalia *longitudine culmi*, *latiuſcula*, *carinata marginibus replicatis*; *ſubtus lævia*, *margine & pagina ſuperiore ſcabra*. Fol. culmea *planiora*, *utrinque lævia*. Spica terminalis maſcula, (♂) *teres*, *ſubtrigona*; femineæ 4, ſæpius 5, *remotiſſimæ*, *graciliores*, 1-2-3-*pollicares*: *quarum ſuprema maſculæ approximata ſubſeſſilis*; *reliquæ* Pedunculis *filiformibus*, *triquetris*, *infimis* longiſſimis, *pendulæ*. Bracteæ *foliaceæ*, *vaginentes*, *maſculæ apicem plerumque non ſuperantes*: *ſuperiore propria Spica demum breviore*. Cal. ſquamæ *maſculæ oblongæ*, *acutæ*, *albidæ*, *nervo viridi*. (a. ♂.) *femineæ ovato-ſetaceæ* (A. ♀.) Capſulæ *ventricoſæ*, *ſubtrigonæ*, *erectæ*, *inferiores remotiores*, *alternæ*; *ſuperiores ſubtriſtichæ*, *approximatæ*: *roſtro longo*, *ſetaceo recto*, (p. P.) *apice bicuſpidato*.

721. CAREX, *palleſcens*, ſpicis pendulis: maſcula erecta, femineis ovatis imbricatis, capſulis confertis obtuſis. *Linn. Spec.* 1386. [*Hall.* 1393.]

H. in pratis udis paſſim. Floret Majo.

T. XV. f. 4. Radix *multiplex, fibroſa.* Culmi *numeroſi, aggregati, ſpithamæi* ſ. *pedales, ſubfoliati, triquetri, ſcabri.* Folia radicalia *latiuſcula, ſubcarinata, hiſpida.* Fol. culmea 5 ſ. 6, *conſimilia, ſupremo culmo longiore: Vaginis ſubvilloſis.* Spica terminalis maſcula, (♂.) *teres ſubferruginea;* femineæ duæ ſ. tres *pedunculatæ, ſubremotæ: florentes ovatæ, erectæ,* (*Fig. infer.*) *fructu maturo ſubovatæ, pendulæ.* (*Fig. ſuper.*) Bracteæ *foliaceæ ſubvaginantes, baſi transverſim undulato-plicatæ: quarum infima auriculis duabus baſi aucta, longitudine maſculæ; ſubſequens anguſtior: tertia ſetacea, propria ſpica vix longior.* Cal. ſquamæ *maſculæ obovatæ, acutæ;* (♂. A.) *femineæ ovatæ, acuminatæ, minores, griſeo-virentes, capſulis breviores.* (a. ♀.) Capſulæ *confertæ, oblongæ, inflatæ, obtuſiſſimæ.* (p. P.)

722. CAREX, *panicea*, ſpicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capſulis obtuſiuſculis inflatis. *Linn. Spec.* 1387. [*Hall.* 1405.]

H. in pratis uliginoſis paſſim. Floret Aprili, Majo.

T. XV. f. 5. Radix *repens.* Culmi *ſpithamæi, demum pedales, erecti, incurvi: inferne foliati, teretes, ſuperne nudi, obtuſe trigoni, læves.* Folia *latiuſcula, ſubcarinata, ſcabra, ſubtus glauco-viridia, culmo breviora.* Spica terminalis maſcula, *cylindrica;* femineæ duæ (*ſæpe unica*) *pedunculatæ, erectæ, lineares, graciliores, longiores, remotæ.* Bracteæ *foliaceæ, vaginantes, convexæ, inferiore demum propria ſpicula vix longiore.* Cal. ſquamæ *atro-purpureæ, nervo flavo, albido-marginatæ: maſculæ oblongæ, obtuſæ;* (♂. a.) *femineæ ovatæ, acutæ.* (♀. a.) *capſulis breviores.* Capſulæ *paucæ, inflatæ, ſubgloboſæ. vel confertiores flaveſcentes, vel remotiores alternæ, ſæpe atræ, apice breviſſimo bifido, recurvo.* (p. P.)

Variat a. *Spica feminea ſuprema ſæpe androgyna;* b. *Spica feminea tertia ex baſi culmi prodeunte, longiſſime pedunculata;* c) Capſulis *uſtilagine correptis, majoribus, globoſis, cruſta cinerea nitida induratis.*

d. *Spicis ſexu diſtinctis*: *maſculis pluribus*.

723. CAREX, *acuta*, ſpicis maſculis pluribus, femineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis. *Linn. Spec.* 1388.

nigra. α. Cyperoides nigro-luteum vernum minus. *Scheuchz. Agr.* 460 (*Hall.* 1406.) Tab. XVI. Fig. I. +

rufa. β. Cyperoides latifolium ſpica rufa, ſive caule triangulo. *Scheuchz. Agr.* 458. (*Hall.* 1404.) Tab. XVI. Fig. I.

H. α. in pratis inundatis paſſim, β. ad ripas *Dillæ*, *auf der Weiſsgärberwieſe*, & alibi frequens. Floret Majo.

T. XVI. f. I. +. Var. α. Culmo *palmari*, ſ. *ſpithamaeo*, *ſpicis omnibus atris*, *magis approximatis*, & *feminea ſaepe unica tantum*, *abſque nervo viridi ſquamarum*, *differt*.

T. XVI. f. I. Var. β Radix *craſſa*, *ſubrepens*. Culmi 2-3-*pedales*, *triquetri*, *firmi*, *hiſpidi*, *ad medium uſque foliati*. Folia *culmea latiuſcula*, *carinata*, *apice involuta*, *marginibus & partim carina hiſpida*, *ſuperiora longitudine culmi*. Spica terminalis & tres ſ. quatuor laterales maſculæ, *ſeſſiles*, *alternae*, *approximatae*: quarum unica ex infimis ſæpe androgyna, *ad baſin pluribus ſpiculis minimis aucta*. Spicæ femineæ duæ, rarius tres, *remotae*, *cylindraceae*, *maſculis longiores*; *florentes ſeſſiles*, *fructu maturo pedunculatae*, *erectae*, *ſubangulatae*. Maſc. Bracteæ *atro-ſpadiceae*, *truncatae interjecto mucrone ſetaceo*, *nervo viridi*. Androgynæ Bractea *foliacea*, *anguſta*, *ſeſſilis*, *baſi auriculata*, *propria ſpica longior*. Fem. Bracteæ Folia *ſeſſilia*, *maſculam terminalem non ſuperantia*, *duo tantum culmi latera baſi amplectantia*, *auriculata*: *ſquamis* 2, *ſubrotundis*, *atro-ſpadiceis*, *tertio lateri culmi adpreſſis*. Cal. ſquamæ *obovatae*, *ſpadiceae*, *nervo viridi plus minusve conſpicuo*. Stylus in hac ſemper bifidus. (o. O.) Capſulæ *hinc convexae biſulcatae*, *inde planiuſculae apice breviſſimo bifido*, *calyce majores*. (p. P.)

724. CAREX, *veſicaria*, ſpicis maſculis pluribus, femineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis. *Linn. Spec.* 1388.

α. Cyperoides veſicarium, ſpicis viridantibus & ſubfuſcis. *Scheuchz. Agr.* 470? (*Hall.* 1409?) Tab. XVI Fig 2. II.

β. Cyperoides latifolium, ſpica ſpadiceo-viridi majus. *Scheuchz. Agr.* 464. & Cyperoid. anguſtifol. 452. (*Hall.* 1398. & 1399?) Tab. XVI. Fig. 2 I.

γ. Cyperoides veſicarium, ſpicis teretibus erectis majus. *Scheuchz. Agr.* 476. (*Hall.* 1401?) Tab. XVI. Fig. 2. III.

H. α. & β. in paludoſis ad pagum *Sinn*; γ. in foſſis urbis & cœmeterii; *auf dem Judenweyher*, ad ripas *Dillæ am ſteinern Waag* frequens. Floret Majo.

T. XVI. f. 2. Var. α. (II.) differt: *Foliis anguſtiſſimis, longiſſimis; Spicis femineis gracilioribus, pendulis:* (♀.) *quarum infima ſæpe minoribus ſpiculis baſi aucta; Capſulis minoribus divergentibus.* Var. β. (I.) *Spicis maſculis paucioribus,* (*ſæpe* 2,) *craſſioribus;* (♂.) *infima androgyna;* (♂. ♀.) Capſulis *ellipticis, convexis, ſubfuſcis.* (I. p.) *Hæc plurimis notis fructu maturo ad* Car. *acutæ* var. β. *accedit, at ſtylus ſemper trifidus.*

Var. γ. (III.) Radix *craſſa, profundiſſime deſcendens.* Culmi 2 - f. 3 - *pedales, foliati, triquetri, hiſpidi.* Folia *lata, carinata, hiſpida, culmo longiora.* Spicæ maſculæ 2 f 3 *terminales, ſubremotæ, ſeſſiles, cylindraceæ: defloratæ ventricoſiores, ſquamis laxis.* Spicæ femineæ 2, rarius 3, *pedunculatæ, remotæ: florentes graciles,* (♀. *fig. infer.*) *maturo fructu craſſiores, erectæ.* (♀. *fig. ſuper.*) Bracteæ *foliaceæ, ſubvaginantes, inferiores culmum ſuperantes.* Cal. ſquamæ *ſubfuſcæ, nervo viridi: maſculæ oblongæ, acutiuſculæ;* (a. A. ♂.) *femineæ lanceolato - ſetaceæ,* (♀. a.) *Capſulis breviores.* Stylus Nectario *acutiſſime bifido* (l. L*.) *brevior,* (n. N.) *conſtanter trifidus.* (o.) Capſulæ *erecto patentes, inferiores remotiores. ventricoſæ, inflatæ, ſtriatæ, flaveſcentes, collo acuminato, breviſſime biroſtri.* (p. P.)

725. CAREX, *hirta*, ſpicis remotis: maſculis pluribus, femineis ſubpedunculatis erectis, capſulis hirtis. *Linn. Spec.* 1389. [*Hall.* 1403.]

H. in pratis udis *im Stübersgrund* copioſe; ad foſſas *in der Alzbach* frequens. Floret Majo.

T. XVI. f. 3. Radix *craſſa, teres, ſubarticulata, ſquamis veſtita ſetoſis; horizontaliter profunde ſub terra repens.* Culmi *ſpithamæi, demum ultrapedales, ſubfoliati, ſubtrigoni, inter ſpicas triquetri.* Folia *latiuſcula, carinata, firma, ſcabra.* Spica terminalis, & 1 f. 2 laterales *duplo minores* maſculæ, *ſeſſiles, oblongæ, ventricoſæ, ſubapproximatæ;* Bracteis *ſeſſilibus, ſetaceis, brevibus:* (♂.) *quarum infima carinata. longitudine propriæ ſpicæ.* Spicæ femineæ duæ, *a maſculis remotæ, pedunculatæ, erectæ, florentes graciles.* (I. ♀.) Bracteæ *foliaceæ, vaginantes, carinatæ, longitudine maſculæ terminalis* Cal ſquamæ *maſculæ obovatæ, purpuraſcentes, nervo viridi apice prominulo;* (♂.) *femineæ lanceolato-ſetaceæ,*

ſetaceæ, capſulis longiores; inferiores remotiores, alternæ. (♀. a. p.) Nectarium *apice profunde bifidum.* (L. l.) Capſulæ *ventricoſæ, acuminatæ, ſubbicornes,* (p.) *ſupra planiuſculæ.*

In hac Vaginæ, Folia, Culmi apex, Squamæ maſculæ, Capſulæ, omnia albido villoſa. Pedunculi & Squamæ femineæ *tantum nudæ læves.*

SPARGANIUM. *G. P.* 1041.

TAB. XIII. f. 11. MASC. Amentum ſubrotundum. (♂) *Cal.* 3-phyllus. (c. ♂. C.) *Cor.* nulla.

FEM. Amentum ſubrotundum. (♀) *Cal.* 3-phyllus. (♀ c. C.) *Cor.* nulla. *Stigma* bifidum. (o) *Drupa* exſucca, (p) 1-ſperma. (r. u. ſ.) *S. N.* 615.

726. SPARGANIUM, *erectum*, foliis erectis triquetris. *Linn. Spec.* 1378. [*Hall.* 1303.]

H. in foſſis urbis *im Judenweyher*, ad ripas *Dillæ am Bockshayn*, alibique frequens. Floret Junio.

Spica ſimplici & ramoſa variat. Calycis *foliola erecta; ſuperne latiora, apice inflexo ſubtrifido.* (c.) Stamina *Calyce longiora.* (m. M.) Stigma *ſæpiſſime unicum, rima longitudinali,* (O*. o.) *rarius duo.* (o.) Drupa (p.) Nucleum *plerumque unicum,* (r.) *angulatum,* (u.) *monoſpermum,* (ſ.) *condens.*

TYPHA. *G. P.* 1040.

MASC. Amentum cylindricum, *Cal.* obſoletus, 3-phyllus. *Cor.* o.

FEM. Amentum cylindricum, infra maſculos. *Cal.* capillo villoſo. *Cor.* o. *Sem.* 1. inſidens Pappo capillari. *S. N.* 614.

727. TYPHA, *latifolia*, foliis ſubenſiformibus, ſpica maſcula femineaque approximatis. *Linn. Spec.* 1377. [*Hall.* 1305.]

H. in foſſis & ſtagnis ad *Greiffſtein* & *Emmerichenhayn*. Floret Julio. ♃.

Typhæ *fructificationis partes ſufficienter examinare, mihi nondum licuit.*

C. *TETRANDRIA.*

URTICA. *G. P.* 1054.

MASC. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Nectarium* centrale, cyathiforme.

FEM. *Cal.* 2-valvis. *Cor.* o. *Sem.* 1, nitidum. *S. N.* 621.

728. URTICA, *urens*, foliis oppoſitis ovalibus. *Linn. Spec.* 1396. [*Hall.* 1615.]

H. in cultis, juxta parietes & ſepes hortorum paſſim. Floret Junio & ſeq.

Pharm. URTICÆ MINORIS Herba.

729. URTICA, *dioica*, foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis. *Linn. Spec.* 1396. [*Hall.* 1614.]

H. ad ſepes ubique. Floret æſtate.

Pharm. URTICÆ MAJORIS Herba, Radix.

In hac & præcedente Calyx femineus tetraphyllus: foliolis duobus ovato-cordatis, duobus oppoſitis ovatis exiguis, quadruplo minoribus.

BETULA. *G. P.* 1052.

MASC. *Cal.* 1-phyllus 3-fidus, 3-florus. *Cor.* 4-partita.

FEM. *Cal.* 1-phyllus, ſub 3-fidus, 2-florus. *Semina* utrinque membrana alata. *S. N.* 621.

730. BETULA, *alba*, foliis ovatis acuminatis ſerratis. *Linn. Spec.* 1393. [*Hall.* 1628.]

H. in ſylvis ad *Ballersbach*; *am Homberg.* Floret Majo.

Amenta maſcula *cylindracea brevia, ſolitaria vel gemina, ſimplici pedunculo pendula.* Calyx *ſquamis conſtat tribus: media majore, pubeſcente, laterales 2 obtegente.* Corollæ *tres patentes, laciniis inæqualibus: quarum extima reliquis quadruplo major; huic oppoſita multo minor, utraque oblonga; reliquæ duæ oppoſitæ, ovatæ, exiguæ ſtaminibus breviores.* Amenta *feminea ſolitaria cylindracea, graciliora, pedunculis petiolaribus pendula.* Strobilus *cylindricus, ſquamis membranaceis imbricatus.* Semina *alata.*

731. BETULA, *Alnus*, pedunculis ramoſis. *Linn. Spec.* 1394. [*Alnus. Hall.* 1630.]

H. ad ripas *Dillæ am ſteinern Waag*, & alibi frequens. Floret Aprili.

Amenta maſcula *inferiora*, *cylindracea*, *longa*; feminea *ſuperiora*, *pauciora*, *ex uno eodemque pedunculo ramoſo pendula.* Calyx *ſquamis conſtat quinis: media majori*, *lævi*, *laterales 4 ſemiobtegente.* Corollæ 3 *æquales: laciniis erecto-patulis.* Strobilus *ovatus: ſquamis coriaceis*, *duris*, *ternis ſemper oppoſitis inſtructus.* Semina *depreſſa*, *nuda*, *non alata.*

D. *POLYANDRIA.*

Stamina plura quam 7.

MYRIOPHYLLUM. *G. P.* 1066.

MASC. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Stam.* 8.
FEM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Piſtill.* 4. *Stylus* o. *Sem.* 4, nuda. *S. N.* 628.

732. MYRIOPHYLLUM, *ſpicatum*, floribus maſculis interrupte ſpicatis. *Linn. Spec.* 1409. [*Pentapteris Hall.* 993.]

H. in foſſis & fluviis; *auf der neuen Wieſe*, *in der Muhlbach*, *in der Dille vor dem Gebäude* frequens. Floret Julio.

Maſc. Flores corollati, *duplici* Calyce *inſtructi*; *quorum exterior 4-phyllus: foliolo extimo ovato*, *acuto*; *lateralibus 2 duplo minoribus*, *quarto cauli proximo exiguo*, *ſæpe nullo.* Calyx corollæ *monophyllus*, *ſemiquadrifidus. laciniis erecto patulis*, *ovatis*, *acutis*, *ſerratis.* Corollæ Petala *quatuor*, *calycis inciſuris inſerta*, *oblonga*, *convexa*, *erectiuſcula*, *ſubpurpurea*, *Stamina includentia*, *his erumpentibus mox decidua.* Stamina *petalis duplo longiora*, *erecta.* Germen *exiguum in in fundo Calycis ſterile*, Feminei flores apetali *cum Deſcriptione* Generica *exacte conveniunt*; Capſulas *tamen* 4 *connatas*, ſ. 4-*loculares*, 4-*partibiles*, *ſingulam* 1-*ſpermam*, *obſervo.*

733. MYRIOPHYLLUM, *verticillatum*, floribus omnibus verticillatis hermaphroditis. *Linn. S. N.* 628. *Spec.* 1409. [*Pentapteris. Hall.* 992.]

H. in piſcina Theriotrophei ſemel lectum. Flores nondum ſatis examinare licuit. Floret Julio.

CERATOPHYLLUM. *G. P.* 1065.

MASC. *Cal.* multipartitus. *Cor.* o. *Stamina* 16-20.

FEM. *Cal.* multipartitus. *Cor.* o. *Piſt.* 1. *Styl.* o. *Sem.* 1, nudum. *S. N.* 628.

734. CERATOPHYLLUM, *demerſum*, foliis dichotomo-bigeminis, fructibus triſpinoſis. *Linn. Spec.* 1409. [*Hall.* 1599.]
H. in piſcinis & foſſis ad *Beilſtein.* Floret Julio.

735. CERATOPHYLLUM, *ſubmerſum*, foliis dichotomo-trigeminis, fructibus muticis. *Linn. Spec.* 1409.
H. cum præcedente rarius. Floret Julio. +

POTERIUM. *G. P.* 1069.

MASC. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-partita. *Stam.* 30-40.

FEM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-partita. *Piſt.* 2. *Bacca* e tubo corollæ indurato. *S. N.* 629.

736. POTERIUM, *Sanguiſorba*, inerme, caulibus ſubangulofis. *Linn. Spec.* 1411. [*Pimpinella. Hall.* 706.]
H. in paſcuis & pratis ſiccis ubique. Floret Junio.
Pharm. PIMPINELLÆ MINORIS ſ. SANGUISORBÆ Herba.
In flore maſculo etiam Germen & ſtigmata; at imperfecta ſterilitaque omnia, uti in VALERIANA *dioica.*

FAGUS. *G. P.* 1072.

MASC. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. *Cor.* o. *Stam.* 12.

FEM. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* o. *Styli* 3. *Capſula* (Calyx antea) muricata, 4-valvis. *Sem.* 2. *S. N.* 630.

737. FAGUS, *ſylvatica*, foliis ovatis obſolete ſerratis. *Linn. Spec.* 1416. [*Hall.* 1622.]
H. in ſylvis pervulgaris. Floret Majo.

QUERCUS. *G. P.* 1070.

MASC. *Cal.* 5-fidus fere. *Cor.* o. *Stam.* 5-10.
FEM. *Cal.* 1-phyllus, integerrimus ſcaber. *Cor.* o. *Styli* 2-5. *Sem.* 1, ovatum. *S. N.* 629.

738. QUERCUS, *Robur*, foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus: angulis obtuſis. *Linn. Spec.* 1414. [*Hall.* 1626.]
H. cum præcedente, vaſtiſſimas Sylvas conſtituens. Floret Majo.
Pharm. QUERCUS Folia, Cortex.

JUGLANS. *G. P.* 1071.

MASC. *Cal.* 1-phyllus, ſquamiformis. *Cor.* 6-partita. *Filamenta* 18.
FEM. *Cal.* 4-fidus, ſuperus. *Cor.* 4-partita. *Styli* 2. *Drupa* nucleo ſulcato. *S. N.* 630.

739. JUGLANS, *regia*, foliolis ovalibus glabris ſubſerratis ſubæqualibus. *Linn. Spec.* 1415. [*Hall.* 1624.]
H. arbor culta intra & extra urbem, *vor dem untern Thor.* Floret Majo.

CORYLUS. *G. P.* 1074.

MASC. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, ſquamiformis, 1-florus. *Cor.* o. *Stam.* 8.
FEM. *Cal.* 2-phyllus, lacerus. *Cor.* o. *Styli* 2. *Nux.* ovata. *S. N.* 631.

740. CORYLUS, *Avellana*, ſtipulis ovatis obtuſis. *Linn. Spec.* 1417. [*Hall.* 1625.]
H. in ſylvis montoſis, ad ſepes paſſim. Floret Martio.

CARPINUS. *G. P.* 1073.

MASC. *Cal.* 1-phyllus: ſquama ciliata. *Cor.* o. *Stam.* 20.

FEM. *Cal.* 1-phyllus: ſquama ciliata. *Cor.* 0. *Germina* 2. *Styli* ſingulis 2. *Nux* ovata. *S. N.* 631.

741. CARPINUS, *Betulus*, ſquamis ſtrobilorum planis. *Linn. Spec.* 1416. [*Hall.* 1627.]
H. in ſylvis paſſim. Floret Aprili, Majo.

E. MONADELPHIA.

PINUS. *G. P.* 1077.

MASC. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* plurima. *Antheræ* nudæ.

FEM. *Cal.* ſtrobili: ſquama 2-flora. *Cor.* 0. *Piſt.* 1. *Nux* ala membranacea excepta. *S. N.* 632.

742. PINUS, *ſylveſtris*, foliis geminis: primordialibus ſolitariis glabris. *Linn. Spec.* 1418. [*Hall.* 1660.]
H. in ſylvis montoſis paſſim. Floret Majo.
Pharm. PINI Turiones ſ. Summitates, Reſina.

743. PINUS, *Abies*, foliis ſolitariis ſubulatis mucronatis lævibus bifariam verſis. *Linn. Spec.* 1421. [*Hall.* 1656.]
H. in ſylvis infrequens. Floret Majo.
Pharm. ABIETIS Reſina.

F. SYNGENESIA.

BRYONIA. *G. P.* 1093.

MASC. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Filamenta.* 3.

FEM. *Cal.* dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* ſubgloboſa, polyſperma. *S. N.* 640.

744. BRYONIA, *alba*, foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris. *Linn. Spec.* 1438. [*Hall.* 574.]
H. in dumetis & ſepibus paſſim. Floret Junio, Julio.
Pharm. BRYONIÆ Radix.

Bryonia noſtra[i] conſtanter eſt dioica. Mas & Femina loco natali plerumque a ſe in icem remotiſſimo creſcunt; Semel tantum, & quidem unico in loco, in ſepibus ad viam: *nach dem Roſenwäldgen*, Feminam cum Mare promiſcue ſcandentem obſervavi, Caulibus tamen ex diverſa Radice provenientibus.

Maris Pedunculi *folio longiores, multi-* (10-20) *flori*; Pedicellis *umbellaribus vel ſubcymoſis, ſub floreſcentia pedunculo longioribus.* Floribus *triplo minoribus, albidioribus*: Staminibus *nullis*; Piſtillo *perfecto fertili*: Bacca *globoſa, rubra*, 5 ſ. 6-*ſperma.*

CLASSIS XXII.

DIOECIA

A. *DIANDRIA.*

SALIX. *G. P.* 1098.

MASC. *Amenti* ſquamæ. *Cor.* 0. *Glandula* baſeos nectarifera.

FEM. *Amenti* ſquamæ. *Cor.* 0. *Stylus* 2-fidus. *Capſ.* 1-locularis, 2-valvis. *Sem.* pappoſa. *S. N.* 647.

a. *Foliolis glabris ſerratis.*

745. SALIX, *triandra*, foliis ſerratis glabris, floribus triandris. *Linn. Spec.* 1442. [*Hall.* 1637.]

H. Mas, ad ripas *Dillæ gegen dem Schieſsplatz über*; Femina *bey dem Sinnerhoff.* Floret Majo.

Amenta *pedunculata, foliata.* Glandula *duplex ſingulæ ſquamæ: unica major, convexa, ſubemarginata, ſupra filamenta ſquama baſi, & unica minor infra filamenta ſquamæ medio affixa. Similes glandulas duplices, figura & magnitudine diverſas, in omnibus fere* Salicibus *noſtratibus obſervavi. In nonnullis utraque glandula baſi coalita, filamentorum baſin veſtiens; in aliis inferior longior ipſa ſuperiori, in aliis vice verſa.*

746. SALIX, *phylicifolia*; foliis ſerratis glabris lanceolatis: crenis undatis. *Linn. Spec.* 1442.

H. Mas, in ſalicetis *bey dem Sinnerhoff.* Floret Majo.

755. SALIX, *arenaria*, foliis integris ovatis acutis: ſupra ſubvilloſis, ſubtus tomentoſis. *Linn. Spec.* 1447. [*Hall.* 1642.]
H. Mas, ad ripas *Dillæ*, *auf der Weiſsgärberwieſe*; Femina *an der Mühlbach bey dem Steghaus*, alibique. Floret Aprili.

c. *Foliis ſubſerratis*, *villoſis*.

756. SALIX, *caprea*, foliis ovatis rugoſis: ſubtus tomentoſis undatis, ſuperne denticulatis. *Linn. Spec.* 1448. [*Hall.* 1653.]
H. Mas, *unter der neuen Brücke*; Femina, *in der Callenbach*, *volgaris*. Floret Aprili.

757. SALIX, *viminalis*, foliis ſubintegerrimis lanceolato-linearibus longiſſimis acutis ſubtus ſericeis, ramis virgatis. *Linn. Spec.* 1448. [*Hall.* 1641.]
H. Mas, ad ripas *Dillæ unter der neuen Brücke*; Femina ibidem & *am ſteinern Waag*. Floret Aprili.

758. SALIX, *cinerea*, foliis ſubſerratis oblongo-ovatis: ſubtus ſubvilloſis, ſtipulis dimidiato-cordatis. *Linn. Spec.* 1449.
H. Femina, ad ripas *Dillæ* cum præcedente. Floret Aprili.

759. SALIX, *alba*, foliis lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glanduloſis. *Linn. Spec.* 1449. [*Hall.* 1635.]
H. Femina, *an der Mühlbach*; *am Steghauſer Weg*. Floret Majo.

B. *TETRANDRIA.*

VISCUM. G. P. 1105.

MAS. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Filamenta* o. *Antheræ* calyci adnatæ.

FEM. *Cal.* 4-phyllus, ſuperus. *Stylus* o. *Cor.* o. *Bacca* 1-ſperma. *Sem.* cordatum. *S. N.* 650.

760. VISCUM, *album*, foliis lanceolatis obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axillaribus. *Linn. Spec.* 1451. [*Hall.* 1609.]

H. in Pyro, Malo, imprimis Quercu, paraſitica; ad pagum *Seelbach* frequens. Floret Martio.
Pharm. VISCI Lignum.

C. *PENTANDRIA.*

CANNABIS. *G. P.* 1115.

MAS. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0.
FEM. *Cal.* 1-phyllus, integer, latere hians. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Nux* 2-valvis, intra calycem clauſum. *S. N.* 653.

761. CANNABIS, *ſativa*, *Linn. Spec.* 1457. [*Hall.* 1616.]
H. in cultis & agris, inter ſegetes *in der Aue* rarius. Floret Julio.
Pharm. CANNABIS Semina.

HUMULUS. *G. P.* 1116.

MAS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0.
FEM. *Cal.* 1-phyllus, oblique patens, integer. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Sem.* 1, intra calycem foliatum. *S. N.* 653.

762. HUMULUS, *Lupulus. Linn. Spec.* 1457. [*Lupulus. Hall.* 1618.]
H. in dumetis & ſepibus *am Steghäuſer Weg*, alibique copioſiſſime. Floret Julio.
Pharm. LUPULI Flores. (potius Strobili.)

D. *OCTANDRIA.*

POPULUS. *G. P.* 1123.

MAS. Amenti *Cal.* lamina lacera. *Cor.* turbinata, obliqua, integra.
FEM. Amenti *Cal.* & *Cor.* maris. *Stigma* 4-fidum. *Capſ.* 2-locularis. *Sem.* multa, papposa. *S. N.* 656.

763. POPULUS, *alba*, foliis ſubrotundis dentato-angulatis ſubtus tomentoſis. *Linn. Spec.* 1463. [*Hall.* 1634.]

H. Mas, ad pagos frequens, ad ripas *Dillæ* alibique parcius. Floret Martio, Aprili.

Gemmæ floriferæ *ovatæ, fuſcæ, nitidæ: ſquamis interioribus margine laceris, ſcarioſis.* Amenta *craſſiora, longiora, quam in P. nigra, ex ovata baſi cylindracea.* Cal. ſquamæ *ſemimultifidæ: laciniis ſimplicibus, villoſis.* Stamina 8.

764 POPULUS, *tremula*, foliis ſubrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Linn. Spec.* 1464. [*Hall.* 633]

H. Mas in ſylvaticis *am Geiſtlichenberg*, alibique frequens; Femina *am Hirſchberg bey der Horbacher Muhle.* Floret Martio.

Hujus partes fructificationis uti in præcedente.

765. POPULUS, *nigra*, foliis deltoidibus acuminatis ſerratis. *Linn. Spec.* 1464. [*Hall* 1632.]

H. Mas ad ripas *Dillæ* paſſim. Floret Martio.

Pharm. POPULI Gemmæ.

Gemmæ floriferæ *ovato oblongæ, acuminatæ: ſquamis integris, viſcoſis.* Amenta *cylindracea.* Cal. ſquamæ 3- ſ. 4-*partitæ. laciniis pinnatifido-multifidis, nudis.* Stamina 16.

E. *ENNEANDRIA.*

MERCURIALIS. *G. P.* 1125.

MAS. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Stam.* 9-ſ. 12. *Antheræ* globoſæ, didymæ.

FEM. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Capſula* dicocca, 2-locularis, 1-ſperma. *S. N.* 657.

766. MERCURIALIS, *perennis*, caule ſimpliciſſimo, foliis ſcabris. *Linn. Spec.* 1465. [*Hall.* 1601.]

H. in nemoroſis ad *Erbach* copioſiſſime, in ſylvaticis montoſis *am Homberg über der Lithau; am Callenbachsberg* rarius. Floret Aprili, Majo.

767. MERCURIALIS, *annua*, caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. *Linn. Spec.* 1465. [*Hall.* 1600.]

H. in cultis inter olera rarius. Floret Julio.

Pharm. MERCURIALIS Herba.

F. *MONADELPHIA.*

JUNIPERUS. *G. P.* 1134.

MAS. *Amenti* Calyx ſquamæ. *Cor.* o. *Stam.* 3.

FEM. *Calyx* 3 - partitus. *Petala* 3. *Styli* 3. *Bacca* 3 - ſperma, tribus tuberculis calycis inæqualis. *S. N.* 660.

768. JUNIPERUS, *communis*, foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. *Linn. Spec.* 1470. [*Hall.* 1661.]

H. ſylvis & montoſis ſterilibus paſſim. Floret Aprili, Majo.

Pharm. JUNIPERI Radix, Lignum, Baccæ, Reſina: (SANDARACA.)

Antheræ *ſub ſquamis lateralibus ſæpe* 5.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

A. *MONOECIA.*

HOLCUS. *G. P.* 1146.

HERMAPHROD. *Cal.* Gluma 1 - ſ. 2 - flora. *Cor.* Gluma ariſtata. *Stamina* 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.

MASC. *Cal.* Gluma 2 - valvis. *Cor.* o. *Stam.* 3. *S. N.* 669.

769. HOLCUS, *mollis*, glumis bifloris nudiuſculis: floſculo hermaphrodito mutico; maſculo ariſta geniculata. *Linn. Spec.* 1485. [*Avena. Hall.* 1485.]

H. in dumetis & ſepibus *in der Altzbach; am Geiſtlichenberg; im Fiſchweyhergrund* copioſe. Floret Julio Auguſto.

T. VII. f. 7. Radix *repens.* Culmi *pauci*, 2 ſ. 3 - *pedales*, *foliati*, 7 ſ. 9 - *nodes*, *læves*, *proſtrati*, *vel erecti*. *articulis infimis* 3 ſ. 4 *procumbentibus:* Geniculis *ſubrotundis*, *villoſis*. Folia *lata*, *plana*, *apicem verſus involuta*, *lævia*, *ſupra villis raris vix per lentem conſpicuis tactu mollia:* Vaginis *lævibus;* Ligula *ovata*, *crenulata.* Panicula 3 ſ. 4 - *pollicaris*, *ſub floreſcentia patens*, *albida; demum contracta*, *flaveſcens.* Pedun-

culi & Pedicelli *gemini, pauciflori, patentes, ſtricti, leviſſime villoſi, baſi calloſi.* Calyx *inæqualis, ovato-acuminatus, compreſſus, carinatus, ſubciliatus:* (a. A.) Valv. exterior *brevior, acuta albido-virens, baſi purpuraſcens:* interior *major, mucronata, nervis tribus viridibus: quorum duo laterales carinæ approximati, eidemque paralleli, a margine remoti.* Floſculi *duo calyce minores: quorum* inferior *ſabſeſſilis,* hermaphroditus: (☿) ſuperior *pedicellatus,* maſculus, *anguſtior;* (♂) *ſinguli* Valv. exterior *ventricoſa, trinervia,* interior *plana, mutica, ſubæqualis. Maſculus infra apicem* Ariſtam *exſerit dorſalem, ſcabram, rectam, demum geniculo ſubreflexam,* (♂. X.) *Calyce longiorem. In utroque Floſculo* Stamina *tria, calyce breviora:* Antheris *flaveſcentibus.* Hermaphroditi Nectaria 2, *lanceolato-acuminata* (l. L.) *Germine longiora.* Germen *ſubovatum.* (n. ☿.) Styli *patentes, plumoſi.* Semen *ovatum, acutum; corollæ adnatum,* (ſ. S.) *calyce tectum.* (a. ſ.) Maris Germen Nectariaque *exigua.* (♂. n.) Styli *breviſſimi, villoſi.* Semen *abortiens.*

Variat rarius; a) Floſculo *utroque* Hermaphrodito, *fertili.* b. Calyce *uno alterove trivalvi, trifloro: quorum infimus floſculus maſculus, reliqui duo pedicello oppoſite affixi hermaphroditi, unus infra apicem Ariſtam unicam, alter ex ipſo apice Ariſtas duas exſerit rectas.*

770. HOLCUS, *lanatus*, glumis bifloris villoſis: floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſta recurva. *Linn. Spec.* 1485. [*Avena. Hall.* 1484.]

T. VII. f. 6. Radix *multiplex, denſa, fibroſiſſima, radiculis ſubtomentoſis.* Culmi *plures, aggregati, foliati, erecti, articulo uno alterove inferiore obliquo:* Geniculis 3 ſ. 4, *cylindraceis, incraſſatis, villoſis.* Folia *lata, plana, utrinque molliſſime villoſa:* Vaginis *laxis, ſtriatis, villoſis, ſuprema ventricoſiore;* Ligula *truncata crenulata.* Panicula 4 ſ. 6*-pollicaris, patens, ſubdiffuſa, varie & pulchre colorata, demum palleſcens.* Pedunculi *gemini, multiflori, horizontales, molliſſime ſericeo-villoſi.* Calyx *biflorus uti in præcedente, glumis majoribus, oblongioribus, pubeſcentibus, magis coloratis, carina ſetis patulis diſtinctioribus ciliatis:* (a. A.) interioris Valvulæ *Nervi laterales duo a carina remoti, margini (nec carinæ) paralleli.* Floſculi *duo uti in H. molli;* Hermaphroditus *ſetis paucis baſi ſubhirtus.* (☿) Maris Ariſta *glabra, recta,* (X*) *demum recurva, uncinata, calyce brevior.* (X. ♂.) Antheræ *rubræ ſeu flavæ.* Nectaria *duo lanceolata, longitudine germinis.* (l. L.) Germen *Hermaphroditi,* (n. N. ☿)

Maris, (n. N. ♂.) *& reliqua uti in H. molli. In hoc ſæpius obſervantur: Floſculi pauci in ramulis Panicula inferioribus minores, albidi, ſteriles, emarcidi penduli.*

VALANTIA. *G. P.* 1151.

HERMAPHROD. *Cal.* 0. *Cor.* 4-partita. *Stam.* 4- *Stylus* 2-fidus. *Sem.* 1.

MASC. *Cal.* 0. *Cor.* 3-ſ. 4-partita. *Stam.* 3-ſ. 4. *Piſtillum* obſoletum. *S. N.* 672.

771. VALANTIA, *Cruciata*, floribus maſculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Linn. Spec.* 1491. [*Galium. Hall.* 709.]

H. in dumetis & ſepibus ad pagum *Breitſcheid* copioſe; *auf dem Schieſsplatz* parcius. Floret Majo, Junio.

Pharm. CRUCIATÆ Herba.

Radix *fibroſa, perennis.* Caules *plures, ſimplices, infirmi, erectiuſculi, tetragoni, piloſi.* Folia *quaterna, ovato-lanceolata, marginibus carinaque piloſa.* Pedunculi *axillares, utrinque tres, diphylli, piloſi, trifidi:* Pedicellus *intermedius ſimplex, brevior,* Flore hermaphrodito, a.) *ſeu a parte maſculina ſterili, fructifero, inſtructus, duo laterales ramoſo-quadrifidi: quorum infimus Pedunculus utrinque* Florem hermaphroditum (b.) *ſeu a parte feminea ſterilem; reliqui tres* Flores maſculos (c.) *proferunt.* Flores maſculi (c.) Antheris *polliniferis,* Piſtillo *nullo inſtructi, ſteriles, decidui.* Hermaphroditi (b.) Antheræ *polliniferæ;* Germen *exiguum;* Stylus *bifidus, breviſſimus,* Fructus *rudimentum abortiens, nutans.* Hermaphroditi Floris (a.) Antheræ *polline deſtitutæ;* Germen *didymum;* Stylus *ſemibifidus;* Fructus *unicus plerumque, altero abortiente, reniformi-globoſus, glaber, nervoſus, monoſpermus; pedicello revoluto, foliis reflexis caulique arcte adpreſſis occultatus. Foliolis floralibus tribus, Floribusque tam maſculis quam hermaphroditis quinquefidis, ſæpe ludit.*

ACER. *G. P.* 1155.

HERMAPHROD. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 8. *Piſtill.* 1. *Capſ.* 2 ſ. 3, monoſpermæ, ala terminatæ.

MASC. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 8. *S. N.* 674.

772. ACER, *Pſeudo-Platanus*, foliis quinquelobis inæqualiter ſerratis, floribus racemoſis. *Linn. Spec.* 1495. [*Hall.* 1029. *****]

H. pulcherrima arbor altitudine cum Quercu certans, in nemoribus *Steinkammern* vulgo dictis, ad pagum *Erbach* frequens. Floret Majo.

Racemi *ſubovati, cernui.* Flores *flavo-virentes.* Capſularum *alæ erectæ.*

773. ACER, *Platanoides*, foliis quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, floribus corymboſis. *Linn. Spec.* 1496. [*Hall.* 1029. ****]

H. in ſylvis *im Hirſchberg* rarius. Floret Majo. +

774. ACER, *campeſtre*, foliis lobatis obtuſis emarginatis. *Linn. Spec.* 1497. [*Hall.* 1029. ******]

H. in ſepibus hortorum paſſim ſterilis; in ſylvaticis montoſis *am Beilſtein* ad viam publicam & *am Callenbachsberg* fertilis. Floret Majo.

Corymbi *triplices flores, flavi*: a. Flores maſculi *reliquis minores*: Antheris *polliniferis*, Piſtillo *nullo*; b. Hermaphroditi: Antheris *polliniferis* Piſtilloque *imperfecto ſterili*; c. Fl. hermaphroditæ *majores*. Filamentis *corolla brevioribus*, Antheris *polline deſtitutis*, Piſtillo *perfecto fertili*, *inſtructi*. Capſularum *alæ patentes.* Receptaculum *proprium columnare*, *apice bifido.*

ATRIPLEX. *G. P.* 1153.

HERMAPHROD. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Stam.* 5- *Stylus* 2-partitus. *Sem.* 1, depreſſum.

FEM. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* o. *Stam.* o. *Stylus* 2-partitus *Sem.* 1. compreſſum. *S. N.* 673.

775. ATRIPLEX, *hortenſis*, caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Linn. Spec.* 1493.

H. in cultis *in der Putze*, quaſi ſpontanea frequens. Floret Julio.

776. ATRIPLEX, *haſtata*, caule herbaceo, calycinis valvulis femineis magnis deltoidibus ſinuatis. *Linn. S. N.* 673, *Spec.* 1494. [*Hall.* 1617.]

H. ad vias, in cultis *in der Pitze; vor dem Homberg*, & alibi frequens. Floret Julio, Auguſto.

Calycinæ valvulæ femineæ *haud raro in hac etiam diſco dentatæ.*

777. ATRIPLEX, *patula*, caule herbaceo patulo, foliis ſubdeltoideo-lanceolatis, calycibus ſeminum diſco dentatis. *Linn. Spec.* 1494. [*Hall.* 1616 *]

H, in cultis paſſim. Floret Julio, Auguſto.

B. *DIOECIA.*

FRAXINUS. *G. P.* 1160.

HERMAPHROD. *Cal.* o. *Cor.* o. *Stam.* 2. *Piſt.* 1. *Sem.* 1, lanceolatum.

FEM. *Piſt.* 1-lanceolatum. *S. N.* 679.

778. FRAXINUS, *excelſior*, foliolis ſerratis, floribus apetalis. *Linn. Spec.* 1509. [*Hall.* 528.]

H. ad ripas *Dillæ; an der Mühlbach;* in ſepibus *im Roſenwäldgen.* Floret Aprili.

Pharm. FRAXINI Cortex, Semina.

CLASSIS. XXIV.

CRYPTOGAMIA.

A. *FILICES.*

* *Fructificationes ſpicatæ.*

EQUISETUM. *G. P.* 1169.

Spica fructificationibus peltatis, baſi dehiſcentibus multivalvi. *S. N.* 684.

779. EQUISETUM, *ſylvaticum*, caule ſpicato, frondibus compoſitis. *Linn. Spec.* 1516. [*Hall.* 1680.]

H. in ſylvis *in der Hörre* copioſe, circa *Langenaubach*, *Rehe*, & *Breitſcheid* frequens; *am Beilſtein* rarius. Floret Aprili, Majo.

Frondes 3 ſ. 4-*pedales*: Caule *gracili*, *ſcabro*; Vaginis *amplis*, *dilatatis*. *dentibus latis.* Folia *in ſingulo* Verticillo 16-24, *longa*, *ſtricta*, *tenuia*, *tetragona*, *ſubſcabra*, *iterum verticillata*: Foliolis *quinis vel ſeptenis.* Spica *terminalis elongata in eadem fronde.*

780. EQUISETUM,

780. EQUISETUM, *arvenſe*, ſcapo fructificante nudo; ſterili frondoſo. *Linn. Spec.* 1516. [*Hall.* 1676.]

H. in agris *in der Aue*; in cultis *in der Putze* copioſiſſime, Floret Aprili, Majo.

Pharm. EQUISETI Herba.

Scapus *fructificans brevis, craſſus, aphyllus, marceſcens*: Vaginis *amplis, laxis.* Spica *oblonga, ventricoſa, acuta.* Frondes *ſteriles ſeriores, ſeſquipedales, ſcabræ*: Caule *tenui*; Vaginis *multidentatis*; Foliis 12-15 *in ſingulo verticillo, ſubramoſis.*

781. EQUISETUM, *paluſtre*, caule angulato, frondibus ſimplicibus. *Linn. Spec.* 1516. [*Hall.* 1677. α. & β. III.]

β, Equiſetum paluſtre minus polyſtachon. *Bauh. Pin.* 16. (*Hall.* 1677. α. II.)

H. α. in pratis paludoſis *hinter dem Homberg*; β, in pratis aquoſis *auf der Burgermeiſterwieſe* rarius. Floret Junio.

Scapus *fructificans pedalis, angulato ſulcatus, lævis, nudus*; Spica *reliquis minore, ovata, deflorata graciliori, lineari,* *Sub floreſcentia* Folia 6 ſ. 10 ex Vaginis *atris enaſcuntur brevia, demum longiora, ſulcata, lævia*; *apice caulis antea ſpicifero, in mucronem folio ſimilem longiſſimum producto.*

Hujus Pollen ex Spicæ Peltis *recens excuſſum, omnium vivaciſſimo ſaltare vidi.*

Pollen *hoc ſphærulis conſtat nitidis; quarum ſingula juxta baſin emittit fila quatuor albida æqualia, duo ſemper duplo longiora, omnia apice in tendiculom terminata; ante explicationem globulum arcte circumligantia. Si chartæ imponuntur, fila omnia elaſtice ſimul, annexa baſi, diſſiliunt; alterneque contractione & dilatatione, ſphærulæ tripudiare, & pyroboli inſtar ſubſultus facere, per lentem obſervantur.*

Var. β. *differt*: Frondibus *minoribus*; Foliis *fere omnibus apice ſpiciferis*; *caulina Spica reliquis duplo majore.*

782. EQUISETUM, *fluviatile*, caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus. *Linn. Spec.* 1517. [*Hall.* 1675.]

H. in foſſis *auf der neuen Wieſe, am Bockshayn* copioſe. Floret Majo, Junio.

Scapus *fructificans* 3 ſ. 4-*pedalis, craſſitie digiti minoris, aphyllus, ſtriatus, fiſtuloſus, glaber.* Spica *coloratiuſcula*: Polline *cæruleſcente.* Frondes *ſteriles majores, læves*: Vaginis *multidentatis*; Foliis *in ſingulo verticillo* 24-36-*ſimpliciuſculis, tetragonis, ſulcatis, lævibus.*

P

783. EQUISETUM, *limoſum*, caule ſubnudo lævi *Linn. Spec.* 1517. [*Hall.* 1077. β. II.]

H. in paludibus *am Muhlnberg* circa *Stin* copioſiſſime. Floret Majo.

Specimina mea vix credo differre a præcedente; Caulis *minus ſulcatus*, Vaginæ *ampliores*, *argutius dentatæ*. Folia *pauciora*, *ſæpe nulla*. Spica *ſimillima*.

784. EQUISETUM, *hyemale*, caule nudo ſcabro baſi ſubramoſo. *Linn. Spec.* 1517. [*Hall.* 1679.]

H. in ſylvaticis uhginoſis *im Breitſchneiderwald*, ad *Langenaubach*, *bey dem wilden Weiberhausgen* frequens. Floret Majo.

Caulis 3-4-5-*pedalis ſimplex*, *teres*, *ſtrictus*, *ſulcatus*, *aſperrimus*, *baſi tantum rarius ſoliofus*: Vaginis *brevibus*, *arctis*, *albis*; *dentibus nigris*. *Equiſetum hoc ob eximiam durabilitatemque aſperitatem*, *Scriniariis*, *Tornatoribus & Aurifabris neceſſarium*; *ad lævigationem & politionem aptiſſimum*.

OPHIOGLOSSUM. *G. P.* 1171.

Spica articulata, diſticha: articulis transverſim dehiſcentibus. *S. N.* 684.

785. OPHIOGLOSSUM, *vulgatum*, fronde ovata. *Linn. Spec.* 1518. [*Hall.* 1685. *Weis. Plant. crypt.* 283.]

H. in pratis editioribus ſubhumidis *in der Altzbach*; *am Homberg*; *im Guldaersgrund*; *im Thiergarten* copioſe. Floret Junio.

Pharm. OPHIOGLOSSI Herba.

OSMUNDA. *G. P.* 1172.

Spica ramoſa: Fructificationibus globoſis *S. N.* 684.

786. OSMUNDA, *Lunaria*, ſcapo caulino, ſolitario, fronde pinnata ſolitaria. *Linn. Spec.* 1519. [*Hall.* 1686. *Weis. P. c.* 285.]

H. in pratis & paſcuis ſiccioribus *hinter dem Homberg*; *im Thiergarten bey dem alten Haus* copioſe; *am Rehberg* parcius. Floret Majo, Junio.

Pharm. LUNARIÆ Herba.

787 OSMUNDA, *Spicant*, frondibus lanceolatis pinnatifidis: laciniis confluentibus integerrimis parallelis. *Linn. Spec.* 1522. [*Struthiopteris. Hall.* 1687. *Weis. P. c.* 287.]
H. in ſylvaticis circa *Niederdreſſelndorff* & *Burbach* rarius. Floret Junio.

** *Fructificationes frondoſæ, in pagina inferiore.*

ACROSTICHUM. *G. P.* 1173.
Fructificationes diſcum totum frondis tegentes. *S. N.* 685.

788. ACROSTICHUM, *ſeptentrionale*, frondibus nudis linearibus laciniatis. *Linn. Spec.* 1524. [*Hall.* 1714. *Weiſ. P. c.* 301.]
H. in fiſſuris rupium *am Homberg*, *im Beilſtein*, alibique. Floret Aprili.

POLYPODIUM. *G. P.* 1179.
Fructificationes in punctis ſubrotundis, ſparſis per diſcum frondis. *S. N.* 691.

a. *Fronde pinnatifida lobis coadunatis.*

789. POLYPODIUM, *vulgare*, frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata. *Linn. Spec.* 1544. [*Hall.* 1696. *Weiſ. P. c.* 303.]
H. ad radices Quercuum inque rupium fiſſuris, *am Homberg* & *Beilſtein* rarius; *im Hirſchberg* ad *Guntersdorff* alibique copioſe. Floret Aprili.
Pharm. POLYPODII Radix.

b. *Fronde pinnata.*

790. POLYPODIUM, *fontanum*, frondibus pinnatis laciniatis: foliolis ſubrotundis argute inciſis, ſtipite lævi. *Linn. S. N.* 693. *Spec.* 1550. *Hall.* 1706.
H. ad radices rupium *am Galgenberg* parcius. Floret Majo. +

c. *Fronde ſubbipinnata.*

791. POLYPODIUM, *criſtatum*, frondibus ſubbipinnatis: foliolis ovato-oblongis: pinnis obtuſiuſculis

apice acute ſerratis. *Linn. Spec.* 1551. *Hall.* 1705. *Weiſ. P. c.* 317. *var. Fil. fem.*

H. in dumetis *auf dem Galgenberg*. Floret Majo.

792. POLYPODIUM, *Filix mas*, frondibus bipinnatis: pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Linn. Spec.* 1551. *Hall.* 1701. *Weiſ. P. c.* 310.

H. in ſylvis, ad ſepes locis umbroſis paſſim. Floret Junio, Julio.

Pharm. FILICIS Radix.

793. POLYPODIUM, *Filix femina*, fronde bipinnata: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Linn. Spec.* 1551. *Hall.* 1703. *Weiſ. P. c.* 313.

H. in ſylvaticis *am Homberg*, in nemoroſis ad *Erbach* frequens. Floret Julio.

794. POLYPODIUM, *aculeatum*, frondibus bipinnatis: pinnis lunulatis ciliato-dentatis, ſtipite ſtrigoſo. *Linn. Spec.* 1552. *Hall.* 1712. *Weiſ. P. c.* 322.

H. in nemoroſis ad *Breitſcheid*; *im Hirſchberg*, & alibi infrequens. Floret Julio.

795. POLYPODIUM, *fragile*, frondibus bipinnatis: foliolis remotis: pinnis ſubrotundis inciſis. *Linn. Spec.* 1553. *Hall.* 1707. *Weiſ.* 319. *α.*

H. in muris pomœrii, in rupium fiſſuris *bey dem Kalkofen*; in nemoroſis circa *Erbach* copioſiſſime. Floret Julio.

796. POLYPODIUM, *regium*, frondibus bipinnatis: foliolis ſuboppoſitis: pinnis alternis laciniatis. *Linn. S. N.* 694. *Spec.* 1553. *Hall.* 1708. *Weiſ. P. c.* 321. *β. var. præc.*

H. in rupibus ad arcem *Beilſtein* frequens. Floret Julio.

d. *Fronde ſupradecompoſita.*

797. POLYPODIUM, *Dryopteris*, frondibus ſupradecompoſitis: foliolis ternis bipinnatis. *Linn. Spec.* 1555. *Hall.* 1699. *Weiſ. P. c.* 324.

H. in fiſſuris rupium *bey dem Eulenhauſe*; *am Homberg*; *im Hirſchberg* copioſe. Floret Julio.

ASPLENIUM. *G. P.* 1178.

Fructificationes in lineolis diſci frondis ſparſis. *S. N.* 689.

a. *Fronde pinnatifida.*

798. ASPLENIUM, *Ceterach*, frondibus pinnatifidis: lobis alteinis confluentibus obtuſis. *Linn. S. N.* 689. *Spec.* 1538. *Hall.* 1694.

H. in fiſſuris rupium *bey der Krebsgrube im Kamp*; *im Thiergarten* frequens. Floret Junio, Julio,

Pharm. CETERACH Herba.

b. *Fronde pinnata.*

799. ASPLENIUM, *Trichomanes*, frondibus pinnatis: pinnis ſubrotundis crenatis. *Linn. Spec.* 1540. *Hall.* 1693. *Weiſ. P. c.* 296.

H. in rupium fiſſuris *hinter dem Schloſs* copioſe. Floret Aprili.

Pharm. ADIANTI RUBRI ſ. TRICHOMANIS Herba.

800. ASPLENIUM, *Ruta muraria*, frondibus alternatim decompoſitis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Linn. Spec.* 1541. *Hall.* 1691. *Weiſ. M. M.* 298.

H. in muris antiquis paſſim. Floret Aprili.

Pharm. RUTÆ MURARIÆ Herba.

801. ASPLENIUM, *germanicum. Weiſ. P. c.* 299.

Aſplenium caule pinnato, pinnis imis trifoliatis, ſuperioribus ſimplicibus dentatis. *Hall.* 1690.

H, in rupium fiſſuris *am Homberg*; *am geiſtlichen Berg*; *im Beilſtein*; & alibi parcius. Floret Majo.

Diverſiſſimum a præcedente. Frondes *multo anguſtiores; altiores, magisque erectæ, ſimpliciter pinnatæ.* Stipes *ſubtrigonus, uno latere planiore, ad duas tertias partes nudus, inferne fuſco-purpureus, demum rufeſcens, inter folia flexuoſus.* Pinnæ 5 ſ. 7, *ſuboppoſitæ, anguſtæ, cuneiformi-oblongæ, erectæ, apice obtuſo, inciſo-crenato, diſco ſulcato; quarum infimæ duæ ſubpetiolatæ, ſubtrifoliatæ,* ſ. *trilobatæ: lobo infimo ad petiolum uſque diviſo; reliquæ pinnæ ſimpliciores, ſubbifidæ; terminali longiore ſubdentata.* Fruct. Lineolæ 2 ſ. 5, *longæ, diſtinctæ, ſquoma albida longitudinaliter rupta, cinctæ; demum non confluentes, Foliolique diſcum minime obtegentes, uti in R. muraria.* Capſulæ *pauciores, ſubfuſcæ, annulo craſſiore.*

802. ASPLENIUM, *Adiantum nigrum*, frondibus ſubtripinnatis: foliolis alternis: pinnis lanceolatis inciſo ſerratis. *Linn. Spec.* 1541. *Hall.* 1692.

H. in rupibus *am Homberg* parcius, *im Beilſtein* frequens, Floret Martio,

PTERIS. *G. P.* 1174.

Fructificationes in lineis marginalibus. *S. N.* 687.

803. PTERIS, *aquilina*, frondibus ſupradecompoſitis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis; ſuperioribus, minoribus. *Linn. Spec.* 1533. *Weiſ. P. c.* 289. *Filix Hall.* 1683.

H. in ſylvis ad *Breitſcheid*; *Schönbach*; & *Niederdreſſelndorf*. Floret Julio. +

B. *MUSCI.*

* *Acalyptrati.*

LYCOPODIUM. *G. P.* 1185.

Anthera bivalvis, ſeſſilis. *Calyptra* nulla. *S. N.* 697.

804. LYCOPODIUM, *clavatum*, foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Linn. Spec.* 1564. *Hall.* 1722. *Weiſ. P. c.* 269. *Neck. Method. Muſc.* 150.

H. in ſylvis *in der Hörre* circa *Bicken*; *im Hirſchberg* copioſe. Floret Julio.

Pharm. MUSCI CLAVATI Herba; LYCOPODII Semen.

805. LYCOPODIUM, *annotinum*, foliis ſparſis quinque fariis ſubſerratis, ſurculis annotino-articulatis, ſpicis terminalibus glabris erectis. *Linn. Spec.* 1566. *Hall.* 1720. *Weiſ. P. c.* 272. *Neck. M. M.* 146.

H. in ſylvis montoſis ad *Haynchen* verſus *Stegen*. *Ebertz.* M, D. Floret Julio. +

SPHAGNUM. *G. P.* 1187.

Anthera operculata: ore lævi. *Calyptra* nulla. *S. N.* 698.

806. SPHAGNUM, *paluſtre*, ramis deflexis. *Linn. Spec.* 1569. *Hall.* 1724. *Weiſ. P. c.* 263. Hypn. *cubile. Neck. M. M.* 188.

B. Sphagnum paluſtre molle deflexum, ſquamis capillaceis. *Dillen* H. M. 243. T. 32. f. 2.

H. α. & β. in paludoſis *unter dem Sinnerhof* copioſe. Floret Julio.

PHASCUM. *G. P.* 1189.

Anthera operculata: ore ciliata. *Calyptra* minuta. *S. N.* 699.

807. PHASCUM, *acaulon*, acaule, anthera ſeſſili, foliis ovatis acutis. *Linn. S. N.* 699. *Spec.* 1570. *Weiſ. P. c.* 266. *Sphagnum. Hall.* 1726. Br. *bulbiforme. Neck. M. M.* 230.

β. Shagnum acaulum bulbiforme minus. *Dillen* H. M. 253. T. 32. f. 12.

α. in areis hortorum paſſim; β. ad ſcrobes & vias cavas humidas *am Homberg* Floret Martio, Aprili.

Surculi *in α, baſi ramoſi; in β, ſimplices.* Folia *nervo carinali non deſtituta: ſuperiora triplo majora, apiçe pilifera.* Anthera *ſubgloboſa, ſubpedunculata, rufa.* Calyptra *Antheram oblique ſemiveſtiens, roſtrata.* Operculatum *roſtratum, rectum, in hoc & ſequente non deciduum. Cilias nondum vidi.*

808. PHASCUM, *ſubulatum*, acaule, anthera ſeſſili, foliis ſubulato-ſetaceis patulis. *Linn. Spec.* 1570. *Weiſ. P. c.* 268. *Sphagnum. Hall.* 1727. Bryum *ericetorum. Neck. M. M.* 231.

H. ad aggeres foſſarum, *am Homberg* alibique frequens. Floret Martio.

Surculi *cauleſcentes, ſimplices, ad duas tertias partes terra abſconditi.* Folia *inferiora ovato-acuminata, carinata, reflexa: ſuperiora longiſſima, lineari-ſubulata, plana, nervo deſtituta; juniora ſubſecunda.* Anthera *ovalis, pedunculata, flava.* Calyptræ & Opereuli *roſtrum obliquum.*

** *Calyptrati dicſini.*

POLYTRICHUM. *G. P.* 1192.

Anthera operculata, apophyſi minimæ inſidens. *Calyptra* villoſa.

Stella feminea in diſtincto individuo. *S.N.* 700.

809. POLYTRICHUM, *commune*, caule ſimplici, anthera parallelepipeda. *Linn. Spec.* 1573.

α. majus. *Weiſ.* P. c. 168. *Neck.* M. M. 124. Mnium. *Hall.* 1835.

β. minus. *Weiſ.* P. c. 171. Mn. *Hall.* 1835. α. γ.
γ. piloſum. *Weiſ.* P. c. 172. *Neck.* M. M. 123. Mnium. *Hall.* 1836.

H. in ſylvis paſſim; α. in uliginoſis ſpongioſis *im Beilſtein*, & *Hirſchberg* copioſe; β. in paſcuis editioribus ſubudis, *am Homberg & geiſtlichen Berg*; γ. in montoſis ſiccis *auf dem Eulenhauſe* alibique. Floret Novembr. in ver uſque.

Pharm. α. ADIANTI AUREI Herba.

Pol. *hoc* Calyptra *gaudet duplici*: *exteriore piloſa*, *interiore multo minore*, *membranacea*, *albida*, *lævi*, *exteriore obtecta*. In Var. γ. Folia *apice pilifera*, *certe margine non ſerrata*.

810 POLYTRICHUM, *urnigerum*, caule ramoſiſſimo, pedunculis axillaribus. *Linn. Spec.* 1573. *Neck. M M.* 120. *Bryum. Hall.* 1801.

H. in montoſis ſylvaticis Theriotrophei, alibique frequens. Floret autumno in ver uſque.

Surculi *juniores ſimplices*, *fere acaules*, *ſequentis ſimillimi*; Polus *ſerratis viridibus ſtellatim expanſis*: Pedunculo *terminali*; *adultiores demum ex latere ramoſi*, 2-ſ. 3-*pollicares*, *ſubdichotomi*, *ramis faſtigiatis*, *apice incraſſatis*. Folia *inferiora bima patula*, *rufa*; *ſuperiora annotina arcta*, *viridia*. Pedunculi *axillares*, *lateraleſque*, *rubri*, 2-3-*pollicares*: Vagina *rufa*: Tuberculo *flaveſcente*, *acuto*, *non bulboſo*. Anthera *ovato-cylindracea*, *rufa*, *erecta*, *demum obliqua* ſ. *ſubcernua baſi*, *ventricoſa albida*: Operculo *fulvo*, *cuſpide albida*: Ore *annulato*, *membrana albida tecto*; Ciliis 32; Apophyſi *nulla*.

Surculi feminei *ſimplices*, 2-*pollicares*; Foliis *veſtiti confertis*, *patulis*, *ſuperioribus contractis*; *terminalibus confertioribus*, *majoribus*, *radiantibus*. Stella *in centro ſeſſilis*, *ſcyphiformis*, *ſimplex*, *uti in* Pol. *communi*; *at multo minor*, *non prolifera*.

811. POLYTRICHUM, *nanum*, capſula cylindrica erecta; ſurculis, breviſſimis, foliis ſerrulatis. *Weiſ. P. c.* 173.

α. Mnium, *polytrichoides*, calyptra villoſa, var. β. *Linn. Spec.* 1577. *Hall.* 1837. Polytr. *mnioides*. *Neck* M. M. 123. *Dillen* H. M. 429. T. 55. f. 7.

β. Mn. *polytr.* var. α. *Linn. Spec.* 1576. *Hall.* 1838. Polytr. *nanum* folio non ſerrato *Weiſ.* P. c. β. 175. *Neck.* M. M. 119 *Dillen* H. M. 428. T. 55. f. 6.

H. α. ad terram in ericetis udis Theriotrophei, *am Graben nach dem alten Haus*; β. *in der Hörre*; *im Hirſchberg* frequens. Floret Februar. & ſeq.

Ob Surculos *demum ex latere proliferos*; Folia *ſerrata*; Antheras *demum albidas*, *membrana tectas*, Cilias 32; & Apophyſin *nullam*, *ſuſpicor hoc* Pol. *meram Varietatem juniorem eſſe præcedentis. In hujus* Individuis femineis *quorum* Folia *in ſtellam expanſa ſunt*, *nullum verum diſcum ſcobiferum reperire potui*; *In aliis vero ſurculis obverſe-conicis*, *vix tres vel quatuor lineas longis*, Foliis *adpreſſis*. Stellam *ſcyphiſormem*, *repetito-proliferam*, *obſervo*.

MNIUM. *G. P.* 1193.

Anthera operculata. *Calyptra* lævis.

Fem. capitulum nudum, pulverulentum remotum. *S. N.* 700.

812. MNIUM, *pellucidum*, caule ſimplici, foliis ovatis. *Linn.* 1574. *Hall.* 1853. *Weiſ. P. c.* 161. *Neck. M. M.* 233.

H. in paſcuis uliginoſis *im Stübersgrund*; *am ſteinern Berg* frequens. Floret Martio.

Antheræ & Capitula *in diſtincto individuo ſimplici.* Calyptra *albida*, *longa*, *conica*, *apice fulvo*, *baſi* 5-6-*fida.* Capitula *terminalia*, *ſcyphiformia*, *compoſita*: Foliolis 3 ſ. 5 *erectiuſculis*; *diſco convexo*: *ſcobe foliis per lentem ſimillima.*

813. MNIUM, *fontanum*, caule ſimplici geniculis inflexo. *Linn. Spec.* 1574. *Weiſ. P. c.* 145. *Hall.* 1851. *Bryum. Neck. M. M.* 209.

H. in pratis udis ſcaturiginoſis, *im Fiſchweyher-* & *Güldnersgrund*; in uligioofis *unter dem Sinnerhof* copioſe. Floret Majo.

Folia *ſerrulata*, *patula*; *in junioribus individuis ſubſecunda. In hoc* & *Mn. paluſtri individua ſtellata* & *antherifera baſi ita arcte cohærent*, *ut ambo ex eodem caule enaſci*, *primo intuitu*, *videantur*; *ſi cultello caute vero ſeparentur*, *ſemper diſtinctis ſurculis*, *femineis ſimplicioribus*, *reperiuntur.*

814. MNIUM, *paluſtre*, caule dichotomo, foliis ſubulatis. *Linn.Spec.* 1574. *Hall.* 1855. *Weiſ.P.c.* 165. *Bryum. Neck. M. M.* 210.

H. in pratis uliginoſis cum præcedente. Floret æſtate.

815. MNIUM, *androgynum*, caule ramoſo, androgynum. *Linn. Spec.* 1574. *Hall.* 1854. *Weiſ. P.c.* 163. *Mn. anguſtifolium. Neck. M. M.* 234.

β. Mnium *prolixum*. *Neck.* M. M. 235. *Hall.* 1856. *Dillen.* H. M. 235. T. 31. f. 4.

H. locis umbroſis uliginoſis paſſim; *β. im Stüberegrund.* Floret Aprili, Majo.

Antheræ & Capitula *in eodem individuo ramoſo.* Capitala *terminalia, pedunculata, ſubgloboſa, nuda: compoſita foliolis exiguis confertiſſimis, receptaculo ovato affixis, deciduis, caulinis folus per lentem ſimillimis.* Antheras *ſerius profert.*

Var. *β.* Caule 2-3-*pollicari, ramoſiſſimo, ramis caule brevioribus, attenuatis, omnibus apice capituliferis, differt.* Capitula *caduciſſima.*

816. MNIUM, *hygrometricum*, acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Linn. Spec.* 1575. *Hall.* 1852. *Weiſ. P. c.* 147. *Bryum. Neck. M. M.* 221.

H. ad muros; in umbroſis ad ſepes paſſim. Floret Februario, Martio.

817. MNIUM, *purpureum*, caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Linn. Spec.* 1575. *Bryum. Hall.* 1816. *Weiſ. P. c.* 198. *Neck. M. M.* 211.

β. Var. major: Surculis 2-pollicaribus dichotomo-ramoſis, operculo conico *Hall.* 1818. *Dillen.* 387. T. 49 f. 52.

H. ad muros cœmeterii & urbis; ad terram *auf dem Hinterſand*; *β.* in ſylvarum umbroſis *im Beilſtein; am Homberg* alibique copioſiſſime. Floret Februario, Martio.

818. MNIUM, *ſetaceum*, antheris erectis, operculis filiformibus longitudine antherarum. *Linn. Spec.* 1575. *Hypnum. Hall.* 1788. *Weiſ. P. c.* 206. *Bryum. Neck. M. M.* 212.

H. ad muros cum præcedente, vulgatiſſimum. Floret Februario, Martio.

819. MNIUM, *cirratum*, foliis areſactione revolutis. *Linn. Spec.* 1576. *Hypnum. Hall.* 1786. *Weiſ. P. c.* 207. *Bryum. Neck. M. M.* 213.

H. ad muros; in tectis vetuſtis ligneis *vor dem Homberg* rarius. Floret Martio, Aprili.

820. MNIUM, *annotinum*, foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis ſubradicalibus, antheris nutantibus. *Linn. S. N.* 700. *Spec.* 1576. *Weiſ. P. c.* 151. *Bryum. Neck. M. M.* 222.

H. in locis udis ſylvarum; *am Homberg*; *im Beilſtein*; in ambulacris hortorum *in denen Steghausgärten* frequens. Floret Junio.

Individua *juniora ſterilia bulbifera*: Bulbulis *purpureis ſubrotundis*, *pellucidis*, *ſolitariis*, *ſeſſilibus in foliorum alis.*

821. MNIUM, *hornum*, antheris pendulis, pedunculo curvato, ſurculo ſimplici, foliolis margine ſcabris. *Linn. Spec.* 1576. *Hall.* 1846. *Weiſ. P. c.* 149. *α. Bryum. Neck. M. M.* 215.

H. in nemoroſis, ad terram udam *im Hirſchberg* frequens. Floret Aprili, Majo.

822. MNIUM, *capillare*, antheris pendulis, foliis ovatis ſetiferis carinatis, pedunculis longiſſimis. *Linn. S. N.* 700. *Bryum capillare. Spec.* 1586. *Hypnum. Hall.* 1791. *Weiſ. P. c.* 205. *Bryum. Neck. M. M.* 214.

H. ad muros cum Mn. *cæſpititio*, *am Kirchhof*; *im Zwinger*; in uliginoſis *am Beilſtein* Pedunculis longioribus. Floret Aprili, Majo.

823. MNIUM, *cæſpititium*, antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-ſetaceis, pedunculis longiſſimis. *Linn. Spec.* ſub nom. *Br. cæſpitit.* 1586. *Br. Neck. M. M.* 228. *Hypnum. Hall.* 1790. *Weiſ. P. c.* 203.

H. ad muros pontis novi cœmeterii & urbis, alibique paſſim. Floret Martio, Aprili.

Ob individua ſtellifera Mniis *adſociandum.* Surculi feminei *diſtincti*, *ſimpliciſſimi*, 4-ſ. 5-*lineas longi*, *erecti*, *graciliores*: Foliis *veſtiti raris*, *minoribus*, *ceterum ſimillimis.* Stella *terminalis bulbiformis*; *rarius expanſa*; Foliis *latioribus*, *Capitulum pulverulentum*, *convexum*, *fuſcum*, *ſemincludentibus.*

824. MNIUM, *crudum*, antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis. *Linn. Spec.* 1576. *Hall.* 1843? *Bryum. Neck. M. M.* 223.

H. ad terram umbroſam, in ſylvula *auf der Amdorf hinter dem Weitzberg*, *linker Hand nach dem Thiergarten zu.* Floret Aprili.

Individua antherifera *ſeſquipollicaria*, *ſimpliciſſima*: Foliis *ſuperioribus triplo longioribus*, *confertis*, *erecto-patulis.* Anthera *ovato-cylindracea*, *erecta*: *dein nutans*, *demum iterum*

erecta. Calyptra *erecta, nutante Anthera recurva.* Operculum *hemiſphæricum, ore craſſius, umbilico protuberante brevi.* Individua ſtelliſera *vix ſemipollicaria; Foliis ſuperioribus latioribus, majoribus, in ſtellam expanſis: diſco pulverulento ſubfuſco.*

825. MNIUM, *ſerpillifolium*, pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Linn. Spec.* 1577.

α. punctatum *Dillen*, H. M. 416. T 53. f. 81. & forte 80. *Hall.* 1845. *Weiſ.* P. c. 153. Bryum. *Neck.* M. M. 216. & β. 217.

β. cuſpidatum. *Dillen.* H. M. 413. T. 53. f. 79. *Hall.* 1841. *Weiſ.* P. c. 155. Bryum *polymorph.* *Neck.* M. M. 218.

γ. proliferum. *Dillen.* H. M. 411. T. 52. f. 77. *Hall* 1839. Mn. *roſeum.* *Weiſ.* P. c. 157. Bryum *roſeum.* *Neck.* M. M. 219.

δ. undulatum. *Dillen.* H. M. 410. T. 52. f. 76. *Hall.* 1844. *Weiſ.* P. c. 158. Bryum *dendroides.* *Neck.* M. M. 218.

H. α. in ſylvis ad *Erbach*, locis opacis ad radices rupium *am Geiſtlichenberg*; β. ſimilibus in locis Theriotrophei; γ. locis udis umbroſis *hinter dem Schloſs in der* Höhle; δ. in pomariis ad ſepes *unter der neuen Brücke; bey dem Haynwinkelgen* copioſe. Floret Martio, Aprili.

826. MNIUM, *triquetrum*, foliis trifariis patulis ſubulato-lanceolatis carinatis. *Linn. Spec.* 1578. *Hall.* 1849. *Bryum. Neck. M. M.* 208.

β. Mnium. *Hall* 1847. *Dillen.* H. M. 405. T. 51. f. 73. & *Hall.* 1850. *Dill.* 412. T. 52. f. 78.

H. in paludoſis *am Muhlnberg*; *am Geiſtlichenberg*; β. *am Beilſtein* ad viam publicam alibique. Floret Majo.

827. MNIUM, *trichomanis*, foliis diſtichis integerrimis. *Linn. Spec.* 1578. *Neck. M. M.* 236. *no.* 4. *Jungermannia. Hall.* 1858.

H. iisdem in locis cum ſequente; *im Hirſchberg* copioſiſſime. Floret Aprili.

In hoc Perichætia *frondulis abſcondita vidi: ergo* Jungermanniis *adſociandum.*

828. MNIUM, *fiſſum*, foliis diſtichis bifidis. *Linn. Spec.* 1579. *Hall.* 1864. *Neck. M. M.* 236. *no.* 5.

H. ad radices & parietes rupium, in nemoroſis ad *Erbach*. Floret Majo.

Mnium *fiſſum* foliis bidentatis apice globuliferis *Neck.* M. M. 237. no. 6. *mera eſt varietas:* Foliis *viridioribus, magis approximatis, umbroſioribus locis provenien*s. *In* utroque Folia *duobus apicibus globulifera, haud raro obſervavi.*

*** *Calyptrati monoclini.*

BRYUM. *G. P.* 1194.

Anthera operculata. *Calyptra* lævis. *Filamentum* e tuberculo terminali ortum. *S. N.* 701.

a. *Antheris ſeſſilibus.*

829. BRYUM, *apocarpum*, antheris ſeſſilibus terminalibus, calyptra minima. *Linn. Spec.* 1579. *Weiſ. P. c.* 179. *Neck. M. M.* 199. *Hypnum. Hall.* 1793.

β. Sphagnum nodoſum hirſutum incanum. *Dillen.* H. M. 246. T. 32. f. 5. Bryum. *Weiſ.* P. c. 180. Hypnum. *Hall.* 1792.

H. ad ſaxa & terram truncoſque arborum, *am Homberg* alibique frequens. Floret Februario, Martio.

830. BRYUM, *ſtriatum*, antheris ſeſſilibus ſparſis, calyptris ſtriatis ſurſumve piloſis. *Linn. S. N.* 701. *Spec.* 1579.

α. majus. *Dillen.* H. M. 430. T. 55. f. 8. Polytrich *bryoides.* α. *Weiſ.* P. c. 175. Polytrich. *ſtriat.* *Neck.* M. M. α. 121. Bryum *Hall.* 1799. β.

β. minus *Dillen.* H. M 431. T. 55. f 9. *Weiſ.* P. c. 176. *Neck.* M. M 121. β. *Hall.* 1799. α.

γ. medium, *Dillen.* H. M. 432. T. 55. f. 10. *Hall.* 1799. γ.

δ. capillaceum. *Dillen* H. M. 433. T. 55. f. 11. *Weiſ.* P. c. 177. *Neck.* M. M. 122 γ. *Hall.* 1798.

H. α. ad truncos arborum paſſim; β. ad muros & ſaxa *am Homberg*; γ. in rupibus *am Galgen- und Geiſtlichenberg*; δ. in ſylvis ad truncos Fagorum Quercuunque. Floret Februario, Martio.

b. *Antheris pedunculatis erectis.*

831. BRYUM, *pomiforme*, antheris erectis ſphæricis. *Linn. Spec.* 1580. *Hall.* 1803. *Weiſ. P. c.* 181. *Neck. M. M.* 208.

H. in rimis rupium earumque cavernulis *am Homberg; Galgenberg*, Var. β. *Hall.* l. c. *im Thiergarten.* Floret Martio, Aprili.

832. BRYUM, *pyriforme*; antheris erectis obovatis, calyptra ſubulata, ſurculis acaulibus, foliis ovatis muticis. *Linn. Spec.* 1580. *Hall.* 1832. *Weiſ. P. c.* 183. *Neck. M. M.* 197.

H. in areis hortorum *in denen Steghausgärten*; *in aggeribus*, & ad parietes rivulorum *im Fiſchweyher- und Stubersgrund.* Floret Martio, Aprili.

833. BRYUM, *extinctorium*, anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis æqualibus. *Linn. Spec.* 1581.

α. minus. *Dillen.* H. M. 349. T. 45. f. 8. Hall. 1829. *Weiſ.* P. c. 185. *Neck* M. M. 207. α.

β. majus. *Dillen.* H. M. 350. T. 45. f. 9. *Hall.* 1828. *Weiſ.* P. c. 187. β. *Neck* M. M. β. 207.

H. α. ad muros urbis & cœmeterii; in rimis rupium *am Homberg* alibique frequens; β. ad radices rupium *am Geiſtlichenberg*; var. maxima in muris pomœrii frequens. Floret Martio, Aprili.

Suſpicor Mnii *borni* Var. *integrifolium*, Clar. *Weiſ.* P. c. 150. hujus Varietatem eſſe maximam: Surculis 2-3 *pollicaribus*, *ramoſis*, *ſemper ſterilibus.*

834. BRYUM, *ſubulatum*, antheris erectis ſubulatis, ſurculis acaulibus. *Linn. Spec.* 1581. *Hall.* 1827. *Weiſ. P. c.* 187. *Neck. M. M.* 194.

H. in cavis ſemitis *hinter dem Schloſs*; in fiſſuris rupium *am Geiſtlichenberg*, alibique frequens. Floret Martio, Aprili.

835. BRYUM, *rurale*, antheris erectiuſculis, foliis piliferis recurvis. *Linn. Spec.* 1581. *Neck. M. M.* 225. *Hypnum. Hall.* 1789. *Weiſ. P. c.* 210.

H. in ſylvis ad truncos arborum paſſim. Floret Februario, Martio.

836. BRYUM, *murale*, antheris erectis, foliis piliferis rectiuſculis, ſurculis ſimplicibus cæſpitoſis. *Linn. Spec.* 1581. *Hall.* 1825. *Weiſ. P. c.* 189. *Neck. M. M.* 196.

β. minus, foliis non piliferis *Hall.* 1826. *Weiſ.* P. c. β. 191. *Neck*, M. M. 356. T. 45. f. 15.

H. α. ad parietes hortorum; in muris, & rupium fiſſuris *hinter dem Schloſs*, alibique; β. ad terram glareoſam *vor dem Homberg*. Floret Martio, Aprili.

837. BRYUM, *ſcoparium*, antheris erectiuſculis, pedunculis aggregatis, foliis ſecundis recurvatis, caule declinato. *Linn. Spec.* 1582. *Neck. M. M.* 223. *Hypnum. Hall.* 1777. *Weiſ. P. c.* 213.
H. in ſylvis, ad truncos arborum putridos paſſim. Floret Februario, Martio.

838. BRYUM, *undulatum*, antheris erectiuſculis, pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ſerratis. *Linn. Spec.* 1582. *Hall.* 1823. *Weiſ. P. c.* 196. *Br. phyllitidifolium Neck. M. M.* 203.
H. in aggeribus humidis umbroſis *hinter dem Schloſs in der Hohle; am Homberg*; in ſylvis paſſim. Floret Februario, Martio.

839. BRYUM, *pellucidum*, antheris erectiuſculis, foliis recurvis acutis, caule hirſuto. *Linn. Spec.* 1583. *Hall.* 1824. *Neck. M. M.* 204.
H. in paludoſis ſylvaticis ad pagum *Erbach*. Floret Octobri.

840. BRYUM, *heteromallum*, antheris erectis, foliis ſetaceis ſecundis. *Linn. Spec.* 1583. *Hall.* 1807. *Neck. M. M.* 229. *Hypnum. Weiſ. P. c.* 215.
H. ad terram in ericetis ad *Hörbach* & *Hirſchberg*. Floret autumno in ver uſque.

841. BRYUM, *tortuoſum*, antheris erectis, foliis ſetaceis imberbibus: ariditione tortis. *Linn. S. N.* 702. *Spec.* 1583. *Neck. M. M.* 227. *Hypnum. Hall.* 1787.
H. in rimis & cavernulis rupium, *im Thiergarten bey dem alten Haus* copioſe. Floret autumno in ver uſque.

842. BRYUM, *truncatulum*, antheris erectis ſubrotundis: operculo mucronato. *Linn. Spec.* 1584. *Hall.* 1833. *Weiſ. P. c.* 191. *Neck. M. M.* 195.
H. ad terram argilloſam, locis humidis umbroſis, *am Homberg* frequens. Floret Aprili.

843. BRYUM, *viridulum*, antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *Linn. Spec.* 1584. *Hall.* 1809. *Weiſ. P. c.* 193. *Neck. M. M.* 206.

H. locis umbroſis argilloſis ad terram, *am Homberg* cum Phaſco *ſubulato* copioſe. Floret primo vere.

844. BRYUM, *hypnoides*, antheris erectis, ſurculo erectiuſculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Linn. Spec.* 1584.

α. majus. *Dillen.* H. M. 372. T. 47. f. 32. *Moriſon Hiſt. Oxon.* III. Sect. XV. Tab. 5 ſer. 3. f. 7 *figr optima. Neck.* M. M. 226. Hypnum. *Hall.* 1780. Hypn. *caneſc.* α. *Weiſ.* P. c. 211.

β. minus. *Dillen* H. M. 368. T. 47. f. 27. *Linn. Flor. ſuec.* II. 1003. var. β *Weiſ.* P. c. 213. β.

γ. medium. *Dillen.* H. M. 371. T. 47. f. 31.

H. in ſylvis; α. inter ſaxa ad terram *am Homberg*; β. ad rupes in monte *Galgenberg*; γ. in rupibus & ad terram *am Geiſtlichenberg*; *Homberg*, alibique copioſe. Floret circa ver.

845. BRYUM, *verticillatum*, antheris erectis, pedunculis areſactione confertis, foliis piliferis, ſurculis faſtigiatis. *Linn. S. N.* 702. *Spec.* 1585. *Hall.* 1811? (*potius* Br. *æſtivum*.)

H. in rupibus *im Beilſtein.* Floret Aprili. +

c. *Antheris nutantibus.*

846. BRYUM, *argenteum*, antheris pendulis, ſurculis cylindricis imbricatis lævibus. *Linn. Spec.* 1586. *Hall.* 1821. *Weiſ. P. c.* 199. *Neck M. M.* 201.

β. viride. *Dillen.* H. M. 394. T. 50. f. 63.

H. α. in tectis rupibus & muris; ad terram ſabuloſam *auf dem Hinterſand*; in ambulacris hortorum copioſe; β. ſimilibus in locis parcius. Floret hyeme.

847. BRYUM, *pulvinatum*, antheris ſubrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Linn. Spec.* 1586. *Hall.* 1822. *Weiſ. P. c.* 201. *Neck. M. M.* 200.

H. in rupibus, ad muros antiquos paſſim. Floret primo vere.

848. BRYUM, *carneum*, antheris pendulis ſubgloboſis, foliis acutis alternis. *Linn. Spec.* 1587. *Hall.* 1834. *Neck. M. M.* 202.

H. in paſcuis uliginoſis *in der Callenbach*; ad terram humidam, & in ambulacris hortorum umbroſis *am Homberg*; *am Steghauſe*; alibique parcius. Floret Aprili.

849. BRYUM, *ſimplex*, antheris nutantibus oblongis, foliis ſubulatis, ſurculo ſimpliciſſimo: medio pedunculo-

dunculifero. *Linn. Spec.* 1587. *Hall.* 1808. & 1813. *Neck. M. M.* 202.

H. ad parietes rivulorum in pratis depreſſis *hinter dem Homberg.* Floret hyeme.

HYPNUM. *G. P.* 1195.

Anthera operculata. *Calyptra* lævis. *Filamentum* laterale, ortum e perichætio. *S. N.* 702.

a. *Frondibus pinnatis.*

850. HYPNUM, *taxifolium*, fronde ſimpliciſſima pinnata lanceolata baſi pedunculifera. *Linn. Spec.* 1587. *Hall.* 1775. *Weiſ. P. c.* 216. *Neck. M. M.* 151.

H. in ſylvis, locis umbroſis ad terram, circa *Erbach* florens copioſe; in cavernulis rupium *am Galgenberg*, alibique ſterile. Floret Octobri.

851. HYPNUM, *denticulatum*, fronde pinnata ſimplici: pinnis duplicatis, baſi pedunculifera. *Linn. Spec.* 1588. *Hall.* 1772. *Neck. M. M.* 154.

H. in ſylvis ad terram umbroſam humidam *hinter dem Homberg*, *im Thiergarten*, ad *Erbach* copioſe. Floret Aprili.

852. HYPNUM, *bryoides*, fronde ſimpliciſſima pinnata lanceolata apice pedunculifera. *Linn. Spec.* 1588. *Hall.* 1776. *Weiſ. P. c.* 217. *Neck. M. M.* 152.

H. ad terram udam, locis ſylvarum umbroſis, *am Homberg*, *Galgen-* & *Geiſtlichenberg* frequens. Floret Februario, Martio.

853. HYPNUM, *adiantoides*, fronde pinnata ramoſa erecta medio pedunculifera. *Linn. Spec.* 1588. *Hall.* 1774. *Neck M. M.* 153.

H. in pratis paludoſis *hinter dem Homberg*, alibique frequens. Floret Februario, Martio.

In hoc, taxifolio, & bryoideo Hypno, Frondis Folia *latere ſuperiore in duas laminas conduplicatas longitudinaliter, non vero ad apicem uſque fiſſa. In hoc & taxifolio, Folia apice ſerrata, in bryoideo acuminata integerrima.*

854. HYPNUM, *complanatum*, fronde pinnata ramoſa: foliolis imbricatis acutis complicatis compreſſis. *Linn. Spec.* 1588. *Hall.* 1771. & *var.* 1778. *Weiſ. P. c.* 218. *Neck. M. M.* 155.

H. in ſylvis, ad arborum truncos *im Thiergarten*; *am Homberg*, alibique copioſiſſime. Floret Aprili.

b. *Surculis vagis.*

855. HYPNUM, *rugoſum*, ſurculis vagis erectiuſculis: foliis ſecundis recurvatis baſi rugoſis. *Linn. S. N.* 703. *Mantiſſa* 131. *Hall.* 1735. Hypn. *lycopodioides. Neck. M. M.* 168. *α.*

H. locis ſylvaticis muſcoſis apricis *am* Homberg, *Geiſtlichenberg*; *im Thiergarten* frequens. Floret rarius Aprili.

856. HYPNUM, *undulatum*, ſurculis ramoſis; frondibus ſubpinnatis: foliolis undulatis complicatis. *Linn. Spec.* 1589. *Hall.* 1770. *Weiſ. P. c.* 220. *Neck. M. M.* 156.

H. locis ſaxoſis in ſylvis, circa Hörbach, *am ſteinern Berg.* Floret vix unquam.

857. HYPNUM, *criſpum*, ſurculis ramoſis, frondibus ſubpinnatis: foliolis undulatis planis. *Linn. Spec.* 1589. *Hall.* 1769. *Weiſ. P. c.* 221. *Neck. M. M.* 153.

H. in rupe *am Galgenberg gegen Burgk* parcius ſterilis; in nemoroſis ad *Erbach* florens copioſe. Floret Octobri.

858. HYPNUM, *triquetrum*, ramis vagis recurvis foliolis ovatis recurvatis patulis. *Linn. Spec.* 1589. *Hall.* 1729. *Weiſ. P. c.* 222. *Neck. M. M.* 185.

H. in ſylvis & pratis ſterilibus vulgatiſſimum. Floret Aprili.

859. HYPNUM, *rutabulum*, ramis vagis ſubrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis. *Linn. Spec.* 1590. *Hall.* 1730. *Weiſ. P. c.* 224. *Neck. M. M.* 178.

β. Operculis cuſpidatis, *Dillen.* H. M. 297. T. 38. f. 30. *majus & minus.*

H. *α.* in pomariis ad arborum truncos ubique copioſe, *β. majus*, in ſylvaticis *am Homberg*; *minus*, *an der Stadtmauer bey dem Haynwinkelgen.* Floret Februario, Martio.

860. HYPNUM, *ruſcifolium*, ſurculo repente, ramis imbricatis ſetiferis, foliis carinatis, capitulo ſubrotundo, incurvo, acuminato. *Neck. M. M.* 181. *Hall.* 1731? *Weiſ. P. c.* 225. *Dillen H. M.* 298. T. 38. f. 31.

H. locis ſaxoſis aquoſis *unter der neuen Brucke; am Waſſergraben, auf der Herrenwieſe gegen Burgk über;* alibique. Floret Martio.
Var. præcedentis?

e. *Surculis pinnatis.*

861. HYPNUM, *filicinum*, ſurculis pinnatis: ramulis diſtantibus, foliolis imbricatis incurvis acutis ſecundis. *Linn. Spec.* 1590. *Hall.* 1766. *Neck. M. M.* 164. *Weiſ. P. c.* 228. *α. ſpicatum.*
β. ramoſo-pinnatum. Weiſ. P. c. 229. *Hall.* 1767. *Dillen H. M.* 286. T. 36. f. 22.

H. in paludoſis paſſim, *im Callenbachs- & Stübersgrund* ſecus rivulos; *β.* in pratis udis *auf der Weiſsgärberwieſe.* Floret Majo, Junio.

862. HYPNUM, *proliferum*, ſurculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Spec.* 1590. *Hall.* 1764? *Weiſ. P. c.* 230. H. *tamariſcifolium. Neck. M. M.* 158.

H. in ſylvis ad *Erbach;* in pratis humidis *auf der Herrenwieſe* alibique. Floret Martio.

863. HYPNUM, *parietinum*, ſurculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Spec.* 1590. *Hall.* 1765. *Weiſ. P. c.* 232. *Neck. M. M.* 157.

H. in ſylvis ad terram, ubique copioſiſſime. Floret Aprili.

864. HYPNUM, *compreſſum*, ſurculo erecto, ramoſo, ramis baſi ſetiferis, planis recurviuſculis, ſtipite triplo brevioribus. *Neck. M. M.* 159. *Hall.* 1742. *Dillen H. M.* 312. T. 40. f. 47.

H. in ſylvarum locis humidis opacis, *am Homberg* frequens. Floret Aprili.

Nec diſtinctiſſima ſpecies; (*Neck.* l. c.) nec H. *cuſpidati varietas;* (*Weiſ.* P. c. 253.) *ſed potius Varietas eſt* Hypni *puri.*

865. HYPNUM, *prælongum*, ſurculis ſubpinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *Linn. Spec.* 1591. *Hall.* 1758. *Weiſ. P. c.* 235. *Neck. M. M.* 174.

H. ad terram & truncos arborum *hinter dem Schloſs in der Höhle;* in pomariis udis *vor dem Homberg* copioſe florens. Floret Martio, Aprili.

866. HYPNUM, *criſta caſtrenſis*, ſurculis pinnatis: ramulis approximatis: apicibus recurvis. *Linn. Spec.* 1591. *Hall.* 1768. *Weiſ. P. c.* 233. *Neck. M. M.* 165.

H. ad terram ſterile in ſylvis paſſim; in nemoroſis ad *Erbach* fructificans, rupes operiens copioſiſſime. Floret autumno in ver uſque.

867. HYPNUM, *abietinum*, ſurculis pinnatis tereti uſculis remoris inæqualibus. *Linn. Spec.* 1591. *Hall.* 1762. *Weiſ. P. c.* 236. *Neck. M. M.* 163.

H. in ſylvis *am Geiſtlichenberg*; *im Thiergarten* frequens; ſemper fructificatione deſtitutum. Floret - -

868. HYPNUM, *plumoſum*, ſurculis pinnatis repentibus, ramis confertis, foliis imbricatis ſubulatis, antheris erectis. *Linn. Spec.* 1592. *Weiſ. P. c.* 237. *Neck. M. M.* 173. var. β. *ſericei*.

H. in ſylvis ad arborum truncos; in ſaxis *am Geiſtlichenberg*. Floret April.

d. *Foliis reflexis*.

869. HYPNUM, *cupreſſiforme*, ſurculis ſubpinnatis, foliis ſecundis recurvis apice ſubulatis. *Linn. Spec.* 1592. *Hall.* 1737. *Weiſ. P. c.* 238. *Neck. M. M.* 166.

H. in ſylvis, ad arborum truncos paſſim. Floret Octobri in ver uſque.

870. HYPNUM, *aduncum*, ſurculis erectiuſculo-ſubramoſis, foliis ſecundis recurvis ſubulatis, ramis recurvatis. *Linn. S. N.* 704. *Spec.* 1592. *Hall.* 1736. *Weiſ. P. c.* 240. *Neck. M. M.* 167.

H. in paludoſis *unter dem Sinner Hof*, *am Mühlnberg*. Floret Junio, Julio.

871. HYPNUM, *viticuloſum*, ſurculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis. *Linn. Spec.* 1592. *Hall.* 1739. *Weiſ. P. c.* 241. *Neck. M. M.* 169.

H. in ſylvis, ad arborum truncos *am Geiſtlichenberg*; *am Homberg*; alibique frequens. Floret Hyeme.

872. HYPNUM, *ſquarroſum*, ramis vagis, foliis lanceolatis complicato-carinatis quinquefariam recurvatis. *Linn. S. N.* 704. *Spec.* 1593.

α. majus. *Hall.* 1732? *Weiſ.* P. c. 242. *Neck.* M. M. 171.
β. minus. *Hall.* 1733. *Weiſ.* P. c. 243.

H. α in ſylvarum locis udis paſſim; in pomariis *am Sieghaus, vor dem Homberg*; alibique fructificans; β. ſimilibus in locis *im Thiergarten*. Floret Octobri in ver uſque.

873. HYPNUM, *loreum*, ſurculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis ſecundis, antheris ſubrotundis. *Linn. Spec.* 1593. *Weiſ. P. c.* 244. *Neck. M. M.* 170.

H. in ſylvis ad terram *in der Hörre*; circa *Breitſcheid*; *im Hirſchberg* ad *Gundersdorf* copioſe. Floret Aprili.

e. *Surculis dendroidibus*, *ſ. faſciculatis.*

874. HYPNUM, *dendroides*, ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſimpliciuſculis, antheris erectis. *Linn. Spec.* 1593. *Hall.* 1747. *Weiſ. P. c.* 245. *Neck. M. M.* 187.

H. in pratis ſylvaticis udis *im Fiſchweyhergrund*; in pomariis *vor dem Homberg*. Floret Octobri in ver uſque.

Caulis *palmaris*, *erectus*, *veſtitus ſquamis obtuſiuſculis*, *adpreſſis*. Frons *erecta*, *ramis ſubæqualibus*, *ſimpliciuſculis*, *teretibus*, *erecto-patulis*, *arbuſculam exacte referens*. Folia *ſubſerrata*. Pedunculi *numeroſi*, *fronde longiores*. Anthera *cylindracea erecta*, *calyptra ad pedunculum uſque ſemitecta*. Operculo *conico*, *erecto*. Stylus *ex pedunculo elongato Antheram perforans*, *Pollenque colligens*, *ſupra anthera orificium prominens*, *operculo hinc ægre decidente*, *interne affixus*, *fere uti in* Buxbaumia. *Similem Stylum ſ. columnam in* Pol. *communi*, *& aliis quidem*, *non vero ſupra Antheram prominentem*, *operculoque cohærentem*, *vidi.*

875. HYPNUM, *alopecurum*, ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, antheris ſubnutantibus. *Linn. Spec.* 1594. *Hall.* 1748. *Weiſ. P. c.* 246. *Neck. M. M.* 186.

H. in nemoroſis ad *Erbach*, *bey denen Steinkammern*, arborum truncos rupesque operiens copioſiſſime. Floret autumno.

Caulis 4 ſ. 5-*pollicaris*, *obliquus*, *ſquamis veſtitus acuminatis*, *patulis albidis.* Frons *incurva*, *depreſſiuſcula: ramis ſubdepreſſis*, *inæqualibus*, *ſuperioribus ſubpinnatis.* Folia *ſerrata.*

Pedunculi *frondé breviores, incurvi.* Antheræ *ovales, obliquæ:* Operculo *roſtrato, incurvo.*

f. *Surculis tereti[uſ]culis.*

876. HYPNUM, *curtipendulum*, ſurculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis. *Linn. Spec.* 1594. *Hall.* 1740. *Weiſ. P. c.* 248. *Neck. M. M.* 177.

H. in ſylvis, ad arborum truncos *am Homberg*, alibique frequens. Floret Aprili.

877. HYPNUM, *purum*, ſurculis pinnato-ſparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis conniventibus. *Linn. Spec.* 1594. *Hall.* 1743. *Weiſ. P. c.* 249. *Neck. M. M.* 160.

H. in ſylvis & pomariis paſſim. Floret Martio.

878. HYPNUM, *riparium*, ſurculis teretibus ramoſis, foliolis acutis patulis diſtantibus. *Linn. Spec.* 1595. *Hall.* 1746. *Weiſ. P. c.* 250. *Neck. M. M.* 184.

H. in rivulis *bey der Lohmühle vor dem obern Thor*, alibique rarius. Floret Septembri.

879. HYPNUM, *cuſpidatum*, ſurculis vagis: apice foliis convolutis acuminato. *Linn. S. N.* 704. *Spec.* 1595. *Hall.* 1741. *Weiſ. P. c.* 251. *var. α. pungens, nec β. Neck. M. M.* 163.

H. in pratis & pomariis udis *hinter dem Homberg*, alibique vulgatiſſimum. Floret Majo, Junio.

g. *Surculis confertis.*

880. HYPNUM, *ſericeum*, ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubularis, antheris erectis. *Linn. Spec.* 1595. *Hall.* 1750. *Weiſ. P. c.* 254. *Neck. M. M.* 173. *α.*

β. Hypn. *ſtrigoſum. Neck.* M. M. 179. *Dillen* 327. T. 42. f. 62.
γ. Hypn. *ramoſum. Neck.* M. M. 180. *Hall.* 1753. *Dillen* 327. T. 42. f. 60.

H. ad truncos arborum & muros paſſim. Floret Martio, Aprili. Folia *ſtriata, nervo carinali, ſuperiora ſubſerrata.*

881. HYPNUM, *velutinum*, ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis fubulatis, antheris ſub-

nutantibus. *Linn. Spec.* 1595. *Hall.* 1754. *Neck. M. M.* 172. *Weiſ. P. c.* 256.

H. ad arborum truncos ubique. Floret Februario, Martio. Folia *ſerrata*, *nervo carnali nullo*.

882. HYPNUM, *ſerpens*, ſurculis repentibus, ramis filiformibus, foliis obliteratis. *Linn. Spec.* 1596. *Hall.* 1756. & *var. min.* 1757. *Weiſ. P. c.* 257. *Neck. M. M.* 175.

H. ad terram udam & arborum radices, locis umbroſis paſſim. Floret Majo & ſeq.

883. HYPNUM, *ſciuroides*, ſurculis erectis ramoſis incurvatis. *Linn. Spec.* 1596. *Hall.* 1749. *Weiſ. P. c.* 258. *Neck. M. M.* 175.

β. Hypn. *palatinum*. *Neck.* M. M. 182. *Dillen.* 320 T. 41. f. 55.

H. in ſylvis, pomariis, ad arborum truncos, alibique frequens; *β.* in tecto ligneo domunculæ *am Homberg*. Floret Octobri in ver uſque.

884. HYPNUM, *myoſuroides*, ſurculis ramoſiſſimis: ramis ſubulatis utrinque attenuatis teretibus. *Linn. Spec.* 1596. *Hall.* 1752. *Weiſ. P. c.* 259. *Neck.* M. M. 183. *α.*

β. *Dillen* H. M. 316. f. 50. *Hall.* 1745. *Neck.* M. M. 183. *β.*

H. in ſylvis *α.* *am Homberg* & *Geiſtlichenberg*; *β.* ad terram *im Beilſtein*. Floret Aprili, Majo.

Var. *β.* Antheris *erectis vix differt.*

FONTINALIS. *G. P.* 1190.

Anthera operculata. *Calyptra* ſeſſilis, perichætio incluſa. *S. N.* 699.

885. FONTINALIS, *antipyretica*, foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Linn. Spec.* 1571. *Weiſ. P. c.* 261.

Hypn. *Hall* 1794. Hypn. *antipyreticum*. *Neck.* M. M. 191.

H. in ſtagnis pratorum eorumque rivulis *auf der Ahr*; *im Waſſergraben auf der Herrenwieſe*; in paludoſis ſylvaticis *im Hirſchberg*. Floret Autumno in ver uſque.

886. FONTINALIS, *minor*, foliis ovatis concavis trifariis acutis paſſim geminis, antheris terminalibus. *Linn. S. N.* 699. *Spec.* 1571.

Hypn. *Hall.* 1795. *Neck.* M. M. 192. var. *præced.* β.
H. ſimilibus in locis *auf der Herrenwieſe*, intra aquam fluentem *am Wehr.* Hujus fructificationes nondum vidi.

BUXBAUMIA. *G. P.* 1188.

Anthera operculata, hinc membranacea; *Calyptra* caduca; intra operculum ſacculus pollinis. *S. N.* 699.

887. BUXBAUMIA, *aphylla. Linn. Spec.* 1570. *Hall.* 1728.
H. unico in loco in ericetis muſcoſis circa pagum *Hirſchberg* rarius. Primum lecta a Filio *Henr. Paul.* Floret Februario, Martio.

C. *ALGÆ.*

* *Terreſtres.*

MARCHANTIA. *G. P.* 1198.

MASC. *Calyx* peltatus, ſubtus tectus Corollis 1-petalis. *Antheræ* multifidæ.

FEM. *Calyx* ſeſſilis, campanulatus, polyſpermus. *S. N.* 707.

888. MARCHANTIA, *polymorpha*, calyce communi decemfido. *Linn. Spec.* 1603.
α. major. Mich. N. G. T. 1. f. 1. *Dillen.* H. M. 523. T. 76. f. 6. *Hall* 1891. *Weiſ.* P. c. 132. *Neck.* M. M. 114.
β. minor. Mich. N. G. T. 1. f. 2. *Dill.* H. M. 527. T. 77 f. 7. *Hall.* 1892 α.
γ. octopartita. Mich. N. G. T. 1. f. 5. *Weiſ.* P. c. 133. β.
H. α. in pratis udis ad rivos *im Pulversgrund*; β. ibidem cum α; γ. locis uliginoſis *unter dem Sinnerhof* alibique. Floret Majo.
Pharm. HEPATICÆ FONTANÆ ſ LICHENIS STELLATI Herba.

889. MARCHANTIA, *hemiſphærica*, calyce communi quinquefido hemiſphærico, perichætio nullo. *Linn. Spec.* 1604. *Hall.* 1890. *Neck. M. M.* 118.
H. ad terram locis umbroſis humidis, in cavernulis rupium *am Galgenberg*, alibique rarius. Floret Majo.

890. MARCHANTIA, *conica*, calyce communi quinqueloculari ſubovato. *Linn. Spec.* 1604. *Hall.* 1889. *Neck. M. M.* 115.
H. in nemoroſis ad radices rupium circa *Erbach* copioſiſſime; *im Beilſtein* rarius. *Filius.* Floret Majo.

JUNGERMANNIA. *G. P.* 1196.

Masc. pedunculatus, nudus. *Anthera* 4-valvis.

Fem. ſeſſilis, nudus, ſeminibus ſubrotundis. *S. N.* 705.

a. *Frondibus pinnatis ſecundis.*

891. Jungermannia, *aſplenioides*, frondibus ſimpliciter pinnatis: foliolis pinnatis ovatis ſubciliatis. *Linn. S. N.* 705. *Spec.* 1597. *Hall.* 1868. *Weiſ. P. c.* 110. *Neck. M. M.* 133.

β. Foliolis alternis minoribus. *Hall.* l. c. *β. Mich.* T. 5. f. 1. 2. H. in nemoroſis udis ad *Erbach*; *im Hirſchberg*, *am Homberg* alibique frequens. Floret Majo.

892. Jungermannia, *viticuloſa*, frondibus ſimpliciter pinnatis; foliolis planis nudis linearibus. *Linn. S. N.* 705. *Spec.* 1597. *Hall.* 1869. *Weiſ. P. c.* 112. *Neck. M. M.* 134.

H. in nemoroſis udis *im Hirſchberg* parcius. Floret Majo.

893. Jungermannia, *polyanthos*, frondibus ſimpliciter pinnatis; foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Linn. Spec.* 1597. *Hall.* 1870. *Weiſ. P. c.* 113. *Neck. M. M.* 132.

H. locis umbroſis udis, in ſylvis circa *Hörbach am ſteinern Berg*; *im Hirſchberg* ad *Gundersdorf*. Floret Aprili.

894. Jungermannia, *lanceolata*, frondibus ſimpliciter pinnatis lanceolatis apice floriferis, foliolis integerrimis. *Linn. Spec.* 1597. *Hall.* 1871. *Weiſ. P. c.* 114. *Neck. M. M.* 131.

H. ad terram udam in ſylvarum locis umbroſis, *im Hirſchberg bey Gundersdorf* parcius. Floret Aprili.

895. Jungermannia, *bidentata*, frondibus ſimpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Spec.* 1598. *Hall.* 1877? *Weiſ. P. c. α.* major 115. *Neck. M. M.* 130. *Dillen. H. M.* 487. T. 70. f. 11.

β. bidentata minor. *Hall.* 1865? *Weiſ. P. c.* 116. *Dill. H. M.* 488. T. 70. f. 12.

H. in terra umbroſa humida, in ſylvis ad *Erbach* alibique frequens. Floret Octobri.

796. JUNGERMANNIA, *bicuſpidata*, frondibus ſimpliciter pinnatis medio floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Spec.* 1598. *Hall.* 1878. *Weiſ. P. c.* 117. *Neck. M. M.* 129. *Dillen. H. M.* 489. T. 70. f. 13.

H. in ſylvis *im Hirſchberg* ad *Gundersdorf* & *Erbach*. Floret Aprili.

Hujus Folia unico dente globuliſera, ſemel vidi. Figura Dilleniana cum noſtra melius quam Micheliana convenit.

897. JUNGERMANNIA, *quinquedentata*, frondibus pinnatis ramoſis apice floriferis, foliolis quinquedentatis. *Linn. Spec.* 1598. *J. trilobata.* *Weiſ. P. c.* 118. *Neck. M. M.* 132.

H. ſylvarum locis umbroſis udis *am Homberg*; *im Thiergarten*; in ſcopulis & rupium rimis *am Galgen-* & *Geiſtlichenberg*. Floret Aprili.

b. *Frondibus pinnatis: pinnulis auriculatis ſuperne tectis.*

898. JUNGERMANNIA, *nemoroſa*, frondibus ſupra bipinnatis apice floriferis, foliolis ciliatis. *Linn. Spec* 1598. *Hall.* 1859. *Weiſ. P. c.* 121. *Neck. M. M.* 136.

H. in nemoroſis circa *Erbach*; *im Breitſcheider Wald.* Floret Aprili.

899. JUNGERMANNIA, *reſupinata*, frondibus ſupra bipinnatis inferne floriferis; foliolis crenulatis imbricatis rotundis. *Linn. Spec.* 15.9. *Neck. M. M.* 136.

H. in ſcopulis & rupium fiſſuris *am Galgenberg*. Floret vix unquam.

900. JUNGERMANNIA, *albicans*, frondibus ſupra bipinnatis apice floriferis: foliolis linearibus recurvatis. *Linn. Spec.* 1599. *Weiſ. P. c.* 122. *Neck. M. M.* 135.

H. in nemoroſis ſubudis *im Hirſchberg* rarius. Floret Majo.

901. JUNGERMANNIA, *trilobata*, frondibus ſubtus bipinnatis, foliolis quadratis obſolete trilobis. *Linn. Spec.* 1599. *Hall.* 1806. *Neck. M. M.* 137.

H. in ſylvis ad radices rupium *im Hirſchberg* parcius. Floret Aprili.

902. JUNGERMANNIA, *reptans*, frondibus ſubtus bipinnatis apice reptantibus, foliolis quadridentatis. *Linn. Spec.* 1599. *Hall.* 1879. *Weiſ. P. c.* 119. *Neck. M. M.* 138.

H. ad radices truncorum putridorum in ſylvarum umbroſis *im Hirſchberg*; circa *Hörbach* copioſe.

c. *Frondibus imbricatis.*

903. JUNGERMANNIA, *complanata*, ſurculis repentibus: foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Linn. Spec.* 1599. *Hall.* 1860. *Weiſ. P. c.* 124. *Neck. M. M.* 142.

H. ad arborum truncos ubique copioſiſſime. Floret Martio, Aprili.

In hac Folia *ſæpe in pollen deflucnta vidi.*

904. JUNGERMANNIA, *dilatata*, ſurculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Linn. Spec.* 1600. *Hall.* 1874. *Weiſ. P. c.* 126. *Neck. M. M.* 140.

H. in pomariis & ſylvis, ad truncos arborum paſſim. Floret Martio.

905. JUNGERMANNIA, *tamariſcifolia*, foliis imbricatis ſerie duplici: ſuperioribus ſubrotundis convexis obtuſis quadruplo majoribus. *Linn. Spec.* 1600. *Hall.* 1873. *Weiſ. P. c.* 128. *Neck. M. M.* 141.

H. in ſylvarum rupibus & truncis arborum; *am Homberg* alibique frequens. Floret Martio, Aprili.

906. JUNGERMANNIA, *platyphylla*, ſurculis procumbentibus ſubtus imbricatis, foliis cordatis acutis. *Linn. Spec.* 1600. *Hall.* 1872. *Weiſ. P. c.* 125. *Neck. M. M.* 142.

H. in ſylvis ad truncos arborum; in rupibus *am Homberg*; *Geiſtlichenberg*; *im Thiergarten* copioſe. Floret Aprili.

907. JUNGERMANNIA, *ciliaris*, ſurculis repentibus, foliolis duplicato-imbricatis: inferne auriculatis ciliatis. *Linn. Spec.* 1601?

H. in tecto ligneo ſemiputrido domunculæ *am Homberg*; alibi nondum obſervata. Floret Aprili.

Jungermannia *noſtra vel nova, vel a* Jungermannia *ciliari pluribus notis diverſiſſima. Cæſpites format denſiſſimos, ambitu ſemipedales, pulvinatos, rubiginoſo-ferrugineos,* Hypno *cupreſſiformi primo intuitu ſimillimos.* Frondes *ſteriles vix pollicem transverſum longæ, adſcendentes, ſubpinnatæ, apicibus ramorum incraſſatis, recurvis; ſupra convexæ; ſubtus planiuſculæ, dentibus ſeu ciliis foliorum reflexis, villoſæ.* Frondes *florentes breviores, minus ramoſæ, ſemiconſumptæ, erectiuſculæ, apice floriferæ, numeroſiſſimis perichætiis aggregatis occultatæ, demum deliqueſcentes.*

Foliola *ordine duplici imbricata, ſupra convexa, ſe invicem ſemitegentia, recurva: ſuperiora ſubquadrata, tri- ſ. quadripartita; inferiora lanceolata; utraque morgine in numeroſiſſimas lacinulas ciliares diviſa; ob exiguitatem nondum obſervare potui, an ſint auriculatæ, nec ne.* Perichætia *magnitudine & figura* Jung. *platyphyllæ, ventricoſa, lævia, non piloſa, ſubſulca, apice conniventi quadridentato.* Pedunculi *tetragoni, pollicares, argentei.* Anthera *ſubgloboſa ſubfuſca: laciniis dehiſcentibus 4 obtuſis:* Polline *&* *villis ſubfuſcis.*

Ad Lichenaſtrum ſcorpioides pulchrum villoſum *Dillen.* H. M. 481. T. 69. f. 3. *accedit; at multo minor teneriorque eſt omnibus ſuis partibus.*

d. *Surculis undique imbricatis: foliolis ſparſis.*

908. JUNGERMANNIA, *trichophylla*, ſurculis teretibus, foliolis capillaceis æqualibus. *Linn. Spec.* 1601. *Hall.* 1880. *Weiſ. P. c.* 130. *Neck. M. M.* 144.

H. ad terram humidam umbroſam, in ſylvis frequens. Floret Aprili.

Foliola *alterna uſque ad baſin fere tri- ſ. quadripartita, laciniis ſubulatis, incurvis, articulatis: articulis ſubgloboſis.* Perichætia *terminalia, longa, ſubteretia, apice quadrifido, ſetoſo.* Pedunculus *ſemipollicaris:* Anthera *nigra.*

e. *Acaules frondibus ſimplicibus.*

909. JUNGERMANNIA, *epiphylla*, acaulis, foliolo frondi innato. *Linn. Spec.* 1602. *Hall.* 1883. *Weiſ. P. c.* 106. *Neck. M. M.* 127.

H. ad parietes rivulorum in pratis udis ſylvaticis *hinter dem Homberg, im Stubersgrund; im Thiergarten* alibique. Floret Aprili.

910. JUNGERMANNIA, *pinguis*, acaulis, fronde oblonga ſinuata pingui. *Linn Spec.* 1602. *Hall.* 1884. *Weiſ. P. c.* 107. *Neck. M. M.* 126.

H. ſimilibus in locis cum præcedente; in rivulis: Frondibus confertis ſterilibus copioſiſſime; ad terram udam umbroſam in pomariis *vor dem Homberg* fructificans. Floret Aprili.

911. JUNGERMANNIA, *multifida*, acaulis, fronde bipinnatifida. *Linn. Spec.* 1602. *Weiſ. P. c.* 109. *Neck. M. M.* 129.

H. in pratis udis ſylvaticis; ſecus rivulos ad latera perpendicularia *hinter dem Homberg*, *im Stübers- und Güldnersgrund* frequens. Floret Aprili.

912. JUNGERMANNIA, *furcata*, acaulis, fronde lineari-ramoſa: extremitatibus furcatis obtuſiuſculis. *Linn. Spec.* 1602. *Hall.* 1885. *Weiſ. P. c.* 108. *Neck.* M. M. 128.

H. in ſylvis ad truncos arborum paſſim. Floret Aprili.

Frondes *marginibus ciliatæ, ciliis reflexis.* Perichætia & Antheræ *piloſæ. In frondibus ſterilibus & floriferis ex nervo medio ſubtus excreſunt globuli hemiſphærici ſ. reniformes ſubhirti, iu pollen defluentes.*

913. JUNGERMANNIA, *puſilla*, acaulis fronde ſubpinnatifida: lobis imbricatis, perichætio plicato. *Linn. Spec.* 1602. *Hall.* 1887.

H. ad terram humidam, & in cortice arborum dejecto ſemiputrido in nemoroſis circa *Erbach bey denen Steinkammern.* Floret Aprili.

Frondes *digitato-partitæ, lobis linearibus ſimplicibus, ſeu furcatis, obtuſis, craſſiuſculis, planis, adſcendentibus, nullo nervo diſtinctis*: Perichætia *ſæpe gemina.*

ANTHOCEROS. *G. P.* 1201.

MASC. *Cal.* ſeſſilis, cylindricus, integer. *Anthera* ſubulata, longiſſima, 2-valvis.

FEM. *Cal.* 6-partitus. *Sem.* 3. *S. N.* 708.

914. ANTHOCEROS, *punctatus*, frondibus indiviſis ſinuatis punctatis. *Linn. Spec.* 1606. *Neck* M. M. 43.

H. in agris humidis *hinter dem Schloſs*; *in der Alzbach* frequens, lectus a Filio H. P. 1770. Floret Octobri.

915. ANTHOCEROS, *lævis*, frondibus indiviſis ſinuatis lævibus. *Linn. Spec.* 1606. *Hall.* 1893. *Neck.* M. M. 44.

H. locis graminoſis ſecus rivulos *im Wieſengrund hinter dem Homberg*; lectus 1771. Floret Octobri.

Vereor ne ſit (noſter) Varietas *præcedentis.* Frondes *more* Jung. *pinguis terræ incumbentes, gramine occultatæ, planæ, ſinuato-lobatæ, lobis ſemipollicem longis; ſupra lævibus, nempe abſque excreſcentiis pulverulentis uti in præcedente, verrucis tamen frondi immerſis, ſæpe ternis, ſubgloboſis, atrocæruleis, tranſectis granuloſis, atris,* Antheræ *longitudine digiti minoris, numeroſiſſimæ.* Femineos Flores *nec in huc nec in præcedente hucuſque reperire potui.*

BLASIA. *G. P.* 1199.

MASC.? *Cal.* cylindricus granis repletus.
FEM.? *Cal.* nudus. Fructu ſubrotundo, foliis immerſo, polyſpermo. *S. N.* 707.

916. BLASIA, *puſilla. Linn. Spec.* 1605. *Hall.* 1857.
H. ad parietes rivulorum perpendiculares, horizontali directione, *im Wieſengrund hinter dem* Homberg. Pulcherrima Plantula a me lecta 1770 & 1772, cum Floribus Novembri.

RICCIA. *G. P.* 1200.

Cal. o. niſi cavitatem veſicularem intra folii ſubſtantiam. *Cor.* o. *Anthera* cylindrica, ſeſſilis, germini impoſita. *Piſt. Germen* turbinatum. *Stylus* filiformis, antheram perforans. *Pericarp.* ſphæricum, coronatum anthera emarcida *Semina* hemiſphærica, pedicellata. *S. N.* 708.

917. RICCIA, *cryſtallina*, frondibus ſuperficie papilloſis. *Linn. Spec.* 1605. *Hall.* 1896. *Weiſ. P. c.* 328. *Neck.* M. M. 41.
H. ad terram humidam umbroſam, in ſylvis *am Geiſtlichenberg* rarius, in nemoroſis *bey denen Steinkammern* circa *Erbach* copioſe. Floret autumno in ver uſque.

918. RICCIA, *minima*, frondibus glabris bipartitis acutis. *Linn. Spec.* 1605. *Neck.* M. M. 43.
H. in agris *hinter dem Schloſs*, alibique frequens.

Frondulæ exiguæ, planæ, bi-f. 4-partitæ, nullo ſulco ſupra exaratæ; demum per maturitatem ſuperficie longitudinaliter rupta, capſulæ atræ in lineam ordinatæ viſui patent, an in ſequente, cujus varietas eſt junior?

919. RICCIA, *glauca*, frondibus glabris canaliculatis bilobis obtuſis. *Linn. Spec.* 1605. *Hall.* 1897. *Neck.* M. M. 42.

H. in ambulacris hortorum ſabuloſis umbroſis humidis paſſim. Floret Autumno.

LICHEN. *G. P.* 1202.

MASC. *Receptaculum* ſubrotundum, planiuſculum, nitidum.

FEM. *Farina* foliis adſperſa. *S. N.* 708.

920. LICHEN, *ſcriptus*, leproſus albicans, lineolis nigris ramoſis characteriformibus. *Linn. Spec.* 1606. *Hall.* 2079. *Weiſ. P. c.* 37. *Neck.* M. M. 45.

H. in cortice lævi arborum, in ſylvis paſſim.

921. LICHEN, *geographicus*, leproſus flaveſcens, lineolis nigris mappam referens. *Linn. Spec.* 1607. *Hall.* 2063. & ſeneſcens 2064? *Weiſ. P. c.* 38. *Neck.* M. M. 46.

H. in rupibus *am Homberg*, alibique vulgatiſſimus.

922. LICHEN, *byſſoides*, leproſo-farinaceus, peltis ſtipitatis ſubgloboſis. *Linn. S. N.* 709. *Mantiſ.* 133.

H. ad terram glareoſam, locis umbroſis ad radices montis *Galgenberg* frequens. Floret Autumno.

Cruſta *cinereo-viridis, foliolis ſub lente conſtat ſinuato-lacinia-tis, obtuſis.* Capitula *ſubrotunda ſtipitata uti in L. ericetorum, at majora plerumque ex pluribus Tuberculis ſubfuſcis conſtructa, ſtipite longiore, craſſioreque.*

923. LICHEN, *vernalis*, leproſus albidus, tuberculis ſubrotundis ferrugineis. *Linn. S. N.* Tom. III. p. 234. *Hall.* 2070. *Dillen.* H. M. 126. T. 18. f. 4.

H. in cortice arborum putreſcente, primo vere ubique frequens.

Cruſta *granuloſa cinerea f. albida, humore irrigata virideſcens;* Tubercula *carnoſa, ſubgloboſa, ſeſſilia, carnea; demum convexa, ſubfuſca.*

924. LICHEN, *lacteus*, leproſus albus, tuberculis concoloribus hemiſphæricis. *Linn. S. N.* 709. *Mantiſſ.* 132. *Hall.* 2071?

H. in rupibus *am Homberg*; *am Stützelberg*; *bey dem Sauwiesgen*, alibique.

Cruſta *exacte lactei coloris, feneſcens fuſca: lineis concentricis marginalibus*; Tubercula *conferta demum in pollen defluentia.*

925. LICHEN, *rupicola*, leproſus albidus, tuberculis pallidis albo-marginatis. *Linn. S. N.* 709. *Mantiſſ.* 132. *Hall.* 2060?

H. in rupibus, in montoſis ſylvaticis *am Homberg*; *im Thiergarten* alibique.

926. LICHEN, *pertuſus*, leproſus: verrucis ſubteſſellatis lævigatis pertuſis poro uno alterove cylindrico. *Linn. S. N.* 709. *Mantiſſ.* 131. *Hall.* 2053.

H. in rupibus arborumque corticibus paſſim, *im Thiergarten* & *am Homberg* frequens.

927. LICHEN, *rugoſus*, leproſus albicans, lineolis ſimplicibus punctisque nigris confertis. *Linn. Spec.* 1607. *Hall.* 2077. 2083. *Neck.* M. M. 46. *Weiſ. P. c.* 41.

H. in ſylvis, ad truncos arborum vulgatiſſimus.

928. LICHEN, *ſanguinarius*, leproſus cinereo-vireſcens, tuberculis atris. *Linn. Spec.* 1607. *Hall.* 2065. 2066. 2055. 2061. *Neck.* M. M. 48.

H. in rupibus truncisque arborum frequens.

929. LICHEN, *fuſcoater*, leproſus fuſcus, tuberculis atris. *Linn. Spec.* 1607. *Hall.* 2062? *Neck.* M. M. 49. *Weiſ. P. c.* 39?

H. ad ſcopulos, locis umbroſis *in dem hohlen Weg hinter dem Schloſs*; *am Stützelberg*, alibique.

930. LICHEN, *calcarius*, leproſus candidus, tuberculis atris. *Linn. Spec.* 1607? *Hall.* 2058? *Neck.* M. M. 48. *Weiſ. P. c.* 40.

H. in rupibus calcariis *am Homberg*, *bey dem Kalkofen*; *am Rehberg*, alibique.

Cruſta *craſſa, inæqualis, lævis, (noſtri) ſulphurea, dein albida, rimoſa, teſſellata, decidua.* Tubercula *magnitudine Sem. Coriandri, cruſtæ immerſa, rufa, demum erumpentia atra.*

931. LI-

931. LICHEN, *cinereus*, leproſus, tuberculis nigris albo-marginatis. *Linn. S. N.* 709. *Mantiſſ.* 132. *Hall.* 2059.

H. in rupibus marmoreis copioſe *am Homberg.*

932. LICHEN, *fagineus*, leproſus albus, tuberculis albis farinaceis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2086. *Weiſ. P. c.* 43. *Neck. M. M.* 50.

H. in cortice Fagi aliarumque arborum paſſim.

933. LICHEN, *carpineus*, leproſus cinereus, tuberculis albidis rugoſis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2088. 2091? *Weiſ. P. c.* 42. *Neck. M. M.* 47.

H. in cortice arborum inprimis Carpini frequens.

934. LICHEN, *ericetorum*, leproſus candidus, tuberberculis incarnatis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2042. Tuberculis *fuſcis* 2043. *Neck. M. M.* 49. *Weiſ. P. c.* 44.

H. inter muſcos ad terram; in rupium cavernulis *am Galgenberg nach der Ahr zu* frequens.

Cruſta *granuloſa, nec foliacea, candida, humore irrigata cinereo-virens.* Tubercula *convexa, Agarici Pileum referentia, carnea, dein fuſca, ſtipite brevi.*

b. *Leproſi ſcutellati.*

935. LICHEN, *candelarius*, cruſtaceus flavus, ſcutellis luteis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2023? *Weiſ. P. c.* 46?

H. ad corticem arborum in pomariis paſſim. Hyeme imprimis pluvia vigens.

Cruſta *ſulphurea ſeu pallide flava, tenerrima, ſubtus nivea; dum ſicca* Byſſo *candelari ſimillima; a qua facile diſtingui poteſt:* a. Cruſta *foliosa*: Frondulis *criſpis, per lentem lobatis: lobis ſinuato-laciniatis: laciniis erectiuſculis, obtuſis, villoſis.* b. Scutellis *planiſſimis, concoloribus: limbo plano farinaceo. In aliis Individuis* Frondulæ *obſervantur minores, Scutellis deſtitutæ:* Foliolis *imbricatis minus laciniatis, margine in pollen defluentibus.*

936. LICHEN, *tartareus*, cruſtaceus ex albido-vireſcens, ſcutellis flaveſcentibus: margine albo. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2051.

H. in rupibus paſſim.

937. LICHEN, *palleſcens*, cruſtaceus albicans, ſcutellis pallidis. *Linn. Spec.* 1608. *Hall.* 2024. *Weiſ. P. c.* 47. *Neck. M. M.* 54.

H. in truncis arborum; in parietibus ligneis *im Thiergarten* frequens.

938. LICHEN, *ſubfuſcus*, cruſtaceus albicans, ſcutellis nigris: junioribus urceolatis cavis. *Linn. S. N.* 710. *Spec.* 1609. *Weiſ. P. c.* 48. *Neck. M. M.* 53.

α. Scutellis rufis albido-marginatis, *minor. Hall.* 2049.

β. ——— — *major. Hall.* 2044.

γ. ——— — nigris albido-marginatis. *Hall.* 2056.

δ. ——— — ſubfuſcis — — *Hall.* 2047.

ε. ——— — luteis — — *Hall.* 2050. 2057. 2058. *Lich. ochroleucus Neck.* M. M. 52.

H. α, β, δ, ε, in cortice arborum paſſim; γ & ε, in rupibus.

939. LICHEN, *Parellus*, cruſtaceus albus, peltis concavis obtuſis pallidis. *Linn. S. N.* 710. *Mantiſſ.* 132. *Hall.* 2048. *Neck. M. M.* 50.

H. in muris urbis, in rupibus *am* Homberg frequens.

c. *Imbricati.*

940. LICHEN, *centrifugus*, imbricatus, foliolis obſolete multifidis lævibus albidis centrifugis, ſcutellis rufo-fuſcis. *Linn. S. N.* 710. *Spec.* 1609. *Hall.* 2015. *Neck. M. M.* 99. *Weiſ. P. c.* 54.

H. in rupibus paſſim; *am Geiſtlichenberg* copioſe.

941. LICHEN, *ſaxatilis*, imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis. *Linn. S. N.* 710. *Spec.* 1609. *Hall.* 2011. *Neck. M. M.* 90. *Weiſ. P. c.* 55.

H. in rupibus & cortice arborum ubique frequens; cum ſcutellis ſæpiſſime occurrit *bey der obern Walkmühle.*

942. LICHEN, *omphalodes*, imbricatus, foliolis multifidis glabris obtuſis incanis, punctis vagis eminentibus. *Linn. Spec.* 1609. *Neck. M. M.* 99.

H. in arborum cortice paſſim; in rupibus *am* Homberg, alibique frequens.

943. LICHEN, *olivaceus*, imbricatus foliolis lobatis nitidis lividis. *Linn. Spec.* 1610. *Hall.* 2014. *Neck.M. M.* 93. *Weiſ. P. c.* 58.

H. in truncis arborum, & ad latera rupium ubique.

944. LICHEN, *criſpus*, imbricatus, foliolis lobatis truncatis crenatis atro-viridibus, ſcutellis concoloribus. *Linn. S. N.* 710. L. *murorum. Neck. M. M.* 85. *Dillen H. M.* 139. T. 19. f. 23.

H. ad terram rupibus ſuperſtratam *am Geiſtlichenberg*; ad latera rupium *bey dem Thiergarten* copioſe.

945. LICHEN, *nigreſcens*, gelatinoſus membranaceus, exaſperatus, convolutus, atroviridis, ſcutellis rubris. *Hall.* 2037. *Dillen. H. M.* 138. T. 19. f. 20.

H. in rupibus *am Geiſtlichenberg*; *am Thiergarten*; alibique.

946. LICHEN, *criſtatus*, imbricatus dentato-ciliatus, ſcutellis folio majoribus. *Linn. S. N.* 710. *Spec.* 1610. *Hall.* 2039. *Neck. M. M.* 86. *var.* α. *Dillen. H. M.* 140. T. 19. f. 26. & *var.* β. *Dillen* 140. T. 19. f. 25.

H. in rupibus *am Geiſtlichenberg*; *β. am Thiergarten*; *am Galgenberg.*

947. LICHEN, *tremelloides*, frondibus erectis planis margine criſpo lacinulato. Tremella *Lichenoides. Linn. Spec.* 1625. *Hall.* 2032. *Dillen. H. M.* 145. 146. T. 19. f. 31. 32. 33. 34. & 35. *Weiſ. P. c.* 52. *Neck. M. M.* 87.

H. ad terram, altis muſcis plerumque intertextus, in ſylvarum umbroſis paſſim.

Scutellæ *in minoribus varietatibus frequentiores; in majori ſeu* Tremella Lichenoide Linn. *Dill.* f. 31. *rariores. Hujus unicum ſpecimen ſcutelliferum legi in ſylvaticis ad pagum Burgk, Octobri:* Fronde *margine minus ciliata, Scutellis numeroſiſſimis totum Frondis diſcum fere obtegentibus, ſubpedunculatis, diſco carneo, concavo, limbo albido tumido.*

948. LICHEN, *pulcher*, gelatinoſus viridis, exaſperatus, undique concolor. *Hall.* 2036. *Dillen. H. M.* 138. T. 19. f. 22.

H. in rupibus & ad terram, in nemoroſis circa *Erbach*, *bey denen Steinkammern* copioſe. Octobri, Martio cum ſcutellis.

Frondes *imbricatæ, carnoſæ, gelatinoſæ, craſſæ, obtuſæ, ſubſinuatæ, pulcherrime e viridi cæruleſcentes, ſubpellucidæ; ſteriles tuberculis immerſis concoloribus fere obtectæ; ſcutelliferæ planiores, tenuioreſque, Scutellis numeroſis, magnis, carnoſis: Diſco ruſeſcente, limbo tumido, crenulato, concolore.*

949. LICHEN, foliis pulpoſis, calcariis, glauco polline villoſis, ſcutellis atris. *Hall.* 2028. *Mich. N. G.* Ord. XXXVI. T. 54. f. 2. *accedit, absque ſcyphis.*

H. in rupibus inter Br. *apocarpum, am Geiſtlichen Berg* frequens Octobri.

Frondes *calcareæ, craſſæ, duræ, irrigatione vix emolliendæ, albidæ.* Scutellæ *atræ, frondi immerſæ.* Scyphi *graciles quatuor lineas longi, pedunculati, ex ipſa frondis ſubſtantia, inter ſcutellas prodeunt.*

950. LICHEN, foliis pulpoſis, calcariis, fuſcis, imbricatis, ſcutellis nigris. *Hall.* 2031. T. 47. f. 3. *Dillen. H. M.* 228. T. 30. f. 134. *Mich. N. G.* Ord. XXXVI. T. 54. f. 4?

H. in rupibus *am Geiſtlichen Berg*, inter Brya. Octobri.

Foſſiola *exigua, imbricata, fuſca, humore irrigata virentia.* Scutellæ *immerſæ, numeroſæ, poro tantum in ſuperficie conſpicuæ.*

951. LICHEN, *orbicularis*, fronde ſemipinnata, rotunde lobata, cinerea, ſcutellis nigris. *Hall.* 2016. *Neck.* 88. *Dillen. H. M.* 177. T. 24. f. 71. & var. 72.

H. in cortice arborum inprimis Carpini in hortis paſſim.

952. LICHEN, *parietinus*, imbricatus foliis criſpis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Linn. Spec.* 1610. *Hall.* 2021. L. *fulvus. Neck. M. M.* 51.

H. ad muros antiquos urbis & cœmeterii; in tectis ſchiſteis paſſim.

Differt a L. *candelario & juniperino:* Frondibus *centrifugis, fulvis, durioribus, linearibus, calcareis, convexis, lobatis: lobis obtuſiſſimis, incraſſatis;* Scutellis *minoribus vix marginatis, fulvis. Hic ſemper rupeſtris; illi arborei ſunt.*

953. LICHEN, *phyſodes*, imbricatus: laciniis obtuſis ſubinflatis. *Linn. Spec.* 1610. *Hall.* 2018. *Neck. M. M.* 91. *Weiſ. P. c.* 57. male pro varietate Lich. ſaxatilis

H. in cortice arborum, in tectis ligneis *vor dem* Homberg copioſiſſime; cum ſcutellis pedunculatis confertis *im Thiergarten* frequens.

954. Lichen, *ſtellaris*, imbricatus, foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis. *Linn. Spec.* 1611. *Hall.* 2017. *Neck. M. M.* 89. *Weiſ. P. c.* 60.

H. in ramis arborum ubique.

955. Lichen, fronde rotunde lobata, glauca, polline concolore ſcabra, ſubtus hirta & atra. *Hall.* 2008. *Mich. N. G. T.* 45. f. 1.

H. in cortice arborum, *an denen Linden-Bäumen, auf dem Schieſsplatz* copioſe; in rupibus *am Homberg* frequens.

Frondes *glauco-cinereæ, non lacunoſæ, dum ſiccæ albidæ, eleganter lobatæ, lobis rotundis, ſinuato-crenatis; ſupra ad oram læves, verſus centrum furfure cinereo, demum ſordide fuſco totæ obtectæ; ſubtus radiculis ſimplicibus confertiſſimis atris hirtæ.* Scutellas *nondum vidi.* Pollen *furfuraceum, quo hic & plerique* Lichenes *imbricati obtecti ſunt, ſi lentis ope inſpicitur, corpuſculis conſtat ſtipitatis ſimplicibus, confertis, in hoc &* centrifugo *ramoſis, arbuſculam referentibus. Corpuſcula hæc ovata, ſubrotunda, vel clavæformi figura variantia, apice poro hiant, pollen impalpabile efflant, quo forte Lichenes propagantur. In* Lichenibus *cruſtaceis ſeu leproſis, ſimilia corpuſcula plerumque clavæformia, rarius ramoſa, apice pollen exhalantia, intermixtis aliis organis pelviformibus ſeſſilibus, furfuracea ſcobe repletis, lentis ope obſervantur.*

956. Lichen, viridis concolor, ſcutellis planis ſerratis. *Hall.* 2006. *an L. Acetabulum. Neck. M. M.* 94?

H. in arborum cortice, *in der Alzbach; vor dem Homberg*; alibique rarius.

Frondes *imbricatæ virides, rugoſæ uti in* L. *caperato.* Scutellæ *numeroſæ, ſubpedunculatæ, magnæ: diſco concavo badio, limbo crenulato cinereo, uti in* L. *ſaxatili.*

957. Lichen, *ciliaris*, foliaceus erectiuſculus: laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis. *Linn. Spec.* 1611. *Hall.* 1980. *Neck. M. M.* 101. *Weiſ. P. c.* 62.

H. in cortice arborum paſſim, *am Geiſtlichen- & Homberg*; in ſylvis frequens.

958. Lichen, *hiſpidus*, fronde ſemipinnata canaliculata cinerea. *Hall.* 2019. *Dillen H. M.* 152. T. 20. f. 46.

H. in cortice arborum, inprimis ramulorum, in pomariis ubique vulgatiſſimus.
Certe non eſt Var. præcedentis, plurimis notis diverſiſſimus.

959. LICHEN, *pulmonarius*, foliaceus laciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus; ſubtus tomentoſus. *Linn. Spec.* 1612. *Hall.* 1986. *Neck. M. M.* 108. *Weiſ. P. c.* 64.

H. in ſylvis ad truncos arborum paſſim.
Pharm. PULMONARIÆ ARBOREÆ Herba.

960. LICHEN, fronde obtuſe lobata, inferne ſcabra, maculis rotundis varia. *Hall.* 1989. *Dillen. H. M.* 216. T. 29. f. 114. *Mich. N. G.* Tab. 49. *optime.* Ord. XXI. p. 90.

H. in ſylvis ad radices rupium *im Thiergarten*, alibique frequens.

Frondium *lobis obtuſiſſimis, rotundatis, ſinuato-lacinulatis: ſupra glaucis, ſubtus luteſcentibus, denſius villoſis;* Scutellis *carneis, ſubmarginatis, in frondis diſco, non margine, ſeſſilibus; a præcedente, ſatis hic* Lichen *ſe diſtinguit.* Ceterum *Frondes lacunoſæ, minus tamen tuberculis reticulatæ ſunt, & dum ſicca non cortaceæ tenaces, ſed durtores, fragiliores, totæque albæ evadunt.* Scutellæ *a* Michelio *accurate depictæ, viſu rariores; in unico ſpecimine tantum paucas vidi.*

961. LICHEN, *furfuraceus*, foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis; ſubtus lacunoſis atris. *Linn. Spec.* 1612. *Hall.* 1976. *Neck. M. M.* 107. *Weiſ. P. c.* 65.

H. ad arborum truncos & parietes Theriotrophei, ad aſſeres in hortis *vor dem obern Thor.*

962. LICHEN, *farinaceus*, foliaceus erectus compreſſus ramoſus: verrucis marginalibus farinoſis. *Linn. Spec.* 1613. *Hall.* 1981. *Neck. M. M.* 104. *Weiſ. P. c.* 66.

Var. *α. Dillen* H M. T. 21. f. 57.
H. ad arborum truncos in ſylvis abunde, *β.* in rupibus *am Geiſtlichen Berg.*

963. Lichen, *calycaris*, foliaceus erectus linearis ramoſus lacunoſus convexus mucronatus. *Linn. Spec.* 1613. *Hall.* 1983. *Neck. M. M.* 106. *Weiſ. P. c.* 67.

H. ad arborum truncos, in pomariis ſylviſque frequens.

964. Lichen, *fraxineus*, foliaceus rectus oblongus lanceolatus ſublaciniatus lacunoſus glaber, ſcutellis ſubpedunculatis. *Linn. Spec.* 1614. *Hall.* 1985. *Neck. M. M.* 105. *Weiſ. P. c.* 72.

H. ad arborum truncos in ſylvis pomariiſque frequens.

965. Lichen, *prunaſtri*, foliaceus erectiuſculus lacunoſus: ſubtus tomentoſus albus. *Linn. Spec.* 1614. *Hall.* 1984. *Neck. M. M.* 103. *Weiſ. P. c.* 73.

H. in cortice Pruni, aliarumque arborum, in pomariis ſylviſque copioſiſſime.

966. Lichen, *juniperinus*, foliaceus laciniatus criſpus fulvus, peltis lividis. *Linn. Spec.* 1614. *Neck. M. M.* 96.

H. in arborum cortice paſſim.

967. Lichen, *caperatus*, pallide viridis rugoſus margine undulatus. *Linn. Spec.* 1614. *Hall.* 2005. *Neck. M. M.* 95. *Weiſ. P. c.* 74.

H. in arboribus & ad ſaxa paſſim. Scutellæ rariſſimæ.

968. Lichen, *glaucus*, foliaceus, depreſſus lobatus glaber: margine criſpo farinaceo. *Linn. Spec.* 1615. *Hall.* 2007. *Neck. M. M.* 100. *Weiſ. P. c.* 75.

H. in arboribus *im Thiergarten*, alibique; in tectis ligneis *am Homberg* rarius.

e. *Coriacei.*

969. Lichen, *reſupinatus*, coriaceus repens lobatus, peltis marginalibus poſticis. *Linn. Spec.* 1615. *Neck. M. M.* 81.

H. in ſylvis, inter lapidum acervos *am Homberg*, alibique frequens.

Individua *ſterilia frequentiora*: Frondes *rigidiores*, *craſſiores*, *margine adſcendente flexuoſo tuberculato*, *in pollen defluente*:

Tuberculis *aliis diſco immerſis concoloribus.* Individua ſcutellifera *rariora:* Frondes *tenuiores, latiores, utrinquæ læves.* Peltæ *in ſingulo frondis lobo ſæpius quinque, tres majores & duæ laterales minores, orbiculatæ, ſubmarginatæ, ruſæ, poſticæ parti laciniarum adſcendentium adnatæ.*

970. LICHEN, *venoſus*, coriaceus repens ovatus planus: ſubtus venoſus villoſus, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. Spec.* 1615. *Hall.* 1993. *Neck. M. M.* 82. *Weiſ. P. c.* 82.

H. ad terram *im hohlen Weg, & in der Höhle hinter dem Schloſs;* in ſylvis *im Thiergarten* alibique frequens.

971. LICHEN, *aphtoſus*, coriaceus repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. *Linn. Spec.* 1616. *Hall.* 1992. *Neck. M. M.* 80. *Weiſ. P. c.* 80.

H. ad terram, in ſylvis paſſim; *am Homberg* frequens.

972. LICHEN, *caninus*, coriaceus repens lobatus obtuſus planus: ſubtus venoſus villuſus, pelta marginali adſcendente. *Linn. Spec.* 1616. *Hall.* 1988. *Neck. M. M.* 79. *Weiſ. P. c.* 78.

H. in ſylvis ad terram, *am Homberg; im Thiergarten;* alibique.

973. LICHEN, *horizontalis*, coriaceus repens planus ſubtus avenius, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. S. N.* 712. *Mantiſſ.* 132. *Hall.* 1991. *Neck. M. M.* 78.

H. ad terram & radices rupium *am Geiſtlichen Berg* copioſe.

974. LICHEN, *ruſeſcens*, fronde lobata obtuſa avenia, margine ſinuata, ſubtus villoſa: peltis ſubrotundis. *Neck. M. M.* 79. *Hall.* 1990.

H. ad terram in ſylvis *am Beilſtein; im Thiergarten;* alibique frequens.

Peltæ *poſtica parte verrucoſæ, verrucis viridibus.* Frondes *juveniles ſupra verrucoſæ, hinc L. aphtoſo nimis adfinis.*

975. LICHEN, *polydactylon*, fronde oblonga, ſubtus venoſo-villoſa: marginibus ſubrevolutis adſcendentibus. *Neck. M. M.* 85.

H. ad terram, ſimilibus locis ſylvaticis montoſis, *am Homberg.*

Var. *præcedentis.* Lichenes *hi tres inter ſe plurimis notis convenientes, ob diſcum* Frondis *inferiorem ſemper plus minusve*

venoſum, ſæpe villoſum, LICH. *canino, aphtoſoque ita adfines, ut pro meris varietatibus haberi poſſint.*

976. LICHEN, *perlatus,* coriaceus repens lobatus glaber ſubtus ater, ſcutellis pedunculatis integris. *Linn. S. N.* 712. *Neck. M. M.* 97. *Dillen. H. M.* 147. T. 20. f. 39.

H. in cortice arborum in pomario *bey der obern Walkmühle;* in ſaxis *am geiſtlichen Berg;* rarius.

A L. *glauco & ſaxatili caute diſtinguendus.*

977. LICHEN, *ſylvaticus,* coriaceus repens laciniatus lacunoſus, peltis marginalibus adſcendentibus. *Linn. S. N.* 712. *Hall.* 1987. L. *polyſchides. Neck.* 84. *Mich. N. G.* 84. T. 43. *Dillen H. M.* 199. T. 27. f. 101.

H. in ſylvis, locis umbroſis ad radices & latera rupium in ſylvula *auf der Steinſeite; im Thiergarten* copioſe.

Odor in ſicco Lichene *nullus, humore irrigato, urinoſus, nauſeoſus, mihi ingratiſſimus.* Peltas *in unico individuo tantum vidi, terminales, exiguas,* L. *canino quadruplo minores, rufas.*

978. LICHEN, *ſaccatus,* foliaceus repens ſubrotundus: peltis depreſſis ſubtus ſaccatis. *Linn. Spec.* 1616. *Hall.* 1995. *Neck. M. M.* 83.

H. ad terram in rupium rimis *hinter dem Weitzberg, linker Hand nach dem Thiergarten zu* copioſiſſime.

f. *Umbilicatus, ſqualens quaſi fuligine.*

979. LICHEN, *puſtulatus,* umbilicatus ſubtus lacunoſus, ſurfure nigro adſperſus. *Linn. Spec.* 1617. *Hall.* 1996. *Neck. M. M.* 75.

H. in rupibus *am Galgenberg gegen Burgk* rarius.

g. *Scyphiferi.*

980. LICHEN, *cocciferus,* ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Linn Spec.* 1618. *Hall.* 1918. 1927. 1928. *Neck. M. M.* 57. *Weiſ. P. c.* 90. v. f.

H. in ericetis & rupibus *am Homberg,* alibique.

Pharm. MUSCI PYXIDATI Herba.

981. LICHEN, *cornucopioides*, ſcyphifer ſimplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1929. *Neck. M. M.* 58. β.

H. in ericetis *am Homberg*, in ſylvaticis montoſis *am Geiſtlichen- & Galgenberg* frequens.

982. LICHEN, *pyxidatus*, ſcyphifer ſimplex crenulatus, tuberculis fuſcis. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1922. 1923. *Neck. M. M.* 55. *Weiſ. P. c.* 84. α. & 85. β.

H. in ſylvaticis montoſis ſterilibus paſſim.

983. LICHEN, *fimbriatus*, ſcyphifer ſimplex denticulatus, ſtipite cylindrico. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1915. 1916. *Neck. M. M.* 55. β. *Weiſ. P. c.* 88. e.

H. in ſylvaticis ſterilibus *am Galgenberg; am Homberg* frequens.

984. LICHEN, *gracilis*, ſcyphifer ramoſus denticulatus filiformis. *Linn. Spec.* 1619. *Hall.* 1924. 1916. 1915. 1946. *Neck. M. M.* 56. *Weiſ. P. c.* 93. h.

H. in ſterilibus montoſis *am Galgenberg*, *Rehberg* & *Homberg*, infrequens.

985. LICHEN, *digitatus*, ſcyphifer ramoſiſſimus, ramis cylindricis, calycibus integris nodoſis. *Linn. Spec.* 1620. *Hall.* 1939. 1940. & β. var. *cornuta* 1910. *Neck. M. M.* 59. *Weiſ. P. c.* 91.

H. in ſterilibus montoſis *am Homberg*, alibique; β. in tectis ligneis ſemiputridis frequens.

986. LICHEN, *cornutus*, ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus integris. *Linn. Spec.* 1620. *Hall.* 1903. & forte 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. *Neck. M. M.* 59. *Weiſ. P. c.* 86. c.

H. in ericetis & ad truncos arborum putridos copioſe paſſim.

987. LICHEN, *deformis*, ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus dentatis. *Linn. Spec.* 1620. *Hall.* 1904. 1938.

H. in montoſis ſterilibus muſcoſis *am Rehberg*, rarius.

h. *Fruticuloſi.*

988. LICHEN, *rangiferinus*, fruticuloſus perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. *Linn. Spec.* 1620.

α. alpeſtris. *Hall.* 1957. *Weiſ.* P. c. 95. } Lich. alpeſtris.
β. ſylvaticus. *Hall.* 1956. } *Neck.* M. M. 68.

H. α. in montoſis editioribus *am Galgenberg*; *Rehberg*; β. in ſterilibus montoſis ubique copioſiſſime.

989. LICHEN, *uncialis*, fruticuloſus perforatus, ramulis breviſſimis acutis. *Linn. Spec.* 1621. *Hall.* 1960. L. *ceranoides*. *Neck. M. M.* 63. var. junior.

H. in ericetis, inter L. *ſubulatum*, *am Galgenberg*, infrequens.

990. LICHEN, *ſubulatus*, fruticuloſus ſubdichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis. *Linn. Spec.* 1621. *Hall.* 1955. L. *cornu cervi*. *Neck. M. M.* 64. β. *Weiſ. P. c.* 97.

H. ſimilibus locis ſterilibus montoſis paſſim.

991. LICHEN, *paſchalis*, fruticuloſus ſolidus tectus, foliolis cruſtaceis. *Linn. Spec.* 1621. *Hall.* 1963. *Neck. M. M.* 66.

H. in ſterilibus montoſis *im Thiergarten*; unicum tantum ſpecimen a Filio *H. P.* lectum: *Caule & ramis lignoſis ſolidis, intus non cavis; Tuberculis foliolisque pulverulentis glomeratis fere totis obtectis*, poſſideo.

992. LICHEN, *caſtaneus*, fruticoſus, durus caſtaneus, ſurculis ſpinoſis. *Hall.* 1965. *Dillen.* H. M. 112. T. 17. f. 31.

H. in ericetis montoſis inter L. *ſubulatum am Homberg*; *Beilſtein*, alibique copioſe.

Caulis *bipollicaris, ramoſiſſimus, erectus, compreſſo-lacunoſus, glaber, nitidus, ſpadiceus, axillis non perforatis, interne medulla farctus arachnoidea.* Ramis *copioſiſſimis, valde diviſis & ſubdiviſis, ciliatis; in ſicco, duris hiſpidis. in humido, molliſſimis.* Scutellæ *in caule & mejoribus ramis terminales, ruſæ, marginatæ, radiatæ: lacinulis ſetaceis confertis inæqualibus. Caulium baſis ſæpe ſanguineo-maculata; hinc* L. *islandico forte adfinis.*

993. LICHEN, *quisquiliaris*, fronde cinerea, ſcabra, ramis brevibus acutis, ſcutellis nigerrimis. *Hall.* 2026. *Mich.* N. G. p. 78. T. 53. f. 8.

H. in rupium cavernulis, *am Geiſtlichen Berg*; alibique frequens, muſcis intermixtus.

Teneriimi fruticuli, albidi, erecti, ramoſiſſimi, ramulis acutis, furfure albido tecti. In aliis individuis durioribus minusque ramoſis: Tubercula *terminalia, conferta, atro-fuſca.*

i. *Filamentoſi.*

994. LICHEN, *barbatus*, filamentoſus pendulus ſubarticulatus, ramis patentibus. *Linn. Spec.* 1622. *Hall.* 1970. *Neck.* M. M. 71. *Weiſ. P. c.* 100.

H. in ſylvis, *in der Hörre* frequens.

995. LICHEN, *jubatus*, filamentoſus pendulus: axillis compreſſis. *Linn. Spec.* 1622. *Hall.* 1968. *Neck.* M. M. 72. *Weiſ. P. c.* 101.

H. in ſylvis, ad arborum truncos *in der Hörre*; *im Thiergarten* frequens.

996. LICHEN, *lanatus*, filamentoſus ramoſiſſimus decumbens implicatus opacus. *Linn. Spec.* 1623? *Hall.* 1967. *Neck.* M. M. 73. β.

H. in rupibus, ſepimentisque vetuſtis *im Thiergarten*, alibique.

Noſter ramoſiſſimus, implexus, decumbens, fuſco-ater, ramulis capillaribus hirtis, per lentem lævibus, axillis compreſſis, tuberculisque exiguis uti in præcedente, cujus varietas eſt.

997. LICHEN, *pubeſcens*, filamentoſus ramoſiſſimus decumbens implexus nitidus. *Linn. Spec.* 1623? Uſnea nigra, ſetæ equinæ facie, parum ramoſa. *Dillen.* H. M. 67. T. 13. f. 11.

H. in rupibus, ericetis inque ſylvis, *am Homberg* alibique frequens.

Fila capillaria ſpithamæa ſ. dodrantalia, ſubramoſa, nigra, glabra, nitida, teretia, ſetam equinam exacte referentia; ſoli obverſa pellucida, purpurea, intus medulla candida farcta; exſiccata rigida linearia, planiſſima, ſpiraliter contorta, ſubviolacea. Rami *pauci, breviores, remoti, patentiſſimi; quibus circumgyrando Hypna conſtringit, ut difficile ſeparari queant.* Filorum *baſis ſemper ſolitaria, fruſtulo ligni ſeu folio putrido, immo etiam ipſis Muſcis, adnata.*

998. LICHEN, *chalybeiformis*, filamentoſus ramoſus divaricatus decumbens implicato-flexuoſus. *Linn. Spec.* 1623. *Hall.* 1969. *Neck.* M. M. 73.
H. in ſepimentis vetuſtis *im Thiergarten* rarius.

999. LICHEN, *hirtus*, filamentoſus ramoſiſſimus erectus, tuberculis farinaceis ſparſis. *Linn. Spec.* 1623. *Hall.* 1973. *Neck.* M. M. 69. *Weiſ. P. c.* 101.
H. in ſylvis, ad arbores ſepimentaque paſſim.

1000. LICHEN, *floridus*, filamentoſus ramoſus erectus, ſcutellis radiatis. *Linn. Spec.* 1624. *Hall.* 1972. *Neck.* M. M. 69. *Weiſ. P. c.* 102.
H. in ſylvis cum præcedente paſſim; in ſepimentis vetuſtis *im Thiergarten.* Scutellis *maximis ultra pollicem latis.*

BYSSUS. *G. P.* 1208.

Lanugo aut *Pulvis* ſimpliciſſimus. *S. N.* 721.

a. *Filamentoſæ.*

1001. BYSSUS, *Flos aquæ*, filamentis plumoſis natantibus. *Linn. S. N.* 721. *Spec.* 1637. *Hall.* 2113.
H. in omni aqua ſtagnante. ſuperficiei innatans.

1002. BYSSUS, *phosphorea*, lanuginoſa violacea lignis adnaſcens. *Linn. Spec.* 1638. *Neck.* M. M. 1.
H. in corticibus rimoſis ſemiputridis arborum paſſim.

1003. BYSSUS, *velutina*, capillacea viridis: filamentis ramoſis. *Linn. S. N.* 721. *Spec.* 1638. *Hall.* 2101. *Neck.* M. M. 2. *Weiſ. P. c.* 12.
H. in terra humida umbroſa, in hortis paſſim.

1004. BYSSUS, *aurea*, capillacea, pulverulenta, fructificationibus ſparſis, filamentis ſimplicibus ramoſiſque. *Linn. Spec.* 1638. *Hall.* 2106. *Neck.* M. M. 1. *Weiſ. P. c.* 13.
H. in rupibus, muſcos veſtiens, inter *Mn. hornum*, & *Lich. ſaccatum*, *am Weg nach dem Thiergarten zu.*

1005. BYSSUS, *floccoſa*, evanida floccoſa nivea. *Leyſ. Fl. Hal.* 1045. B. *cellaris.* *Weiſ. P. c.* 18. *Hall.* 2108.
H. in cellis ad dolia frequens.

1006. BYSSUS, *nigra*, velutina. *Hall.* 2104. *Dillen.* H. M. 9. T. 1. f. 18.
H. in rupibus *am Geiſtlichen Berg* alibique frequens.
Pulvillos format ambitu pollicares, aterrimos, pannum velutinum atrum exacte referentes: Filamentis *erectis conſtat ramoſiſſimis.*

b. *Pulverulentæ.*

1007. BYSSUS, *antiquitatis*, pulverulenta atra. *Linn. Spec.* 1638. *Hall.* 2081. *Weiſ. P. c.* 14.
H. in muris antiquis, & tectis ſchiſteis paſſim.

1008. BYSSUS, *ſaxatilis*, pulverulenta cinerea rupes operiens. *Linn. Spec.* 1638. *Weiſ. P. c.* 17. Lich. *ſegeſtria. Neck.* M. M. 113.
H. in ſaxis *am Humberg*, ubique frequens.

1009. BYSSUS, *candelaris*, pulverulenta flava lignis adnaſcens. *Linn. Spec.* 1639. *Hall.* 2096. Lichen. *Neck.* M. M. 112. *Weiſ. P. c.* 15.
H. in cortice arborum, parietibus antiquis, Februario frequens.

1010. BYSSUS, *botryoides*, pulverulenta viridis. *Linn. Spec.* 1639. *Hall.* 2089. Lichen. *Neck.* M. M. 111. *Weiſ. P. c.* 15.
H. in terra humida umbroſa paſſim.

1011. BYSSUS, *incana*, pulverulenta incana, farinæ inſtar ſtrata. *Linn. Spec.* 1639. *Hall.* 2094. *Weiſ. P. c.* 16. Lichen. *Neck.* M. M. 112.
H. in cortice rimoſo arborum, inque terra.

1012. BYSSUS, *lactea*, pulverulento-cruſtacea albiſſima. *Linn. Spec.* 1639. *Hall.* 2093. *Weiſ. P. c.* 17. Lichen. *Neck.* M. M. 113.
H. in arborum truncis, muſcos veſtiens.

** *Aquaticæ.*

TREMELLA. *G. P.* 1204.

Fructificationes vix manifeſtæ, in corpore gelatinoſo. *S. N.* 714.

1013. TREMELLA, *juniperina*, ſeſſilis membranacea auriformis fulva. *Linn. Spec.* 1625. *Hall.* 2260.

H. in Junipero, aliiſque lignis putridis primo vere *am Homberg* frequens.

1014. TREMELLA, *Noſtoc*, plicata undulata. *Linn. Spec.* 1625. *Hall.* 2041. Lichen. *Weiſ. P. c.* 29. *Dillen.* H. M. T. 10. f. 14.

β. *Dillen* H. M. T. 10. f 15.

H. α. Viridis *membranacea undulato-plicata, ſemper fructificatione deſtituta*, in pratis poſt pluvias, & inter muſcos frequens; β. Nigreſcens *gelatinoſa, craſſa, reticulato-plicata, fructificationibus ſparſis conicis*, in truncis *arborum* emortuis paſſim. Floret hyeme.

1015. TREMELLA, *purpurea*, ſubgloboſa ſeſſilis ſolitaria glabra. *Linn. Spec.* 1626. *Weiſ. P. c.* 30.

H. in arborum inprimis Mali ramis emortuis frequens.

ULVA. *G. P.* 1206.

Fructificationes in membrana diaphana. *S. N.* 719.

1016. ULVA, *granulata*, globoſa farcta viridis. *Linn. S. N.* 720. *Mant.* 136. *Spec.* 1633. *Tremella globoſa. Weiſ. P. c.* 28. *Conferva. Hall.* 2123?

H. in agris humidis *hinter dem Schloſs* autumno; ſphærulis majoribus aggregatis, viridibus, farctis, pellucidis: ad ripas *Dillæ auf dem Hinterſand*, primo vere frequens.

CONFÉRVA. *G. P.* 1207.

Tubercula inæqualia in fibris capillaribus longiſſimis. *S. N.* 720.

a. *Filamentis ſimplicibus, æqualibus, geniculis deſtitutis.*

1017. CONFERVA, *rivularis*, filamentis ſimpliciſſimis æqualibus longiſſimis. *Linn. Spec.* 1633. *Hall.* 2115. *Neck.* M. M. 3. *Weiſ. P.* c. 20.

H. in rivulis *auf der Herrenwieſe*; *in der Dille* frequens.

1018. CONFERVA, *fontinalis*, filamentis ſimpliciſſimis æqualibus digito brevioribus. *Linn. Spec.* 1633. *Hall.* 2114. *Neck.* M. M. 4. *Weiſ. P. c.* 21.

H. ad canalium oras aquas ducentium *im Kallenbachsgrund.*

b. *Filamentis ramoſis, æqualibus.*

1019. CONFERVA, *bulloſa*, filamentis æqualibus ramoſis bullas aëreas includentibus. *Linn. Spec.* 1634. *Hall.* 2120. *Neck.* M. M. 3. *Weiſ. P. c.* 22.
H. in aquis ſtagnantibus, *im Judenweyher*, alibique.

1020. CONFERVA, *canalicularis*, filamentis æqualibus baſin verſus ramoſioribus. *Linn. Spec.* 1634. *Hall.* 2118. *Neck.* M. M. 5. *Weiſ. P. c.* 23.
H. in rivulis canalibusque aquam vehentibus, *bey der Papier- & Walkmühle* frequens.

1021. CONFERVA, *amphibia*, filamentis æqualibus ramoſis, exſiccatione coëuntibus in aculeos. *Linn. Spec.* 1634. *Neck.* M. M. 4. *Weiſ. P. c.* 24.
H. in foſſis *bey dem Bockshayn*, frequens.

c. *Filamentis anaſtomoſantibus.*

1022. CONFERVA, *reticulata*, filamentis reticulato-coadunatis. *Linn. Spec.* 1635. *Hall.* 2119. *Neck.* M. M. 5. *Weiſ. P. c.* 24.
H. in foſſis aqua ſtagnante repletis, *bey dem Sinnerhof.*

d. *Filamentis nodoſis.*

1023. CONFERVA, *fluviatilis*, filis ſimpliciſſimis ſetiformibus rectis: geniculis craſſioribus angulatis. *Linn. Spec.* 1635. *Dill.* H. M. 39. T. 7. f. 47. & β. 48.
H. α. *unter der neuen Brücke*; β. *am Schützriemen, auf der Herrenwieſe, gegen Burgk über.* Lapidibus ſub aqua denſe adnaſcens.

1024. CONFERVA, *gelatinoſa*, filis ramoſis moniliformibus, articulis globoſis gelatinoſis. *Linn. Spec.* 1635. *Hall.* 2124. Chara *batrachoſperma.* *Weiſ. P. c.* 33.
H. in ſcaturiginoſis ſylvaticis *im Hirſchberg* ad *Gundersdorf* frequens.

1025. CONFERVA, *capillaris*, filis geniculatis ſimplicibus: articulis alternatim compreſſis. *Linn. Spec.* 1636. *Dillen.* H. M. 25. Tab. 5. f. 25. *A.* & *B.* *Neck.* M. M. 8.
H. in ſtagnis *an der Dille bey dem Sinnerhof*, rarius.

1026.

1026. CONFERVA, *glomerata*, filamentis geniculatis, ramulis brevioribus multifidis. *Linn. Spec.* 1637. *Neck. M. M.* 9. *Weiſ. P. c.* 25. α. *Dillen. H. M.* 28. T. 5. f. 31. & β. p. 27. T. 5. f. 28. & 29.

H. α. in rivulis, *unter dem Steg bey der obern Walkmühle*; β. *auf der Herrenwieſe.*

* * * * *

Hic habes L. B. MUSCOS & ALGAS, quas decem annorum ſpatio, ſummo cum labore & moleſtia, in noſtræ urbis regione vicinisque ſylvis collegi, deſcripſi, & ad vivum accurate depinxi; Has ſiquidem vires valetudine, dum hæc ſcribo, ſumme infirmas reſtaurabit, & ulteriorem lucis uſum divina mihi concedet indulgentia, omnes æri incidere & com deſcriptionibus ſub Titulo. VEGETABILIA CRYPTOGAMICA ICONIBUS ILLUSTRATA, in lucem edere animos eſt.

D. *FUNGI.*

* *Pileati.*

AGARICUS. *G. P.* 1209.

Fungus horizontalis, ſubtus lamelloſus. *S. N.* 722.

a. *Stipitati, pileo orbiculato.*

1027. AGARICUS, *Chantarellus*, ſtipitatus, lamellis ramoſis decurrentibus. *Linn. Spec.* 1639. *Merulius Hall.* 2326. *Gled. Meth. Fung.* 103. XII.

H. in pratis ſylvaticis *am Rehberg*, poſt pluvias autumno primoque vere frequens.

1028. AGARICUS, *integer*, ſtipitatus, lamellis omnibus magnitudine æqualibus. *Linn. Spec.* 1640. *Hall.* 2374. *Gled. M. F.* 106. XIV.

H. in ſylvis ad arborum radices *im Thiergarten*; autumno.

1029. AGARICUS, *muſcarius*, ſtipitatus, lamellis dimidiatis ſolitariis, ſtipite volvato: apice dilatato, baſi ovata. *Linn. Spec.* 1640. *Hall.* 2373. *Gled. M. F.* 82. I.

H. in ſylvis paſſim; *am Güldners- und Fiſchweyergrund*; *im Beilſtein* frequens.

1030. AGARICUS, *dentatus*, ſtipitatus, pileo convexo, lamellis baſi mucrone dentatis. *Linn. Spec.* 1640. *Hall* 2421?

H. in ſylvis; *im Thiergarten* autumno.

1031. AGARICUS, *delicioſus*, ſtipitatus, pileo teſtaceo, ſucco luteſcente. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.* 2419. *Gled M. F* 101. XI. α.

H. in montoſis ſylvaticis ſterilibus *am Homberg* rarius; *am ſteinern Berg* frequens.

1032. AGARICUS, *piperatus*, ſtipitatus, pileo planiuſculo lacteſcente: margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.* 2338.

α. Pileo convexo-depreſſo, lamellis pallidis. *Linn. Flor. Suec.* 1195 α *Gled.* M. F 97. X. α.

β. Pileo planiuſculo diſco conico, lamellis lividis *Linn. Flor. Suec.* 1195. β. *Gled.* M. F. 103. e.

H. α. in paſcuis & pratis *in der Aue; vor dem Homberg; auf dem Schlüſſel.* β. ibidem rarius.

1033. AGARICUS, *campeſtris*, ſtipitatus, pileo convexo ſquamato albido, lamellis rufis. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.* 2443. *Gled. M. F.* 115. XXI.

H. in paſcuis, pratis, pomariisque poſt pluvias Auguſto & ſequ. frequens.

1034. AGARICUS, *georgii*, ſtipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Linn. Spec.* 1642. *Hall.* 2367. *Gled. M. F.* 117. e.

H. in paſcuis ſylvaticis *am Beilſtein*, abunde Septembri.

1035. AGARICUS, *violaceus*, ſtipitatus, pileo rimoſo: margine violaceo tomentoſo, ſtipite cæruleſcente lana ferruginea. *Linn. Spec.* 1641. *Hall.* 2455.

H. in paſcuis ſylvaticis circa *Ockersdorf* & *Amdorf.*

1036. AGARICUS, *cinnamomeus*, ſtipitatus, pileo ſordide flavo, lamellis luteo rufis. *Linn. Spec.* 1642. *Hall.* 2432.

H. in pratis ſylvaticis *am Rehberg* Octobri.

1037. AGARICUS, *mammoſus*, ſtipitatus, pileo convexo acuminato griſeo, lamellis convexis griſeis crenatis, ſtipite nudo. *Linn. Spec.* 1642.

H. in paſcuis *hinter dem Schloſs*; locis umbroſis, ad ſepes.

1038. AGARICUS, *extinctorius*, ſtipitatus, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niveis, ſtipite ſubbulboſo ſubulato nudo. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2341. 2342. *Gled. M. F.* 130. XXVII. cum Var.

H. in dumetis, ſepibus, paſcuis & muſcoſis locis ſylvaticis paſſim.

1039. AGARICUS, *fimetarius*, ſtipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuoſis, ſtipite fiſtuloſo. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2357. *Gled. M. F.* 122. XXIV. *α.*

H. in ſimetis & ambulacris hortorum, intra extraque urbem frequens.

1040. AGARICUS, *campanulatus*, ſtipitatus, pileo campanulato ſtriato pellucido, lamellis adſcendentibus, ſtipite nudo. *Linn. Spec.* 1643.

H. in pratis *auf den neuen Wieſen* frequens.

1041. AGARICUS, *fragilis*, ſtipitatus, pileo convexo viſcido pellucido, lamelliſque luteis, ſtipite nudo. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2425 & 2426.

H. in hortorum ambulacris, & lignis ſemiputridis *auf dem Hinterſand*; rarius.

1042. AGARICUS, *umbelliferus*, ſtipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis baſi latioribus. *Linn. Spec.* 1643. *Hall.* 2346. *Gled. M. F.* 126. g. & 116. f.

H. in foliis dejectis, rejectamentiſque hortorum paſſim; *bey dem dicken Thurm*, alibique.

1043. AGARICUS, *androſaceus*, ſtipitatus albus, pileo plicato membranaceo, ſtipite nigro. *Linn. Spec.* 1644. *Hall* 2351. *Gled. M. F.* 108. XV.

H. in foliis dejectis, Pini ſtrobilis, & inter muſcos *am Homberg*, *im Thiergarten*, alibique.

1044. AGARICUS, *clavus*, ſtipitatus, pileo luteo, convexo ſtriato, lamellis ſtipiteque albis. *Linn. Spec.* 1644. *Hall.* 2370. *Gled. M. F.* 109. XVII. a.

H. in graminoſis muſcoſis umbroſis *vor dem Homberg am Winkel*, rarius Aprili.

b. *Acaules.*

1045. AGARICUS, *Quercinus*, acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Linn. Spec.* 1644. *Hall.* 2330. *Gled. M. F.* 134. XXX.
H. in arborum inprimis Quercus truncis emortuis *in der Horre* alibique frequens.

1046. AGARICUS, *Betulinus*, acaulis, coriaceus villoſus: margine obtuſo, lamellis ramoſis anaſtomoſantibus. *Linn. Spec.* 1645. *Merulius Hall.* 2329.
H. in caudicibus Betularum, aliisque lignis, *auf dem Hinterſand.*

1047. AGARICUS, *Alneus*, acaulis, lamellis bifidis pulverulentis. *Linn. Spec.* 1645. *Hall.* 2333. *Gled. M. F.* 134. XXXI.
H. in arborum truncis emortuis *in der Alzbach*, rarius.

* * *

1048. AGARICUS, *cervinus*, petiolo bulboſo, farcto, pileolo per oram tuberculoſo & ſtriato. *Hall.* 2401.
H. in rejectamentis coriariorum intra urbem. Octobri.

1049. AGARICUS, *flavus*, totus ſtriatus tenuiſſimus. *Hall.* 2429.
H. in ſterilibus montoſis *am Homberg.* Octobri.

1050. AGARICUS, *viſcidus*, petioli carne flava, pileo plano, ſordide luteo, lamellis albis. *Hall.* 2369.
H. in Pineto *in Hoffmanns Tannen.* Septembri.

1051. AGARICUS, *murinus*, pileo ovato adtracto. *Hall.* 2473.
H. in ſterilibus muſcoſis *im Thiergarten.* Aprili.

1052. AGARICUS, cervinus annulatus procerus exiguus. *Hall.* 2403.
H. in ſylvaticis umbroſis *im Thiergarten.* Aprili.

1053. AGARICUS, *violaceus*, petiolo gracili, pileolo pulvinato. *Hall.* 2457.
H. in ſylvis *am Homberg.* Octobri.

1054. AGARICUS, annulo araneoſo, pileo flavo, lamellis ex flavo fuliginoſis. *Hall.* 2482.
H. in ſylvis *am Homberg.* Octobri.

1055. AGARICUS, petiolo procero graciliſſimo, pileolo conico ſtriato murino, lamellis albis. *Hall.* 1391.

H. in muſcoſis ſteriſibus *am Homberg*, inter Hypna. Julio.

1056. AGARICUS, pileo pulvinato, leonino, centro fuſco ſquamoſo. *Hall.* 2360. an. *Mich. N. G.* T. 75. f. 4.

H. in foliis congeſtis putridis *am Homberg*. Octobri.

1057. AGARICUS, infundibuli forma, cervinus lamellis albis. *Hall.* 2359. *Gled. M. F.* 119. b?

H. ſimilibus locis *am Homberg*. Octobri.

1058. AGARICUS, petiolo gracili, prælongo, pileolo ſtriato conico. *Hall.* 2345. f. 2347. *Gled. M. F.* 120. VI. f. 128. k.

H. inter Hypna *am Homberg*. Octobri.

1059. AGARICUS, *ceſpitoſus*, petiolo procero, fiſtuloſo, pileo umbonato, ſtriato, ſquamoſo. *Hall.* 2389.

H. ad arborum radices *am Homberg*.

1060. AGARICUS, radice caudata, petiolo fiſtuloſo procero, pileo umbonato, cinereo, ſtriato, lamellis albis. *Hall.* 2388. *Gled. M. F.* 124. XXV.

H. locis umbroſis *hinter dem Schloſs*. Octobri.

1061. AGARICUS, albus, pileo hæmiſphærico, excarni, oris ſtriatis. *Hall.* 2348. *Gled. M. F.* 120. c.

H. ad arborum cortices inter Lichenes imbric. poſt pluvias diuturnas, toto fere anno frequens.

1062. AGARICUS, flavus, volvatus, annulo latiſſimo. *Hall.* 1430. *Gled. M. F.* 85. b.

H. in quiſquiliis putreſcentibus, *auf dem Hinterſand*. Octobr.

1063. AGARICUS, albus omnium minimus, pileolo hæmiſphærico. *Hall.* 2349. *Gled. M. F.* 121. d.

H. in foliis putreſcentibus autumno paſſim.

BOLETUS. *G. P.* 1210.

Fungus horizontalis, ſubtus poroſus. *S. N.* 723.

a. *Paraſitici acaules.*

1064. Boletus, *ſuberoſus*, acaulis pulvinatus albus lævis, poris acutis difformibus. *Linn. Spec.* 1645.

H. in arborum caudicibus *am Homberg; im Thiergarten; auf dem Hinterſand*, alibique.

1065. Boletus, *fomentarius*, acaulis pulvinatus inæqualis obtuſus, poris teretibus inæqualibus glaucis. *Linn. Spec.* 1645.

H. cum præcedente, *im Beilſtein* frequens.

1066. Boletus, *igniarius*, acaulis pulvinatus lævis, poris tenuiſſimis. *Linn. Spec.* 1645. *Hall.* 2288. *Gled. M. F.* 78. XII.

H. ad arborum truncos antiquos, paſſim.

1067. Boletus, *verſicolor*, acaulis: faſciis dicoloribus, poris albis. *Linn. Spec.* 1645. *Hall.* 2282. *Gled. M. F.* 68. b.

H. ad arborum truncos ſubemortuos, ubique vere & autumno frequens.

b. *Stipitati.*

1068. Boletus, *viſcidus*, ſtipitatus, pileo pulvinato viſcido: poris teretibus convexis immerſis diſtinctis, ſtipite lacero. *Linn. Spec.* 1646.

H. in ſylvis *bey dem Güldners-* & *Fiſchweyergrund*, autumno.

1069. Boletus, *luteus*, ſtipitatus, pileo pulvinato ſubviſcido, poris rotundatis convexis flaviſſimis, ſtipite albido. *Linn. Spec.* 1646. *Polyporus. Hall.* 2301.

H. in ſylvis *am Homberg; im Beilſtein*, alibique autumno copioſiſſime.

1070. Boletus, *bovinus*, ſtipitatus, pileo glabro pulvinato marginato poris compoſitis acutis: porulis angulatis brevioribus. *Linn. Spec.* 1646. *Hall.* 2302. *Gled. M. F.* 63. I.

H. in paſcuis ſylvaticis *im Pulver-* & *Güldnersgrund* copioſiſſime. Octobri.

1071. Boletus, *ſubtomentoſus*, ſtipitatus, pileo flavo ſubtomentoſo, poris ſubangulatis difformibus

fulvis planis, ſtipite flavo. *Linn. Spec.* 1647. *Hall. Polypor.* 2311. *Gled. M. F.* 73. 2?

H. in montoſis im Bamberg. Aprili.

1072. BOLETUS, *flabelliformis*, ſtipitatus coriaceus, poris tenuiſſimis, ſtipite laterali. *Leyſer. Hall.* 1093. *Gleditſch M. F.* 80. d.

* * *

1073. BOLETUS, petiolatus niveus, alveolis ſubtus quadrangulis. *Hall.* 2295.

H. in ſylvaticis moſtoſis im Thiergarten, primo vere.

1074. BOLETUS, f. ſtilis, carne ſecedente, mollis, ſanguineus, craſſus obſcure lobatus. *Hall.* 2315. *Gled. M. F.* 77. X?

H. in truncis emoribundis im Beilſtein, Septembri.

HYDNUM. *G. P.* 1211.

Fungus horizontalis, ſubtus echinatus. *S. N.* 724.

1075. HYDNUM, *imbricatum*, ſtipitatum, pileo convexo imbricato. *Linn. Spec.* 1647. *Hall. Echinus* 2324.

H. in Pinetis am Homberg; Beilſtein, autumno.

1076. HYDNUM, *repandum*, ſtipitatum, pileo convexo lævi flexuoſo. *Linn. Spec.* 1647. *Hall.* 2325. *Gled. M. F.* 74. VI.

H. in ſylvis am Homberg; im Thiergarten, copioſe.

1077. HYDNUM, *tomentoſum*, ſtipitatum, pileo plano infundibuliformi. *Linn. Spec.* 1647.

H. in montoſis moſcoſis am Homberg. Martio.

1078. HYDNUM, *auriſcalpium*, ſtipitatum, pileo dimidiato. *Linn. Spec.* 1648. *Hall.* 2321. *Gled. M. F.* 74. VII.

H. in ſylvis acroſis am Stützelberg; in Hoffmanns Tannen; rarius; im Thiergarten copioſe. Strobilis Pini dejectis putreſcentibus innaſcens. Novembri.

1079. HYDNUM, *paraſiticum*, acaule, arcuato-rugoſum tomentoſum. *Linn. Spec.* 1648.

H in arborum truncis *am Beilſtein* frequens.

1080. HYDNUM, *laciniatum*, ramoſum niveum, aculeis parellelis horizontalibus, unilateralibus. (*Echinus*) *Hall.* 2317. *Mich. N. G.* 122. T. 64. f. 2. *optime.*

H. in caudicibus arborum *in der Hörre. Filius.* Octobri.

Fungus *altiſſimus, elegans.* Stipes *craſſus, carnoſus, ramoſiſſimus, ramis ſubteretibus, diviſis & ſubdiviſis, apice bi ſ. trifidis obtuſiuſculis,* Aculei *numeroſi, concolores horizontales, in ſtipite ramisque unilaterales.*

PHALLUS. G. P. 1212.

Fungus ſupra reticulatus, ſubtus lævis. *S. N.* 724.

1081. PHALLUS, *eſculentus*, pileo ovato celluloſo, ſtipite nudo rugoſo. *Linn.* 1648. *Boletus Hall.* 2247. *Gled. M. F.* 60. a

H. in ſylvis *am Homberg* rarius; *in der Hörre* copioſe. Aprili.

1082. PHALLUS, *impudicus*, volvatus ſtipitatus, pileo celluloſo. *Linn. Spec.* 1648. *Hall.* 2248. *Gled. M F.* 54. α. I. & β. 55 II.

H. in ſylvis α. *im Thiergarten*; β. in dumetis *oben am Fiſchweyergrund.* Septembri. α. Pileo *apice clauſo.* β. Pileo *apice pervio.*

** *Pileo deſtituti.*

HELVELA. G. P. 1214.

Fungus turbinatus. *S. N.* 725.

1083. HELVELA, *mitra*, pileo deflexo adnato lobato difformi. *Linn. Spec.* 1649. *Boletus Hall.* 2246. *Gled. M. F.* 38. c.

H. in ſylvis *unter denen Tannen im Thiergarten* rarius.

PEZIZA. G. P. 1215.

Fungus campanulatus, ſeſſilis.

1084. PEZIZA, *lentifera*, campanulata lentifera. *Linn. Spec.* 1649.

α. Cyathus ſericeus, intus lævis. *Hall.* 2215. *Gled.* M. F. 137. I.

β. Cyathus hirſutus intus ſtriatus. *Hall.* 2215. *Gled.* M. F. 138. a.

H. α in terra glareoſa, ex fruſtulo ligni ſepulto; β. in truncis arborum ſemiputridis; *auf dem Hintersand.* Octobri.

1085. PEZIZA, *minuta*; campanulata lentifera ſtipitata. an. *Hall.* 2338?

H. in Jungermanniæ platyphyllæ frondibus emarcidis, *am Geiſtlichen Berg.* Octobri.

Omnium minima, vix lineam longa. Calycem hyalinum vinarium vulgo Kelchglaſs *dictum exactiſſime referens. Stipes ſemilineam longus, purpureus, baſi orbiculata.* Scyphus *campaniformis, flaveſcens, membrana convexa clauſus, qua decidente, intus totus ſeminibus repletus.* Semina *magnitudine & figura ſem. Papaveris ſingulari modo elaſtice diſſiliunt, in lacinias radiantes dehiſcunt, lanamque niveam explodunt. Scypho vacuo perſiſtente.*

1086. PEZIZA, *punctata*, turbinata truncata, diſco punctato. *Linn. Spec.* 1650. *Sphæria Hall.* 2184. *Gled. M. F.* 44. VII.

H. in ſtercore equino bovinoque, *auf dem Schieſplatz* sarius.

1087. PEZIZA, *cornucopioides*, infundibuliformis diſco patente ſinuato-punctato. *Linn. Spec.* 1650. *Hall.* 2216.

H. in ſylvaticis, *am Dollberg*; in ſepibus *hinter dem Schloſs*; *bey dem Klingelborn*, infrequens.

1088. PEZIZA, *Acetabulum*, cyathiformis: extus angulata venis ramoſis. *Linn. Spec.* 1650. *Hall.* 2223. *Gled. M. F.* 42. VI.

H. in ſylvaticis montoſis *am Geiſtlichen Berg*; *im Thiergarten.*

1089. PEZIZA, *cyathiformis*: margine obtuſo erecto. *Linn. Spec.* 1651.

H. ad terram in ſylvaticis umbroſis *im Beilſtein*; circa *Erbach* frequens.

1090. PEZIZA, *cupularis*, globoſo-campanulata: margine crenato. *Linn. Spec.* 1651. *Hall.* 2228.

H. ad terram *hinter dem Schloſs*; *in der Höhle*; in ſylvis *im Hirſchberg* copioſe.

1091. PEZIZA, *ſcutellata*, plana: margine conuexo piloſo. *Linn. Spec.* 1651. *Hall.* 2242. *Gled. M. F.* 54. a.

H. in ſylvis, inter muſcos ad terram *am Homberg*, alibique frequens.

1092. PEZIZA, *cochleata*, turbinata cochleata. *Linn. Spec.* 1651. *Hall.* 2218?

H. locis umbroſis in ſylvis *im Mühlnberg*, rarius.

1093. PEZIZA, *Auricula*, concava rugoſa auriformis. *Linn. S. N.* 725. Tremella *Auricula*. *Spec.* 1625. *Hall.* 2220. *Gled. M. F.* 39. III.

H. in caudicibus arborum, inprimis ſambuci ſenio moribundis in pomariis paſſim. Octobri.

Pharm. FUNGI SAMBUCINI, s. AURICULA JUDAE.

1094. PEZIZA, ſeſſilis infundibuliformis, extus hirſuta, umbrina, intus nigerrima. *Hall.* 2219. T. 48. f. 8. optime.

H. in caudicibus arborum *auf dem Hinter-Sand; vor dem obern Thor, auf dem Zimmerplatz*; frequens.

* * *

1095. PEZIZA plana, flava breviſſime petiolata. *Hall.* 2241.

H. in truncis putridis *im Schuſters-Grund*. Octobri.

1096. PEZIZA humida, exilis, læte rubicunda. *Hall.* 2245.

H. in ligno putreſcente in Tectis *am Homberg*. Octobri.

Scutellaeformis plana, ſanguinea, marginata, ſeſſilis, baſi piloſa.

1097. PEZIZA nivea, infundibuliformis, breviſſime petiolata. *Hall.* 2239. *Gled. M. F.* 46. c?

H. in truncis putridis paſſim.

1098. PEZIZA planiſſima, ex glauco nigricans. *Hall.* 2243.

H. ſimilibus locis.

1099. PEZIZA plana, ſeſſilis glauca, extus nivea. *Hall.* 2244.

H. in truncis putridis inter corticem. Var. præced.

1100. PEZIZA minima, petiolata, coccinea, hirſuta. *Hall.* 2240.

H. in ligno putreſcente.

1101. PEZIZA plana, ſeſſilis miniata, oris ciliatis. *Hall.* 2245. Peziza minima lutea verna. *Dill.* cat. Giſſ. 195. *Gled. M. F.* 45. VIII.

H. ad terram in ambulacris hortorum frequens inter Brya. Non eſt var. *ſcutellatæ.* Scutellæ *fulvæ*, *carnoſæ*; *ſeſſiles*, *marginatæ*, *limbo piloſo tumido.*

1102. PEZIZA minima alba, petiolata, ſcypho infundibuliformi. *Hall.* 2238. & forte 2237.

H. in virgultis ſiccis paſſim.

CLAVARIA. *G. P.* 1216.

Fungus lævis, oblongus. *S. N.* 725.

a. *Indiviſæ.*

1103. CLAVARIA, *piſtillaris*, clavæformis ſimpliciſſima. *Linn. Spec.* 1651. *Hall.* 2203. *Gled. M. F.* 26. I.

H. in ſylvis umbroſis *im Breitſcheider Wald*; *im Thiergarten.* Novembri.

1104. CLAVARIA, *militaris*, clavata integerrima capite ſquamoſo. *Linn. Spec.* 1653. *Hall.* 2204.

H. in ſylvis *in der Hörre*; *im Hirſchberg*, rarius.

1105. CLAVARIA, *ophioglоſſoides*, clavata integerrima compreſſa obtuſa. *Linn. Spec.* 1652. *Hall.* 2206.

H. in ſylvaticis muſcoſis editioribus, *oben am Beilſtein.* Octobri.

b. *Ramoſæ.*

1106. CLAVARIA, *digitata*, ramoſa lignea nigra. *Linn. Spec.* 1652. *Sphæria Hall.* 2193. *Mich. N. G.* 104. T. 54. t. 4. 5.

H. in columnis carioſis prope terram, in Horto meo annuatim provenit. Octobri.

1107. CLAVARIA, *Hypoxylon*, ramoſo-cornuta compreſſa. *Linn. Spec.* 1652. *Sphæria. Hall.* 2194.

H. in truncis arborum cæduis, in pomariis umbroſis *vor dem Homberg; am Haynwinkelgen*, alibique frequens.

1108. CLAVARIA, *Coralloides*, ramis confertis ramoſiſſimis inæqualibus. *Linn. Spec.* 1652. *Hall.* 2201. *Gled. M. F.* 31. III.

β. Clavaria, *purpurea*, corpore multifido, inæquali & ramoſiſſimo, in apices graciles terminato. *Gled. M. F.* 32. c.

H. in ſylvis *im Hirſchberg* frequens. β. in umbroſis *an der Hohle hinter dem Schloſs*, in ſylvis *in der Horre* frequens.

Colore pulcherrime puniceo. Ramis *totis fructificatis omnibus exaſperatis contotis concoloribus.*

1109. CLAVARIA, *faſtigiata*, ramis confertis ramoſiſſimis faſtigiatis obtuſis luteis. *Linn. Spec.* 1652.

H. in ſylvis *im Thiergarten* rarius.

1110. CLAVARIA, *muſcoides*, ramis ramoſis acuminatis inæqualibus luteis. *Linn. Spec.* 1652. *Hall.* 2190.

H. locis ſterilibus muſcoſis, inter Lich. *rangifer. am Homberg*, alibique frequens.

LYCOPERDON. *G. P.* 1217.

Fungus ſubrotundus, ſeminibus farinaceis repletus. *S. N.* 726.

a. *Solida, ſubterranea abſque radice.*

1111. LYCOPERDON, *Tuber*, globoſum ſolidum muricatum, radice deſtitutum. *Linn. Spec.* 1653. *Hall.* 2177.

H. in ſylvis, ſub terra, circa arcem *Beilſtein. Grüter*, Conſil.

1112. LYCOPERDON, *Cervinum*, globoſum ſolidiuſculum centro farinifero, radice inſtructum. *Linn. Spec.* 1653. *Sphæria. Hall.* 2191.

H. in ſylvis montoſis *im Beilſtein*, a me ipſo lectum, *bey dem Klingelborn* rarius; *im Ebersbacher Grund*, copioſe.

Pharm. Boletus cervinus.

1113. Lycoperdon, totum exaſperatum, petiolo cylindrico, capitulo ſphærico. *Hall.* 2171. *Gled. M. F.* 144. e.

H. in ſterilibus montoſis *am Homberg.* Auguſto.

b. *Pulverulenta, radicata ſupra terram.*

1114. Lycoperdon, *Boviſta*, ſubrotundum lacerato-dehiſcens. *Linn. Spec.* 1653.

α. *læve,* β. *hiſpidum,* } ſeſſile vel ſtipitatum. *Hall.* 2171. 2172. *Gled. M. F.* 143. I. confer. varietates, & 144. e.

H. ad Terram α. in ſylvis *im Thiergarten*, copioſe. β. in paſcuis montoſis ſterilibus *auf dem Homberg*, frequens. Figura & magnitudine valde ludit.

1115. Lycoperdon, *ſtellatum*, volva multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato. *Linn. Spec.* 1653. *Hall.* 2174. *Gled. M. F.* 152. b.

H. in montoſis ſylvaticis *am Geiſtlichen Berg*, rarius.

1116. Lycoperdon, *pedunculatum*, ſtipite longo, capitulo globoſo glabro: ore cylindrico integerrimo. *Linn. Spec.* 1664. *Hall.* 2170. *Gled. M. F.* 150. III.

H. in campis ſterilibus ſabuloſis *auf dem Hinterſand*; *auf dem Schieſsplatz*, rarius.

1117. Lycoperdon, *minimum*, pedunculatum, ſtipite bulboſo, capitulo ſubrotundo lævi, ore tubuloſo multifido.

H. in ſtipitibus Equiſeti putreſcentibus, in paludoſis prope *Sinn*, frequens.

Funguli *ſubaggregati, vix ſemilineam longi.* Stipes *baſi bulboſus, ſanguineus, pellucidus.* Capitulum *ab initio globoſum, miniatum, centro annulato depreſſiore, dein poro dehiſcente, tubus adſcendit brevis, margine multifidus, ex quo pollen purpureum evolat.*

c. *Paraſitica, in farinam ſateſcentia.*

1118. Lycoperdon, *varioloſum*, paraſiticum ſeſſile ſubrotundum, cortice exteriore fulvo deciduo, farina atra compacta. *Linn. S. N.* T. III. p. 234. *Lycogala. Hall.* 2142. *Gled. M. F.* 161. III. a.

H. in arborum ramis emortuis dejectis, primo vere ubique frequens.

1119. Lycoperdon, *piſiforme*, globoſum ſcabrum: ore perforato. *Linn. S. N.* 726?

H. in caudicibus arborum putreſcentibus, in pomariis *vor dem untern Thor.* Novembri.

1120. Lycoperdon, *Epidendrum*, cortice farinaque purpurea. *Linn. Spec.* 1654. *Hall.* 2173. *Gled. M. F.* 150. IV.

H. in lignis putreſcentibus, & ad Terram *auf dem Hinter-Sand.* Colore ſanguineo, purpureo flavo fuſcoque ludit.

1121. Lycoperdon, *epiphyllum*, aggregatum paraſiticum ore multifido lacero: pulvere fulvo. *Linn. Spec.* 1655.

H. in pagina inferiore Foliorum Tuſſilaginis.

MUCOR. *G. P.* 1218.

Fungus veſiculis ſtipitatis. *S. N.* 726.

a. *Perennes.*

1122. Mucor, *ſphærocephalus*, perennis ſtipite filiformi nigro, capitulo globoſo cinereo. *Linn. Spec.* 1655. *Trichia. Hall.* 2161.

H. in parietibus, & cortice arborum rimoſo *am Homberg, in Conradi Garten.*

1123. Mucor, *lichenoides*, perennis, ſtipite ſubulato nigro, capitulo lenticulari cinereo. *Linn. Spec.* 1655.

H. in corticibus arborum *am Homberg.*

1124. Mucor, *Embolus*, ſeta nigra, villo fuſco. *Linn. Spec.* 1655. *Embolus. Hall.* 2137.

H. in truncis arborum putreſcentibus, *bey dem Haynwinkelgen.*

1125. Mucor, *fulvus*, perennis pallidus, pileo fulvo. *Linn. Spec.* 1655.

H. in arborum cortice, in pomario *hinter dem Schloſs bey dem Ausfluſs der Mühlbach.*

1126. Mucor, *furfuraceus*, perennis viridis, foliis furfuraceis, ſtipite filiformi, capitulo globoſo. *Linn. Spec.* 1655. *Trichia. Hall.* 2162.

H. ad Terram, in fruſtulis ligni putreſcentis, *am Geiſtlichen Berg* frequens.

1127. Mucor, *rufus*, ſtipitatus, capitulo ſubrotundo rufo. an *Trichia. Hall.* 2163?

H. in ligno putreſcente rarius.

Stipes *ſetaceus niger. Capitulum ſubrotundum, depreſſum, rufum, ſuperficie villoſa. Rupta epidermide lana aſſurgit, evolutaque nivea, polline rufo.*

1128. Mucor, *violaceus*, ſtipitatus, capitulo lentiformi depreſſo.

H. in ligno putreſcente.

Stipes *lineam longus niger. Capitulum magnitudine & figura lentis minoris, depreſſum; quod in centro dehiſcit in lacinias radiantes, pollen pulcherrime violaceum; lanæ albiſſimæ adhærens excutit.*

b. *Fugaces.*

1129. Mucor, *Mucedo*, ſtipitatus capſula globoſa. *Linn. Spec.* 1655. *Hall.* 2147. *Gled. M. F.* 161. IV.

H. in variis putreſcentibus, Pane, Plantis exſiccatis.

1130. Mucor, *leproſus*, ſetaceus, ſeminibus radicalibus. *Linn. Spec.* 1656.

H. in truncis putredine excavatis, *am Homberg.* Octobri.

1131. MUCOR, *glaucus*, ſtipitatus, capitulo ſubrotundo aggregato. *Linn. Spec.* 1656. *Gled. M. F.* 24. VI.

H. in pomis putredine corruptis.

1132. MUCOR, *lacteus*, ſtipitatus, capitulo puriformi-oblongo lacteo.

Mucilago minima clavæ effigie, lacteum candorem ſimulans, pediculo donata. *Mich.* 216. no. 4. T. 96. f. 4. *optime.* Embolus. *Hall.* 2138.

H. in trunco putreſcente *am* Homberg rarius. Novembri.
Subſtantia fungoſa, fragiliſſima, mox contabeſcens, apice perforato.

1133. MUCOR, *niveus*, ſtipitatus, capitulo globoſo niveo nitido. *Lycogala. Hall.* 2140.

H. ſimilibus in putreſcentibus.
Stipes *duas lineas longus, cinereus, ſtriatus.* Capitulum *niveum, dein glaucum, epidermide tenaci, liquamen flavum continens.*

1134. MUCOR, *coccineus*, ſtipitatus, capitulo ſubrotundo. *Trichia. Hall.* 2164.

H in ligno putrido ſemiſepulto *am* Homberg Martio.
Stipes *lineam unam longus, nigricans.* Capitulum *magnitudine grani piperis, globoſum, eximie coccineum.* Epidermis *vix digito tacta infra medium circumſcinditur, & lana carnea aſſurgit, in formam Clavæ, pollen purpureum elaſtice ejaculans; ſtipite cum volva hemiſphærica perſiſtente.*

1135. MUCOR, *pyriformis*, ſtipitatus, capitulo pyriformi purpureo. *Trichia. Hall.* 2167.

H. in cavis carioſisque arboribus paſſim.
Stipes *ſolitarius, vel ex una baſi multiplex.* Capitulum *pyriforme, purpureum, nitidum, ſtipite longius.* Cuticula *in medio transverſim rupta, lana aſſurgit denſa, pollinifera concolor, conum ſimulans altitudine ſemipollicari.*

1136. MUCOR, *pomiformis*, ſubſtipitatus, capitulo globoſo fulvo. *Trichia. Hall.* 2167.

H. ſimilibus in locis.
Capitula *globoſa, aggregata, ſubſeſſilia.* Lana *&* pollen *fulvum.*

1137.

1137. MUCOR, *cruſtaceus*, ſtipitatus, ſpicis digitatis. *Linn. Spec.* 1656.

H. in variis cibis corruptis.

1138. MUCOR, *ceſpitoſus*, ſtipite ramoſo; ſpicis ternatis. *Linn. Spec.* 1656.

H. in rejectamentis hortorum putreſcentibus.

1139. MUCOR, *Eryſiphe*, albus, capitulis fuſcis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 1656.

H. in foliis Sonchi, Humuli Lamii.

1140. MUCOR, *ſepticus*, unctuoſus flavus. *Linn. Spec.* 1656. *Fuligo. Hall.* 2133. *Gled. M. F.* 160. d.

H. in lignis putridis.

F I N I S.

CLAVIS LITTERARUM,

quæ in iconibus occurrunt, & quibus ad partes fructificationis deſignandas utor & in poſteris operibus ad repetitionem vitandam, quoque utar.

a . . . Calyx.
b . . . Involucrum.
c . . . Corollæ petalum ſ. valvula interior.
d . . . Diſci.
e . . . Radii.
f . . . Tubus ſ. unguis.
g . . . Limbus ſ. Lamina.
h . . . Vexillum.
i . . . Alæ.
k . . . Carina.
l . . . Nectarium.
m . . . Stamina.
n . . . Germen.
o . . . Stigma.
p . . . Pericarpium.
q . . . Diſſepimentum.
r . . . Loculamenta.
ſ . . . Semen.
t . . . Corona ſ. pappus.
u . . . Nux vel nucleus.
v . . . Receptaculum.
x . . . Ariſta.
y . . . Rachis.
z . . . Palea.
♂ . . . Mas.
♀ . . . Femina.
☿ . . . Hermaphroditus: Figuræ litteris mediocribus notatæ partium magnitudinem naturalem, litteris majoribus vero, magnitudinem ſemper mediocriter auctam ſignificant. Cal. a. Cal. auctus A.

INDEX.

A.

Acer 772-774
Achillea 669-671
Aconitum 412
Acorus 260
Acroſtichum 788
Actæa 405
Adoxa 303
Aegopodium 221
Aeſculus 283
Aethuſa 207
Agaricus 1027-1063
Agrimonia 355
Agroſtema 348
Agroſtis 51-56
Aira 58-62
Ajuga 443-446
Alchemilla 121. 122
Aliſma 282
Allium 244-246
Alopecurus 43-45
Alſine 232
Alyſſum 499. 500
Anagallis 139
Anemone 417-419
Anethum 219.-220
Angelica 205. 206
Anthemis 666-668
Anthericum 252
Antirrhinum 488-493
Anthoceros 914. 915
Anthoxanthum 25
Anthyllis 557
Apium 222. 223
Aquilegia 413
Arabis 514
Arctium 624
Arenaria 324-327
Ariſtolochia 701
Arnica 651
Artemiſia 636. 637
Arum 702
Arundo 94
Aſarum 353
Aſclepias 175
Aſparagus 257
Aſperula 118
Aſplenium 798-802
Aſtragalus 570
Atriplex 775-777
Atropa 155
Avena 88-93

B.

Ballota 464
Bellis 643
Berberis 240
Betonica 447
Betula 730-731
Bidens 634-635
Blaſia 916
Boletus 1064-1074
Borago 135
Braſſica 515-517
Bromus 81-87
Briza 64
Bryonia 744
Bryum 829-849
Bunium 199
Bupleurum 200
Buxbaumia 887
Byſſus 1001-1012

INDEX.

C.

Calendula 680
Callitriche 2. 3
Caltha 416
Campanula 157-163
Cannabis 761
Cardamine 522-526
Carduus 625-630
Carex 705-725
Carlina 622
Carpinus 741
Carum 217
Caucalis 194
Centaurea 672-674
Ceraſtium 343-347
Ceratophyllum 734-735
Chærophyllum 212-215
Chelidonium 404
Chenopodium 180-188
Chryſanthemum 647-650
Chryſoſplenium 312-313
Cichorium 598
Circæa 24
Ciſtus 406
Clavaria 1103-1110
Clematis 414
Clinopodium 472
Cnicus 623
Cochlearia 501. 502
Colchicum 271
Comarum 399
Conferva 1017-1026
Conium 198
Convallaria 247-251
Convolvulus 145. 146
Conyza 639
Coreopſis 676
Cornus 120
Corylus 740
Cratægus 371. 373
Crepis 609-611
Cucubalus 332
Cuſcuta 123
Cynogloſſum 137
Cynoſurus 99
Cyperus 33

D.

Dactylis 57
Daphne 294
Datura 147
Daucus 195
Delphinium 410. 411
Dentaria 521
Dianthus 319-323
Digitalis 486. 487
Dipſacus 102. 103
Draba 496
Droſera 237. 238

E.

Echium 130
Elvela 1083
Elymus 96
Epilobium 284-288
Equiſetum 779-784
Erica 293
Erigeron 654. 655
Eriophorum 37
Ervum 587-591
Eryſimum 510-513
Evonymus 168
Eupatorium 633
Euphorbia 357-363
Euphraſia 475-476

F.

Fagus 773
Feſtuca 74-80
Filago 677-679
Fontinalis 885. 886
Fragaria 391. 392
Fraxinus 778
Fumaria 548-550

G.

Galeopſis 452-455
Galium 110-117
Geniſta 553-556
Gentiana 176-179
Geranium 533-542
Geum 397-398
Glechoma 434
Gnaphalium 640-642
Gypſophila 316

H.

Hedera 174
Hedyſarum 584
Heracleum 192
Herniaria 189
Hieracium 613-626
Hippuris 1
Holcus 769. 770
Holoſteum 100
Humulus 762
Hydnum 1075-1080
Hyoſcyamus 148
Hypericum 593-597
Hypnum 850-884
Hypochæris 599. 600

I.

Jaſione 681
Ilex 124
Impatiens 686
Inula 652. 653
Iris 30
Juglans 739
Juncus 261-270
Jungermannia 891-913
Juniperus 768

L.

Lamium 448-451
Lapſana 621
Lathræa 474
Lathyrus 561-563
Lemna 703. 704
Leontodon 603-606
Leonurus 433
Lepidium 503
Leucojum 241
Lichen 920-1000
Liguſtrum 4
Lilium 258
Limoſella 482
Linum 234-236
Lithoſpermum 132-133
Lolium 97. 98
Lonicera 164. 165
Lotus 592
Lunaria 497
Lychnis 349. 350
Lycoperdon 1111-1121
Lycopodium 804-805
Lycopſis 136
Lycopus 23
Lyſimachia 140-142
Lythrum 354

M.

Malva 543-547
Marchantia 888. 890
Marrubium 465
Matricaria 644-646
Medicago 585 586
Melampyrum 478-481
Melica 63
Mentha 435-439
Menyanthes 144
Mercurialis 766. 767
Meſpilus 375
Milium 59
Mnium 812-828
Monotropa 305
Montia 101
Mucor 1122-1140
Myagrum 498
Myoſotis 138
Myoſurus 239
Myriophyllum 732. 733

N.

Narciſſus 242. 243
Nardus 38
Nepeta 462
Nymphæa 408. 409

O.

Oenanthe 193
Oenothera 289
Ononis 558
Onopordum 631
Ophioglоſſum 785
Ophrys 696 697
Orchis 687-695
Origanum 471
Ornithogalum 253-255
Orobanche 473
Orobus 559. 560
Oſmunda 786. 787
Oxalis 351. 352

P.

Panicum 39-42
Papaver 400-403
Paris 304
Parnaſſia 233
Paſtinaca 218
Pedicularis 494-495
Peucedanum 197
Peziza 1084-1102
Phalaris 48. 49
Phallus 1081. 1082
Phaſcum 807. 808
Phellandrium 216
Philadelphus 364
Phleum 46. 47
Phyteuma 156
Picris 602
Pimpinella 224. 225
Pinus 742. 743
Plantago 106-108
Poa 65-73
Polycnemum 31
Polygala 551
Polygonum 295-302
Polypodium 786-797
Polytrichum 809-811
Populus. 763-765
Potamogeton 126-129
Potentilla 393-396
Poterium 736
Prenanthes 612
Primula 143
Prunella 469. 470
Prunus 365-370
Pteris 803
Pulmonaria 131
Pyrola 306-309
Pyrus 376. 377

Q.

Quercus	738		

R.

Ranunculus	421-432	Riccia	917-919
Raphanus	509	Roſa	379-385
Reſeda	356	Rubus	386-389
Rhamnus	166. 167	Rudbeckia	675
Rhinanthus	477	Rumex	273-281
Ribes	169-173		

S.

Sagina	125	Serratula	632
Salix	745-759	Sherardia	119
Sambucus	228-230	Silene	333
Sanguiſorba	109	Sinapis	527
Sanicula	191	Siſymbrium	528-532
Saponaria	317. 318	Sium	201-203
Satureia	463	Solanum	153. 154
Saxifraga	314. 315	Solidago	656
Scabioſa	104 105	Sonchus	607. 608
Scandix	208. 211	Sorbus	374
Schœnus	32	Sparganium	726
Scilla	256	Spartium	552
Scirpus	34-36	Spergula	340-342
Scleranthus	310-311	Sphagnum	806
Scrophularia	483-485	Spiræa	378
Scutellaria	466	Stachys	456-461
Sedum	334-339	Staphylea	231
Selinum	204	Stellaria	328-331
Sempervivum	363	Symphytum	134
Senecio	657-662	Syringa	5
Serapias	698-700		

T.

Tanacetum	638	Tormentilla	390
Teucrium	440-442	Tragopogon	601
Thalictrum	415	Tremella	1013-1015
Thlaſpi	504-508	Trifolium	571-588
Thymus	467-468	Triglochin	272
Tilia	407	Triticum	95
Tordylium	196	Trollius	420

Tulipa	259	Tuſſilago	663-665
Turritis	518-520	Typha	727

V.

Vaccinium	290-292	Viburnum	226. 227
Valantia	771	Vicia	564-569
Valeriana	26-29	Vinca	152
Verbaſcum	149-151	Viola	682-685
Verbena	22	Viſcum	760
Veronica	6-20		

U.

Ulmus	190	Utricularia	91
Urtica	728. 729		

Typis L. P. Wegeneri, Typogr. Berol.

148231

1131. MUCOR, *glaucus*, ſtipitatus, capitulo ſubrotundo aggregato. *Linn. Spec.* 1656. *Gled. M. F.* 24. VI.

H. in pomis putredine corruptis.

1132. MUCOR, *lacteus*, ſtipitatus, capitulo puriformi-oblongo lacteo.

Mucilago minima clavæ effigie, lacteum candorem ſimulans, pediculo donata. *Mich.* 216. no. 4. T. 96. f. 4. *optime.* Embolus. *Hall.* 2138.

H. in trunco putreſcente *am Homberg* rarius. Novembri.
Subſtantia fungoſa, fragiliſſima, mox contabeſcens, apice perforato.

1133. MUCOR, *niveus*, ſtipitatus, capitulo globoſo niveo nitido. *Lycogala. Hall.* 2140.

H. ſimilibus in putreſcentibus.
Stipes *duas lineas longus, cinereus, ſtriatus.* Capitulum *niveum, dein glaucum, epidermide tenaci, liquamen flavum continens.*

1134. MUCOR, *coccineus*, ſtipitatus, capitulo ſubrotundo. *Trichia. Hall.* 2164.

H. in ligno putrido ſemiſepulto *am Homberg* Martio.
Stipes *lineam unam longus; nigricans.* Capitulum *magnitudine grani piperis, globoſum, eximie coccineum.* Epidermis *vix digito tacta infra medium circumſcinditur, & lana carnea aſſurgit, in formam Clavæ, pollen purpureum elaſtice ejaculans; ſtipite cum volva hemiſphærica perſiſtente.*

1135. MUCOR, *pyriformis*, ſtipitatus, capitulo pyriformi purpureo. *Trichia. Hall.* 2167.

H. in cavis carioſisque arboribus paſſim.
Stipes *ſolitarius, vel ex una baſi multiplex.* Capitulum *pyriforme, purpureum, nitidum, ſtipite longius.* Cuticula *in medio transverſim rupta, lana aſſurgit denſa, pollinifera concolor, conum ſimulans altitudine ſemipollicari*

1136. MUCOR, *pomiformis*, ſubſtipitatus, capitulo globoſo fulvo. *Trichia. Hall.* 2167.

H. ſimilibus in locis.
Capitula *globoſa, aggregata, ſubſeſſilia. Lana & pollen fulvum.*

1137.

1137. MUCOR, *cruſtaceus*, ſtipitatus, ſpicis digitatis. *Linn. Spec.* 1656.

H. in variis cibis corruptis.

1138. MUCOR, *ceſpitoſus*, ſtipite ramoſo; ſpicis ternatis. *Linn. Spec.* 1656.

H. in rejectamentis hortorum putreſcentibus.

1139. MUCOR, *Eryſiphe*, albus, capitulis fuſcis ſeſſilibus. *Linn. Spec.* 1656.

H. in foliis Sonchi, Humuli Lamii.

1140. MUCOR, *ſepticus*, unctuoſus flavus. *Linn. Spec.* 1656. *Fuligo. Hall.* 2133. *Gled. M. F.* 160. d.

H. in lignis putridis.

FINIS.

CLAVIS LITTERARUM,

quæ in iconibus occurrunt, & quibus ad partes fructificationis deſignandas utor & in poſteris operibus, ad repetitionem vitandam, quoque utar.

a . . . Calyx.
b . . . Involucrum.
c . . . Corollæ petalum ſ. valvula interior.
d . . . Diſci.
e . . . Radii.
f . . . Tubus ſ. unguis.
g . . . Limbus ſ. Lamina.
h . . . Vexillum.
i . . . Alæ.
k . . . Carina.
l . . . Nectarium.
m . . . Stamina.
n . . . Germen.
o . . . Stigma.
p . . . Pericarpium.
q . . . Diſſepimentum.
r . . . Loculamenta.
ſ . . . Semen.
t . . . Corona ſ. pappus.
u . . . Nux vel nucleus.
v . . . Receptaculum.
x . . . Ariſta.
y . . . Rachis.
z . . . Palea.
♂ . . . Mas.
♀ . . . Femina.
☿ . . . Hermaphroditus. Figuræ litteris mediocribus notatæ partium magnitudinem naturalem, litteris majoribus vero, magnitudinem ſemper mediocriter auctam ſignificant. Cal. a. Cal. auctus A.

INDEX.

A.

Acer 772-774
Achillea 669-671
Aconitum 412
Acorus 260
Acroſtichum 788
Actæa 405
Adoxa 303
Aegopodium 221
Aeſculus 283
Aethuſa 207
Agaricus 1027-1063
Agrimonia 355
Agroſtema 348
Agroſtis 51-56
Aira 58-62
Ajuga 443-446
Alchemilla 121. 122
Alisma 282
Allium 244-246
Alopecurus 43-45
Alſine 232
Alyſſum 499. 500
Anagallis 139
Anemone 417-419
Anethum 219. 220
Angelica 205. 206
Anthemis 666-668
Anthericum 252
Antirrhinum 488-493
Anthoceros 914. 915
Anthoxanthum 25
Anthyllis 557
Apium 222. 223
Aquilegia 413
Arabis 514
Arctium 624
Arenaria 324-327
Ariſtolochia 701
Arnica 651
Artemiſia 636. 637
Arum 702
Arundo 94
Aſarum 353
Aſclepias 175
Aſparagus 257
Aſperula 118
Aſplenium 798-802
Aſtragalus 570
Atriplex 775-777
Atropa 155
Avena 88-93

B.

Ballota 464
Bellis 643
Berberis 240
Betonica 447
Betula 730-731
Bidens 634-635
Blaſia 916
Boletus 1064-1074
Borago 135
Braſſica 515-517
Bromus 81-87
Briza 64
Bryonia 744
Bryum 829-849
Bunium 199
Bupleurum 200
Buxbaumia 887
Byſſus 1001-1012

C.

Calendula	680	Clavaria	1103 - 1110
Callitriche	2. 3	Clematis	414
Caltha	416	Clinopodium	472
Campanula	157 - 163	Cnicus	623
Cannabis	761	Cochlearia	501. 502
Cardamine	522 - 526	Colchicum	271
Carduus	625 - 630	Comarum	399
Carex	705 - 725	Conferva	1017 - 1026
Carlina	622	Conium	198
Carpinus	741	Convallaria	247 - 251
Carum	217	Convolvulos	145. 146
Caucalis	194	Conyza	639
Centaurea	672 - 674	Coreopſis	676
Ceraſtium	343 - 347	Cornus	120
Ceratophyllum	734 - 735	Corylus	740
Chærophyllum	212 - 215	Cratægus	371. 373
Chelidonium	404	Crepis	609 - 611
Chenopodium	180 - 188	Cucubalus	332
Chryſanthemum	647 - 650	Cuſcuta	123
Chryſoſplenium	312 - 313	Cynogloſſum	137
Cichorium	598	Cynoſurus	99
Circæa	24	Cyperus	33
Ciſtus	406		

D.

Dactylis	57	Dianthus	319 - 323
Daphne	294	Digitalis	486. 487
Datura	147	Dipſacus	102. 103
Daucus	195	Draba	496
Delphinium	410. 411	Droſera	237. 238
Dentaria	521		

E.

Echium	130	Eriophorum	37
Elvela	1083	Ervum	587 - 591
Elymus	96	Eryſimum	510 - 513
Epilobium	284 - 288	Evonymus	168
Equiſetum	779 - 784	Eupatorium	633
Erica	293	Euphorbia	357 - 363
Erigeron	654. 655	Euphraſia	475 - 476

I N D E X.

F.

Fagus 773
Feſtuca 74-80
Filago 677-679
Fontinalis 885. 886
Fragaria 391. 392
Fraxinus 778
Fumaria 548-550

G.

Galeopſis 452-455
Galium 110-117
Geniſta 553-556
Gentiana 176-179
Geranium 533-542
Geum 397-398
Glechoma 434
Gnaphalium 640-642
Gypſophila 316

H.

Hedera 174
Hedyſarum 584
Heracleum 192
Herniaria 189
Hieracium 613-620
Hippuris 1
Holcus 769. 770
Holoſteum 100
Humulus 762
Hydnum 1075-1080
Hyoſcyamus 148
Hypericum 593-597
Hypnum 850-884
Hypochæris 599. 600

I.

Jaſione 681
Ilex 124
Impatiens 686
Inula 652. 653
Iris 30
Juglans 739
Juncus 261-270
Jongermannia 891-913
Juniperus 768

L.

Lamium 448-451
Lapſana 621
Lathræa 474
Lathyrus 561-563
Lemna 703. 704
Leontodon 603-606
Leonurus 433
Lepidium 503
Leucojum 241
Lichen 920-1000
Liguſtrum 4
Lilium 258
Limoſella 482
Linum 234-236
Lithoſparmum 132-133
Lolium 97. 98
Lonicera 164. 165
Lotus 592
Lunaria 497
Lychnis 349. 350
Lycoperdon 1111-1121
Lycopodium 804-805
Lycopſis 136
Lycopus 23
Lyſimachia 140-142
Lythrum 354

M.

Malva 543-547
Marchantia 888. 890
Marrubium 465
Matricaria 644-646
Medicago 585 586
Melampyrum 478-481
Melica 63
Mentha 435-439
Menyanthes 144
Mercurialis 766. 767
Meſpilus 375
Milium 59
Mnium 812-828
Monotropa 305
Montia 101
Mucor 1122-1140
Myagrum 498
Myoſotis 138
Myoſurus 239
Myriophyllum 732. 733

N.

Narciſſus 242. 243
Nardus 38
Nepeta 462
Nymphæa 408. 409

O.

Oenanthe 193
Oenothera 289
Ononis 558
Onopordum 631
Ophioglоſſum 785
Ophrys 696 697
Orchis 687-695
Origanum 471
Ornithogalum 253-255
Orobanche 473
Orobus 559. 560
Oſmunda 786. 787
Oxalis 351. 352

P.

Panicum 39-42
Papaver 400-403
Paris 304
Parnaſſia 233
Paſtinaca 218
Pedicularis 494-495
Peucedanum 197
Peziza 1084-1102
Phalaris 48. 49
Phallus 1081. 1082
Phaſcum 807. 808
Phellandrium 216
Philadelphus 364
Phleum 46. 47
Phyteuma 156
Picris 602
Pimpinella 224. 225
Pinus 742. 743
Plantago 106-108
Poa 65-73
Polycnemum 31
Polygala 551
Polygonum 295-302
Polypodium 786-797
Polytrichum 809-811
Populus. 763-765
Potamogeton 126-129
Potentilla 393-396
Poterium 736
Prenanthes 612
Primula 143
Prunella 469. 470
Prunus 365-370
Pteris 803
Pulmonaria 131
Pyrola 306-309
Pyrus 376. 377

INDEX.

Q.

Quercus 738

R.

Ranunculus 421-432
Raphanus 509
Reſeda 356
Rhamnus 166. 167
Rhinanthus 477
Ribes 169-173
Riccia 917-919
Roſa 379-385
Rubus 386-389
Rudbeckia 675
Rumex 273-281

S.

Sagina 125
Salix 745-759
Sambucus 228-230
Sanguiſorba 109
Sanicula 191
Saponaria 317. 318
Satureia 463
Saxifraga 314. 315
Scabioſa 104. 105
Scandix 208. 211
Schœnus 32
Scilla 256
Scirpus 34-36
Scleranthus 310-311
Scrophularia 483-485
Scutellaria 466
Sedum 334-339
Selinum 204
Sempervivum 363
Senecio 657-662
Serapias 698-700
Serratula 632
Sherardia 119
Silene 333
Sinapis 527
Siſymbrium 528-532
Sium 201-203
Solanum 153. 154
Solidago 656
Sonchus 607. 608
Sorbus 374
Sparganium 726
Spartium 552
Spergula 340-342
Sphagnum 806
Spiræa 378
Stachys 456-461
Staphylea 231
Stellaria 328-331
Symphytum 134
Syringa 5

T.

Tanacetum 638
Teucrium 440-442
Thalictrum 415
Thlaſpi 504-508
Thymus 467-468
Tilia 407
Tordylium 196
Tormentilla 390
Tragopogon 601
Tremella 1013-1015
Trifolium 571-588
Triglochin 272
Triticum 95
Trollius 420

Tulipa	259	Tuſſilago	663-665
Turritis	518-520	Typha	727

V.

Vaccinium	290-292	Viburnum	226. 227
Valantia	771	Vicia	564-569
Valeriana	26-29	Vinca	152
Verbaſcum	149-151	Viola	682-685
Verbena	22	Viſcum	760
Veronica	6-20		

U.

Ulmus	190	Utricularia	68
Urtica	728. 729		

Typis L. F. Wegeneri, Typogr. Berol.

V



IX

XII

XIV

Google

856